

7,376/3

ALBERTI
HALLERI

*Domini in Goumoëns le Jux & Eclagnens,
Præsid. Societ. Reg. Gætting. Præsid. Societ. Oeconom. Ber-
nensis : Sodal. Acad. Reg. Scient. Paris. Acad. Imp. Nat.
Cur. Boruss. Suec. Bonon. Arcad. Acad. Reg.
Chirurg. Paris.
Soc. Reg. Brit. Bot. Flor. Bavar. Helvet. Carniolic. Hafniens.
Coll. Med. Edimburg. In Supremo Senatu Reip. Bernensis
ducentum Viri.*

DE
PARTIUM
CORPORIS HUMANI

PRÆCIPUARUM
FABRICA ET FUNCTIONIBUS

OPUS QUINQUAGINTA ANNORUM.

TOM. II.

CORDIS FABRICA. MOTUS.



BERNÆ & LAUSANNÆ,
EX PRELIS SOCIETATUM TYPOGRAPHICARUM.

M. DCC. LXX. VIII.





P R Æ F A T I O.



ECCE alteram partem Tomi I. quam tibi trado, æqualem fere priori, quæ nescio quare a typographo post librum V. & VI. excusa est : culpam exiguam facile deprecor, cum ob rationes mercantiles idem typographus noluerit prius hoc opus venale proflare, quin sex tomi in typis absoluti fuerint.

In hoc volumine plura mutata & aucta sunt, quam quidem in priori. Non ita valde in parte anatomica, tamen ut aliqua nupera inventa adjecerim, ut *Portalii* de fibris carneis auris cordis dextræ, & de nervis cordis, tum de iis nervis *Neubaueri*,

Tom. II.

(*)

etsi non potui summi olim incisoris laboribus perinde utiliter frui, ac quidem licuisset, si ante editum *functionum* opus accepissem.

Dextras caveas cordis porro defendi ampliores esse.

In physiologicis aliqua mutavi; plura addidi. Mutare me aliqua coegerunt nuperorum cogitata, quæ expendere, & aut probare necesse fuit, aut meas rationes opponere. Cor in sua systole tamen brevius reddi porro contra nuperrimos scriptores defendi; neque testudinem excepero; in anguilla enim, de qua eadem dubio repetuntur, manifesto vidi, sollicita cura adhibita, cor mucroni scalpelli apice suo objectum in systole non lædi, in diastole vero vulnerari: quo in phænomeno nonnullisque aliis a Cl. FONTANA invitatus dissentio. Sed & cor totum inaniri posse puto me ostendisse; neque posse solum, sed vere omnino inaniri, & demum, quoties cum superstita in cavis suis sanguine quiescit, causam silentii esse in virium defectu, qui non finat ad contractionem niti.

Ordinem etiam *Harveianum* in contractione sibi succedente partium cordis porro secutus sum. Neque incordis viribus æstimandis a prioribus recedo; neque in cordis prærogativa, quod solum universitatem humorum in circulum agere potens sit, neque in alio privilegio, in qua hæc ipsa prærogativa fundatur, quod nempe cor super omnes alias corporis animalis partes natura irritabili emineat. Novi aliquas exceptiones esse: pleraque tamen experimenta pro corde stant.

Magni momenti porro est inquirere, quæ sit scaturigo vis ejus motricis adeo pertinaciter in corde conspicuæ. Nempe quæritur, num a nervis sit, aut solis, aut certe adiutoribus. Hic libratis & prioribus argumentis, & novis, confirmor per experimenta, nullas quidem partes nervorum in cordis motu adparere, non tamen ideo continuo nullas esse dixerim, cum cor musculus sit, & nervos accipiat. Id verum manet, exiguas esse, quod illa vis adventitia nervorum adeo exiguum portionem efficiat conspicui motus cordis, ut eo auxilio natura ad cor contrahendum minime egeat; atque in ex-

perimento absque nervorum auxilio perinde munere suo defungatur.

Stat ergo mihi, cordis irritabilitatem causam esse motus cordis. Hæc eadem causa motus, ut in omnibus musculis atque partibus contractilibus corporis animalis, causa pulsus est, vitæque & incrementi. Nervosam vim suo loco addemus.

De stimulis aliqua licuit addere ex nuperis *F. Fontanæ*, & *Spalanzani* experimentis. Quæ stimuli efficaciam destruunt, ea hic primum persequi potui, quæ pericula fere apud *Carminatium* fideliter & copiose exposita reperiantur.

Potissimum vero hic repetendæ fuerunt *Fontanæ* leges de amissa per ipsam contractionem natura contractili fibræ, ut post unam irritationem una contractio sequatur, post eam, nisi interim irritabilitas reparata sit, omnino quies.

Ab uno stimulo putat ergo vir *Cl.*, consumtam esse naturam irritabilem: verum eam vim, post quam exercendo se interiit, re-

nasce, & sponte, post aliquod tempusculum, iterumque efficaciter a stimulo ad motum revocari. Quæ causa sit alternarum vicium, quæ vulgo in motibus a corde pendebus percipiuntur.

Stahlianam porro animæ potestatem rejicio. Ostendo etiam nuperorum inventorum rotiferi animalis & pigri aliorumque vermiculorum longam in exercenda potestate intermissionem nihil posse ad abrogandam animæ quamcunque potestatem.

Causam summæ in motu constantiæ, qua cor supra alios musculos eminet, non in sæpe repetito motu poni putem, ut eo facilius cor contrahatur, quo frequentius se contrahit, lassitudo enim ista non videtur pati vera esse, eo certius musculi motum suppressura, quo sæpius & potentius eodem tempore idem se contrahit.

Sed porro de fide experimenti certus sum, quo ostenditur, cor inanitum quiescere, utique adeo in perpetua stimuli præsentia perpetuam cordis contractionem fundari.

Ita porro vale *Lector Benevole*, & si quid humani in his, aliisve, in quibus elaborandis commorior, operibus mihi accidit, æquus expende, me inter perpetuos dolores, & pejores doloribus languores, summam per debilitatem, hæc quæ de longo opere supersunt, semianimum expedire.

Bernæ d. 20. Oct. 1777.

ELEMEN-



ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ.

LIBER QUARTUS.

C O R.

S E C T I O I.

VELAMENTA EXTUS CIRCUMPOSITA.

§. I. *Pleura.*



CIRCUITUM sanguinis majorem diximus. Sequitur alter minor circuitus, qui per pulmonem fit. Nempe exponendum est, quomodo sanguis totius corporis humani per venas cavas in aurem dextram congestus, inde in aortam transeat. Is autem circuitus omnino cor ponit cognitum, cum cor ejus & via sit, & motrix causa. Id ergo nobis notum esse oportet, atque tenenda fabrica, ut functio declarari possit. Initium a velamentis facere necesse est, quibus continetur, & quæ multum ad expeditum cordis motum conferunt.

Pectus adeo, sive thorax, ingens est cavea, cujus extremum ambitum costæ definiunt, quas alibi exquisitius describemus, & costis interpositæ carnes; inferius diaphragma terminat, superne collum inponitur.

Ut magis sollicitè vocabulis utamur, *pleura* hanc caveam efficit, quo nomine dudum membrana intelligitur, quæ a costis nomen habet, & olim *succingentis* nomine notior fuit. Ea in universum simplex, neque in duas laminas divisibilis, ex cellulosa tela stipata *k* efficitur, fortior peritonæo *l*, & eadem ad dorsum robustior, quam ad sternum.

Exterius, uti fere de arteriis diximus, cellulosam telam adscititiam habet, quæ fecit, ut aliqui anatomici exterius asperam dixerint *m*. Ea cellulosa tela plerisque locis adipem continet, tum qua aortæ incumbit, dorsique spinis; tum qua musculis exterius circumpositis intercostalibus obducitur *n*; tum ea denique sede, qua duo, continuo dicendi, pleuræ sacci sibi adversi obponuntur. Eadem cellulosa natura cum cellulosis pariter reliqui corporis humani talis undique continuatur. Nullo modo verò eum adipem pro altera pleuræ membrana describere oportet, qui laxis spatiosis

k Schobinger de telæ cellulose dignitate n. 65. *reformat.* p. 159. *Thomas Bartholinus* ad patris anatomicum p. 191.
l Vesalius de fabric. corp. hum. L. V. p. 710. ed. 1555. *n* Kaauw de perspir. n. 143. 144. 145.
m Idem ibid. J. Antonides van der Linden in physiolog.

continetur, non continua planitie, qualis ad membranæ naturam requiritur. Errorem a *Realdo Columbo* o natum, a *Casparo Bartholino* p repetitum, fere omnes anatomici receperunt. *Ruyschius* equidem pleuram in duas laminas difficillime dividi experiendo didicit q: everfam tamen fictitiam illam pleuræ duplicaturam, *Winslowo* debemus r. Sed neque cum costarum periosteo pleuram confundere oportet, a quo manifesto differt, & multo adipe separatur. Interiora vero hujus cellulosæ fabricæ strata magis magisque densa, minoribus spatiosis interrupta, magis magisque etiam in unam levemque planitiem stipantur, levissimam, qua interiorem caveam respicit. Alba cæterum, inflammata tamen, aut ab admissio in arteriolas sebo, vâculis non maximis pingitur. Eadem aut omnino sensu caret, aut certe adeo obtuso gaudet, ut cum cute nullo modo queat comparari. Ita per experimenta reperi t, cum aliter & vulgo doceatur, & magnis viris v visum sit. Consentunt tamen plurima nupera experimenta, & sanam cum pleuritide pleuram repertam esse, & absque dolore inflammata, ipso demum Ill.

o Duplicaturam vocarunt. n. 25. 26
Habet *Realdus Col. de re anatomica* p. 191.

p *Instit. anat.* p. 190.

q *Epist. secund.*

r In *Epistola* quæ anno 1728 cum *Morandi* libro du haut appareil-excusa est, tum in *exposit. anatomique* T. IV. ar. des viscères de la poitr.

t *Second Mémoire sur la nature sensible des parties du corps animal* Exp. 162. 163. 164. 165. 166. *Castel* in quinque experimentis p. 74. 75. 76. 77.

v Alia pro sententia mea argumenta exstant in *Urb. Toffetti lett.* IV.

Haenio teste & *Morgagno*. In vivo homine infensilem *Caldanus* per experimenta comperit. In alio experimento, ipso in homine denudata pleura nullum doloris signum dedit, cum cutis irritatione vehementer doleret *a*. Mediastinum indolens esse *Carrere* *b*. Sed neque manifesti nervi in hoc velamento ostensi sunt *b**. Qui contra pleuram aut sanam, aut certe inflammata, dolere *c* defendunt, non adeo experimenta *d* producunt, quam magnos nervos per superficiem dispersos. Ad litem autem de sede doloris in pleuritide non licet nobis hic nos demittere, quibus immensus in physiologicis campus apertus sit. Neque debent nervi, qui per ejus superficiem decurrunt, pleuræ tribui, cui soli ii adscribi possunt, qui in ejus naturam dividuntur.

§. II. *Ejus duo Sacci.*

Et si unicum huic membranæ nomen est, duos tamen undique distinctos saccos *e* comprehendit, qui nusquam communicant, et si aliqua eorum parte se se vicini pene contingunt. Duo hi sacci in universum elliptoidi solido proxime accedunt, ut tamen anterior

a *G. Dove* de pleuritide Edimb. 1771. 8.

b *Inflam.* p. 470.

*b** *Winslow* l. c.

c *Panzani Giorn di medic.* 1776.

d Ita *Haenius* rat. medend. IX. p. 124. Qua dolor fuerat in pleura, inflammatio post mortem reperta est.

e *Winslow* l. c. n. 26. *Huber* E. N. C. III. obs. 101.

facies, pariter ut costæ, planior, lateralis sedes modice convexa, posterior maxime gibba sit, & subito ex maxima convexitate ad vertebra posita, lentius aliquanto versus costas convergat. Angustiores in parte superiori deorsum latefcunt; latissimi ad costas longissimas, sextam, & septimam, inde iterum contrahuntur, ut tamen inferior finis latior, planior, & paulum deorsum cavus sit. Summus eorum faccorum finis in imo collo est, pone claviculam, digito & altior altius, quam prima costa, & supremum eum finem arteria subclavia definit, quæ supra eam gibbam sedem versus axillas fertur.

Imus terminus diaphragmati oblique insidet, & quidem ipse hujus musculi situs requirit, ut antè facci pleuræ superiori loco terminentur, postè iidem multo longius descendant, & inferiori, circa imas costas, loco sint. Eorum tamen faccorum & pro hominis ætate, & pro diversis respirationis stadiis varia longitudo est. Et primum in fetu brevissimum spatium est, quo pulmones continentur, atque jecur altissime surgit, uti quidem alias curiosius exquiremus: sensim & hepar decrescit, ita & pulmones, & una pleuræ facci longius versus abdomen descendunt.

Deinde, quoties spiritum reddimus, ii facci sursum urgentur, & cedunt visceribus imi ventris, & breviores fiunt. Contra dum spiritum ducimus, iidem facci, & non minima portione, longius descendunt.

Denique ventriculus cibus, flatuque plenus,

& tumida intestina, & colon quidem potissimum, & gravidus uterus, pectoris spatium minuunt, & aquæ hydropicæ, in abdomine collectæ.

Diximus faccos inæquales esse: dexter nempe brevior, sinister longior, contra dexter aliquanto latior est, ut tamen aliquantum in universum dexter vincat, sitque capacior.

§. III. *Horum saccorum conjunctio est mediastinum.*

Porro cum dexter faccus sit, atque sinister, ita retinendum est, in superiori parte pectoris, & media, & anterieus, se duos eos saccos contingere, ante pericardium, & posterius, pone cor: inferius vero eosdem ad latera reductos se longe relinquere. Duobus ergo, quos citavi locis, duæ laminæ, duæve membranæ adparent, dexterrima nempe sinistri facci, & sinisterrima dextri, quæ vel omnino se tangunt, vel cellulosa aliqua tela, aut nonnullis, quas dicemus, corporis partibus separantur. Hic duplex quasi pectus dissepiciens paries & cum sterno, & cum vertebris, angulos fere rectos intercipit; cæterum tenerior ibi pleura, quam alibi est z. Cum ejus membranæ facci exteriores facies sibi obvertant, in utriusque facci intervallo eadem, quæ undique pleuræ circumjacet, cellulosa tela continebitur.

Quæcunque nunc duplicis pleuræ pars inter sternum & pericardium continetur, ea dicitur *anterius mediastinum*. Ea vox ita retinenda est, ne omnino in mediastino aliquid, a pleura aque ejus saccis diversum *a*, animo concipiamus. Non difficile est, quæ diximus, demonstrare. Solebam in pueris costas undique diffingere, ut pleuram inviolatam relinquerem *b*: putredine vero aut aqua fervida utebatur Vir Ill. *Abraham Kaauw Boerhaave c*. Icones raræ sunt, non tamen incommoda, quam *Vesalius* dedit *d*.

Contra retro pericardium, a prima dorsi vertebra ad iter usque oesophagi, quo transversæ septi carnes quasi perforat, iterum pleura dextri sacci a vertebra abscedens, pleuræ sacci sinistri pariter a vertebra antrorsum emergentis vicina & parallela, aliud *posterius vel dorsale mediastinum* efficit, aliquanto minus notum, æque tamen verum, & ejusdem naturæ, quam illud, vulgo cognitum, *anterius mediastinum*, cæterum longius, cum ad undecimam usque vertebra descendat *e*, illud ad quintam sextamve costam terminetur. Posterius remotæ laminæ antrorsum convergunt. Hæ sunt hymenes a vertebra dorsi natæ, & thoracem dissepientes *Oribasii f*. Inter nuperos anatomicos a *Johanne Ernesto Hebenstreit g*, *Abra-*

a Recte mediastinum duplicem pleuram esse monuit *Nicolaus Habicot* Die IV. L. VII. p. 115. edit. Belg.

b Vide T. I. arter. brachii, in qua pleura nuda est.

c l. c. n. 155. 156.

d L. VI. f. 1.

e Ibid. p. 712.

f p. 70. 72. edit. *Dundaßii*.

g In progr. de mediastino postico Lips. 1743.

homo Kaauw & Jacobo Benigno Winslow descriptum est.

§. IV. *Anterius mediastinum.*

Verum accuratius rem minus in vulgus cognitam repetere necesse est. Ergo *anterius mediastinum*, vulgo quidem, quasi alterum non daretur, simpliciter mediastinum vocatur. Obliquus ejus situs est, si minutius inquiras. Nam utraque ejus lamina a primæ quidem utriusque lateris costæ cartilagine introrsum versus sternum ita convergit, ut duorum saccorum pleuræ intervallum ad secundam costam multo quam ad primam brevius sit. Inde dextra quidem lamina in nonnullis cadaveribus, aut a sterni sinistro fine, aut omnino a cartilaginea parte costæ sinistræ secundæ, incipit descendere. Ita g* vidi porro recta adque perpendiculum posteriora petiisse, ad quintam usque costam, ad quam denuo a sinistro margine ossis pectoris, hic aliunde latioris, originem traxit, & versus mucronem cordis declinavit.

In eo exemplo omnino totum mediastini intervallum, sive cellulosa cavea, retro sternum ponebatur, & ea tota pars cavi thoracis, quæ retro sternum sequitur, ad dextrum pleuræ faccum pertinebat, omnino uti *Jacobus Benignus*

g* A cartilaginibus, non a nasci, auctor est Ill, *Senac* sterno prodire p. 5. & a sinistro. *du cœur*, p. 4. nistris etiam dextram laminam

Winslow *h*, & ex eo alii nuperi *i* scriptores docent. Quare dextra etiam thoracis cavea hic latior est *k*.

Alias vidi, hanc laminam a summa costa, ad tertiam usque, a medio sterni natam fuisse, inde ad cartilagine sinistrarum costarum declinasse. Ita, a medio pectoris osse natum mediastinum, Cl. olim *Gunzius* vidit *l*.

Alias a dextrarum costarum cartilaginibus eandem pleuræ propaginem ortum duxisse vidi, ut tamen summa pars exterior foret: inde propius sternum nasceretur, & denique ab ensiformi cartilagine, ad dexteriores venæ cavæ, cum pericardio cohæreret, medio loco inter venam cavam, & mucronem cordis.

Facile adeo dederim, & ad meas etiam observationes, variabilem pro sterni ratione mediastini situm esse, uti nuper Cl. *Martin* animadvertit *m*. Sed *Idem* sinistræ tamen oræ propius esse sumtis mensuris reperit, & ad faciem etiam sinistram sterni paulum oblique adhærere auctor est Cl. *Disdier*, ut laminæ sibi valde propinquæ sint *n*. Inconstantia causa aut in adipe esse potest, aut in pulmonis al-

h Mémoir. de l'Acad. Roy. tin Journal de medec. 1756, des. Scienc. 1715, p. 228. Ex- mars.
pos. anat. l. c. n. 29. 30.

i Garengéot Splanchnologie rivatione p. 4. Mém. des
T. II. p. 104. sav. étrang. I. p. 289.

k Winslow l. c. Cheselden in l. c.
anat. of human body L. III. n Splanchnologie. T. II. p.
c. 6. p. 172. Santorinus obs. 21.
anat. c. 8. n. 1, p. 141. Mar-

terutius magnitudine. Demum, cum laxè omnino adhæreat, ubicunque adhæret, mediastinum, ab aëre, aë manu anatomici inPELLI se patitur. Et inprimis magnum discrimen ab ordine nascitur, quo duas thoracis caveas aperueris. Quæ enim prima aperitur, ea amplior fit, & aër subeuns pulmonem quidem ad dorsum, mediastinum vero ad alterum latus impellit, ut inprimis in vivorum animalium sectionibus manifesto vidi *n**.

Eandem laminam dextram Ill. Comes Archiatorum tensam magis esse, & ad firmandum septum o transversum plus, quam sinistram conferre monuit.

Sinistra lamina mediastini utique a costæ sinistræ primæ cartilagine nascitur, eaque parte, iterum uti paulo superius dixi, longius a dextra lamina distat, & thymum in interval- lum recipit. Inde dextrorsum ad medium ster- num declinat, adque tertiam fere costam ex eo osse provenit, quoties dextra lamina a dex- tris cartilaginibus descendit. Tunc cum thy- mus aut ea sede terminetur, aut certe graci- lesceat, iterum magis sinistrorsum eadem lami- na recedit *p*, atque in quinta costâ ab ejus car- tilaginea sede ortum ducit. Alias tamen eadem lamina multo sinisterius a cartilaginibus fini- strarum costarum nata est, & recta descendit,

*n** De respirat. Exp. 12. *p* A quinta costâ Gunz 1, c.
 13. 14. &c. p. 5.
 o p. 4.

cum dextra lamina sola sinistrorsum declinaret *q*.

Alias sinistra lamina exterius quidem a cartilagine costæ sinistrae nata est, hinc introrsum descendit, trans arteriam subclaviam sinistram, ad pollicem ab ejus arteriæ origine, transque carotidem ejus lateris, & trans aortæ arcum. Ita ad secundam costam venit, adque eam, & tertiam & quartam, a sterni cum cartilaginibus confiniis nata est. A quarta extrorsum declinavit, & magis a cartilaginibus provenit, ad sextam usque, qua sede cordis erat mucro.

Finis inferior mediastini ad quintam sextamve costam in septo transverso est, ut cum pleura eum musculum convestiente confluat. Sinistra lamina ad eandem cartilaginem, qua cum osse convenit, cordis mucroni (qui dextri ventriculi finis est) & aut ibi cum pleura diaphragma tegente confluit, aut inferius etiam & exterius. Dextra lamina paulo dexterius terminatur, neque enim ea sede a sinistra longe distat.

Nam in universum quidem dextra lamina mediastini sinistrae eo propior est, quo utraque anterior sternoque vicinior; deinde inferius eædem minori intervallo distant, solaque cellulosa tela cum adipe *r* & glandulis distinguuntur: superius, & collo propius medio thymo, & glandulis & adipe dissepiuntur. Parallelas depinxit *Eustachius s*.

q Senac p. 4. Recta mediastinum descendere etiam Cl. Martin in tribus exemplis reperit.

r Walther de obes. & voc. racib. p. 7. Martin l. c. s T. IX. T. XV. f. R.

§. V. *Et posterius.*

Nunc dicere oportet, quis posterior finis mediastini sit. Et in universum posterior pars utriusque laminæ, tenuior & omenti similis, undique pericardio anterior incumbit, tenuique cellulosa tela cum eo sacco conjungitur, aut ei pro externa membrana est *t*. In tenera tamen ætate facile separatur, non perinde promte in adulto *v* homine, & in morbis sæpissime vehementer coalescit *v**. Sed ibi non manet, & ulterius mediastinum oportet persequi.

Mediastini anterioris lamina sinistra a thymo recedens retrorsum se confert, inter pulmones summumque pectus & subclaviam arteriam, accumbit ductui arterioso, & nervo octavi paris, arcuique aortæ ad arteriam pulmonalem sinistram usque insidet, estque aortæ pro externa tunica *x*.

Ita cum suprema parte pleuræ dorsum convestientis, & continuo sub arcu subclaviæ arteriæ pectus finientis, collumque ab eo separantis, ad posteriora tendendo continuatur trans totam aortæ latitudinem, ejusque ora sinistra. Ea ubi venit, jam *posterioris mediastini lamina sinistra* est. Retro aortam totus bronchus fini-

t Kaauw l. c. n. 151. 155. *lettus* auctor est de *respirat.*
v Quoties auctores scribunt, p. 277.
 pulmones cum pericardio con- *v** Cor, pericardium, me-
 natos esse, oportet pleuram diastinum, *Lieutaud Sepul-*
 cum pericardio conferuisse. *chret.* II. p. 57.
 Frequens in hydrope pectoris *x* L. II, p. 118.
 malum esse *Fabricius Bartho-*

ster inter hanc laminam dextramque ponitur, ei tamen broncho mediastinum non adhæret, neque reliquis pulmonis grandibus vasis. Ab aërea fistula glandulis conglobatis interpositis ferre separatur.

Inde porro inferius, quam sunt pulmonum vasa, ad magnam a sede, quam dixi, distantiam, inter venam pulmonalem inferiorem sinistram, & transversum septum, trans pericardium pariter, & œsophagum, cum eadem, quam nunc dixi, posteriori pleura late continuatur.

Medio inter sumnum & imum loco, anteriùs quidem mediastinum, quod pericardio instratum fuit, in pulmonis externam laminam continuatur. Posterius vero a sede arteriæ pulmonalis sinistræ, ad latus aortæ sinistram, posterior pleura, de vertebra surgens, antrorsum emergit, inque pulmonem sinistram inferitur, ut omnino possis etiam hic ponere, anteriùs mediastinum pulmone comprehenso, cui pro exteriori membrana est, denique cum posteriori mediastino trans pulmonem continuari. Ima ejus mediastini, pars trans aortam a dorso ad pulmonem venit, & trans venam pulmonalem sinistram superiorem, indeque trans ejus lateris bronchum, inde trans arteriam pulmonalem sinistram, atque ab ejus ora jam anteriùs iterum mediastinum posteriori continuatur. Ea tota sede, inter ligamentum sinistram pulmonis & inter aortæ arcum, mediastino posteriori cum pericardio nihil commune est.

Dextra lamina mediastini anterioris eodem

fere modo ad dexteriora venæ cavæ & sine pari, & superius inter pulmonem & arteriam subclaviam, trans venam cavam, extrorsum in saccum cæcum superiorem pectoris continuatur; & inferius infra venam pulmonalem dextram inferiorem, ab anteriori sede ad posteriorem pergit, ut antè mediaſtinum idem ſit cum poſteriori mediaſtino. Terminus hujus laminæ ſuperius quidem arteria pulmonalis dextra eſt. Inferioris partis fines ſunt vena pulmonalis dextra inferior, & tranſverſum ſeptum. Id inter & eam venam, ſecundum latus dextrum venæ cavæ, eadem lamina per ſacculum cæcum fertur, quem pericardium cum tranſverſo ſep- to intercipit.

Medium intervallum inter venam ſine pari & pulmonalem inferiorem dextram venam, ita ſe habet, ut lamina dextra mediaſtini abeat in membranam externam pulmonis. Sub vena pulmonali dextra inferiori, trans venam cavam & œſophagum, antè mediaſtinum, trans pericardium, cum poſteriori mediaſtino continuatur.

Si malis a poſteriori mediaſtino ſermonis initium facere, tunc quidem lamina dextra ſurgit ad dextrum œſophagi latus, deinde a ſextæ coſtæ ſede, ubi aſpera arteria dividitur, & includit primo œſophagum, deinde aſperam arteriam, & circumpoſitas glandulas. Superius vero, ad dextrum pariter cavæ venæ latus, poſterioris mediaſtini dextra lamina cum anteriori continuatur.

§. VI. *Ligamenta Pulmonum.*

Ligamentorum pulmonum, ut nonnulli vocant, conjuncta cum mediastino historia est, cujus particulæ sint. Ergo *dextrum* quidem ejusmodi *ligamentum* est triangularis plica laminæ dextræ mediastini posterioris abscedens ab œsophago, & ad pulmonem veniens. Finis enim pulmonis dextri liber fluctuat, & ad eum ab œsophago & a diaphragmate ita pleura duplex venit, ut ad aliquam longitudinem prius producat, quam ab œsophago ad pericardium pertingat. Terminus hujus ligamenti superior quidem vena pulmonalis dextra inferior, terminus vero inferior diaphragma est.

Sinistrum pulmonis ligamentum iterum ima pars est laminæ sinistræ mediastini postici, eadem triangularis, interque pericardium & pulmonem producta. Nempe pleura ab aorta recedens, & ad pericardium adfurgens, prius finem inum lobi sinistri pulmonis attingit, indeque contra seipsam redeuns, ad usque venam pulmonalem sinistram inferiorem continuatur. Utrumque ligamentum suum pulmoni involucrum inperit.

Etiam posterius mediastinum obliquum est, cum dextri facci pleura toti aortæ incumbat *y*, sinistri vero facci pleura sive lamina posterioris mediastini sinistra, a fine sinistro aortæ ad sternum elevetur *z*. Neque adeo mediasti-

y Senac l. o. p. 6.*z* Idem ibid.

num posterius in medio thorace ponitur, neque penitus vere dicitur, aortam cavea posterioris mediastini comprehendi *a*. Icon nulla mihi nota est, præter eam, quam minime studiose, vasorum occasione dedi *b*.

§. VII. *Mediastini caveæ.*

De caveis nunc mediastini dicendum est, deque partibus corporis humani, quæ his caveis comprehenduntur. Et primo intervallum laminarum & anterioris & posterioris mediastini aëre per vulnusculum inmisso mire inflatur, fere ad omenti modum, & cavea cellulosis bullis *c* plena nascitur. Experimentum sæpe feci, & olim *Vesalius d*.

In ea cavea anterioris quidem mediastini pars major thymi ponitur, cum reliqua in colum emineat, & multus adeps, & conglobatæ glandulæ, & arteriarum mammariarum trunci. Inferius latefcere lego *e*, mihi suprema fedes latissima videtur *f*. Is, quem diximus, adeps majori copia collectus hominem suffocavit, in duobus Leidenfium Professorum exemplis *g*. Eadem fere fuit atheromatis historia, quod
trium,

a Winslow l. c. n. 27. l. c. p. 206.
b Art. bronchial. fig. II. in f p. 11.
Fascic. Ic. III. g J. Antonides van der Lin-
c Couvper ad Bidloo T. 21, den physiolog. reform. p. 221.
d l. c. p. 713. Herman. Boerhaave in historis
e Winslow l. c. Garengot morbi atrocis altera.

trium, quatuorve librarum pondere, ex thorace pullulavit *h*. Sed eadem etiam ulcerum in mediastini cavea natorum sedes est, quorum pluscula exempla leguntur. Inflammatio funesta mediastini in cadavere visa est *i*, & puris in ejus caveam effusi selibra *k*. Ejusmodi ulcus sterni exciso & *Galenus l*, & nuper *Paulus Barbette m* sanavit, & aliud simillimum celebri illi *Balthasari Beckero* funestum fuisse legitur, per quod proprii cordis pulsum tangebatur, homo paradoxus. Neque dissimilem historiam *Zacutus* habet *m**. Cor etiam in vulnere nudatum vidit *Cl. Gooch m***. Est ubi sternum perforari oportuit, quo pus in caveam mediastini anteriorem effusum emitteretur. Eadem est cavea, qua perfossa omnino respiratio non læditur, *Fabricio* teste *n*. In ea vulnera & ulcera nascuntur, de quibus aer, ad candelæ accessionem, non exit, *Carpensi* auctore *Berengario o*, & in eadem glans plumbea absque malo hæsisse visa est *p*.

Recte adeo hanc caveam mediastini *Vesalius*

h *Philos. Transact.* n. 300.
i *Panarol Iatrologism.* I.
obs. 10.

k *Zod. Gall. T. II.* p. 153.
Vomica mediastini Bartholin
hist. 59. *Cent. II.*

l *Administr. Anat.* L. VII,
c. 13.

m *Oper.* p. 137.

*m** *Prax. chir.* I. p. 121.

*m*** *Gooch of wounds.* p. 337.
Habicot Journ. IV. L. VI.

n *Apud Casp. Hofmannum*
Institut. Med. p. 117.

o *In Comment. ad Mundi-*
ni anatomiam p. CCCXXVI.

p *D. de Marchettis com-*
pend. anat. p. 67.

q defendit, interque nuperos L. *Heisterus* r & *Petrus Senac* s.

Inter laminas posterioris mediastini continetur œsophagi t magna pars, cum vasis ad gulam pertinentibus, & bronchialibus, & glandulis conglobatis. In parte superiori ejusdem intervalli aspera arteria cum ramis suis reperitur v, tum arteria, & vena pulmonis, & vena sine pari, & eo, quo dixi modo, aorta.

Alia vero mediastini cavea in corpore humano non reperitur, iisque brutis animalibus propria est, quibus multi pulmonum lobi sunt. Ea retro venam cavam inferiorem posita proprium pulmonis lobum continet, & dextri pectoris quædam quasi adpendix est. Hanc caveam, a *Galeno* ita descriptam, quasi homini cum bestiis communis esset, recte rejecit, & animalibus quadrupedibus reliquit olim *Vesalius* x. Eam in variis bestiis *Parisini* academici y descripserunt, & ego, cum ad respirationem experimenta facerem, sæpe repetii z.

Recte *Vesalius*: non perinde bene, aut satis definite alii, qui intervallum duarum laminarum anterioris mediastini, quale sterni revulso aut resecto adparêt, negarunt verum & inane spatium comprehendere. Eorum primus

q p. 712. sterni longitudine esse.

r *Compend. anat.* T. II. n.

39.

s l. c. p. 5.

t *Vesal* p. 712. *Senac* p. 6.

v *Senac*, p. 6.

x p. 712.

y *Mémoire pour servir à l'histoire des animaux anat.* du lion p. 9.

z *Opuscul. anat. Tr. de respir.* I. n. 4, not. 12, p. 44.

mo arteriæ phrenicæ *f*, qui perforato septo transverso contra eam, quam modo dixi, arteriolam descendit.

Posterioris mediastini vascula sunt a thyreoideis posterioribus *g*, pericardiacis superioribus *h*, intercostalibus superioribus *i*, bronchialibus *k*, & œsophageis.

Venarum similes furculi antè ad mammarias earumque propagines, postè ad intercostales venas *l*, bronchiales & truncum sine *l** pari eunt. Addit ad venam cavam *Barbaut*.

Utilitas mediastini varia est. Præstat velamentum pulmoni, pericardium cum corde aliqua cum mobilitate sustinet, tracto enim diaphragmate omnino sequi & una trahi mediastinum certum est; pulmonem sustentat, quando in latus oppositum decumbimus: denique in vulneribus, quæ in pectoris caveam penetrant, magnum vitæ conservandæ præsidium est. Cum enim ea vulnera plerumque unicum pleuræ sacculum aperiant, collabatur equidem ejus lateris pulmo, & ad spiritum trahendum inutilis fit, non tamen continuo mors sequi-

f Ibid. not. 8. & in hist. art. renaliū p. 54.

g Fascic. III. tab. art. thyreoideid. infer. not. 1. Fascicul. III. in fig. secunda Bronchialium *i*.

h Fascic. III. ic. Vascor, bronch. not. 6.

i Fascic. VIII. p. 21.

k Fascic. III. tab. art. bronch. not. 10. Fascic. VIII. p. 21.

l Hchenstreit de mediast. postico. Fascic. III. tab. art. pect. n. 7. tab. art. bronch. not. 5.

*l** Ibid. not. 12, fig. II. n. 17. 18. 19. 20.

tur, secutura, si eadem cavea utrumque pulmonem contineret: quoties enim aëri ad ambos pulmones accessus aperitur, animali continuo pereundum est *m*.

§. IX. *Pericardium*.

Facilius *Pericardium* describitur, quando mediastinum innotuit. Proprii sacci hoc nomen est, ab ipsa re sumtum, undique clausi, aque mediastino & pleura omnino diversi, ut de mediastino, adscititio nempe pericardii velamento, ii scriptores intelligendi sint *n*, qui a pleura pericardii originem deduxerunt. Nempe pene ubique o pericardio mediastini alterutra lamina exterior inponitur, cellulosa tela non sine mobilitate cum ipso pericardii innexa, quæ fecit, ut cordis capsulam exterius propter fibrosos nexus asperam esse summi anatomici scripserint *p*. Ab ea etiam utriusque membranæ vicinia factum est, ut plusculi anatomici *q* ipsum mediastinum pro exteriori pericardii lamina descripserint. Posterius tamen utraque membrana longiori intervallo distat, neque perinde accurate a mediastino pericardium continetur *r*.

m Vesal p. 713. Conf iterim Comment. ad Prælect. Boerhaav. T. V. P. I. p. 40. 41.

n Cowper.

o Vesal p. 727, 728. Senac p. 8.

p Vesal p. 727.

q Winslow l. c. n. 82. Barbaud splanchnologie p. 222. A Kauiw l. c. n. 151. J. Frid. Cassebohni apud Glassum de sanguinis circuitu n. 16.

r Senac p. 8.

Est tamen locus, in fetu maior, ubi nullo mediastino pericardium operitur. Ejusmodi sedes est anterior, & media, quæ intervallo laminarum mediastini respondet, & cui superne thymus *s*, cum adipe, glandulis, vasisque mammariis; inferne ea ipsa, præter thymum, corpora insunt. Sed etiam posterius œsophagus inter pericardium & mediastini laminae est. Denique inferius, qua pericardium septo transverso fundatur, ea tota, lata, regio utique absque pleuræ vicinia est, quæ utrinque a media pectoris sede ad latera super septum transversum recedit.

§. X. *Adhæret septo transverso.*

Ea pars pericardii cordis faciei planiori substernitur; atque dexterius latior, ad sinistra angustatur. Insidet parte quidem latiori, aliquanto posteriori, diaphragmatis medio tendini: antè vero & ad sinistra, qua mucro cordis est, validius carnis cum tendine confiniis, tum carni ipsi *t* adhæret, qua quintæ aut sextæ costæ cartilago curvatur.

Hæc adhæsiō in fetu laxa est, ut eam facile absque læsione pericardii separare solitus fuerim. In adulto homine idem nexus strictior est, neque adeo facile absque vulnere aut sep-

s Garengeot *splanchnolog.* Morgagn. *advers. anat.* V. p. T. II. p. 128. f. I. *Icon. va-* 19. & *Epist. anat.* XV. n. *for. pect. anter. in Fascic.* III. 50 51. qua varietates describuntur. Ad 6 & 7. costæ cartilaginem Vesal p. 321.

ti, aut pericardii superatur. Cum tamen separari necesse sit, ut vasa a phrenicis truncis pericardium adeuntia persequaris, omnino facilius solvi expertus sum, si initium laboris ab ipso pericardii obtuso mucrone feceris, qui carnis & tendinis septi transversi confiniis adhæret v. Quamprimum enim, aliqua cum cura, eam partem pericardii liberaveram, reliqua tota ad cavam venam usque ejus facci portio facillime de septo transverso secedebat. Cellulosa enim tela sola utrumque velamentum conjungit, neque certe fibræ pericardii cum septi transversi fibris intricantur x.

Eadem lata pericardii ad septum transversum adhæsiō in solo homine reperiri creditur y. In animalibus quadrupedibus cor totum sterno, transversim posito, incumbit, & aliqua utique pericardii cum diaphragmate conjunctio est, sed exigua particula z, quæ mucronem cordis continet, septum attingit, eique necitur, ut omnino *Riolanus*, qui contra *Vesalium* in bove eam cohæsiōnem ad centrum septi transversi fieri defenderat a, recte ab Ill. *Morgagno* b erroris convictus fuerit.

v *Ruyssch Catal. Mus. rar.* & fusius de radice *Chinæ* p. 68. | *Winslow* l. c. n. 81. 99. 100. Situm etiam *Eustachius* exprimit T. XV. f. 2. in anteriori & dextra sede 4. arctius adhærere.

x Uti quidem *Lancisius* docuit de corde & aneurysmat codilo *Parisini*. p. 28.

y *Vesal. L. VI. f. 3. p. 728.* a *Anthropogr. L. III. c. 7.* b *Epist. anat. 15. n. 51.*

Causam hujus peculiaris in homine fabricæ *Lowerus c* a cernuo situ fetus humani deduxit. Poterat aliquanto majori cum veri specie a situ erecto deduxisse *c**, qui homini proprius est. Varia enim sunt, quæ hanc simplicissimam expositionem consilii naturæ confirmant. Non adhæret in animalibus pericardium, quia septo non innititur. Omnes in corpore humano partes diu pondere suo sibi innixæ cellulosa tela enata solent conservare, etiam diaphragma cum hepate *d*, in simillimo exemplo. Utrumque vinculum in fetu laxum, cum ætate confirmatur, quando & causa cohæsionis diutius operata est, & alioquin omnes cellulosæ telæ duriores fiunt. In pygmæo, quod animal ab homine proximo intervallo distat, & nobiscum erecto gressu convenit, pariter pericardium late cum septo transverso cohæret *e*, idemque in vespertilione obtinere lego.

§. XI. *Finis superior.*

Ab hac adhæssione pericardium undique fere in ampullæ modum adscendit, non quidem continuo *f*, sed super cordis terminos angustius, ibique circa magnorum vasorum originem con-

c I. c. c. I. p. 9, 10. Varia objiciunt *Lanciscus de cor- de & aneurysm*, p. 27. *propos*, XI. & *Thebesius de principii ration, suffic. utilit.* p. 28. hic inprimis incertum fetus situm.

*c** Etiam *Moscati* p. 25.

d Vid. *Comm. in Prælect.* T. III. p. 120.

e *Edward Tyson anatomy of a pygmy* p. 49.

f Fig. nostr. I. T. I.

tractum, ut angustiori quasi appendice ea vasa complectatur, monente viro in corporis humani anatome peritissimo *Jacobo Benigno Winslow g*, & confirmantibus aliis nuperis anatomicis *h*. In iisdem demum magnis vasis denique pericardium eo modo finitur, quo continuo dicam.

Ex hac descriptione continuo apparet, pericardii aliam quam cordi figuram esse *i*, neque recte mucronem pericardii inferiori & sinistro loco a *Vesalio k* poni, quo certe operis sui loco bruti alicujus animalis cor præ oculis habuisse videtur. Præter cor enim principia venarum cavarum, aortæ, arteriarum pulmonalium & venarum cognominum pericardio continentur *l*, ut omnino corde amplius sit *m*: duploque amplius, si Ill. viri *n* experimento credas, & integræ libræ aquæ, aut ultra capax *o*. Neque ob vasa sola, quæ præter cor continet, eo viscere amplius est, sed ita omnino cor complectitur, ut eum inter musciculum & pericardium aquæ, quæ perpetuo ad est, locus, & mobilitati cordis spatium para-

g l. c. n. 80.

h *Senac* l. c. p. 7. *Garengeot* l. c. p. 119. 128. & f. 2. quæ graciliorem appendicem exprimit, non perinde vasa magna, quibus pericardium innascitur.

i Monet etiam R. J. C.

Garengeot l. c. p. 116.

k l. c. p. 727.

l *Eustach T.* XV. f. 2.

m *Winslow* n. 76

n *Senac* l. c. p. 7.

o *Fanton anat. corp. hum.* p. 276. Addit & alteram libram.

tum sit, quod olim *Galenus* *p* animadvertit, & alii anatomici suis iconibus *q* exprefferunt.

§. XII. *Anterior.*

A sterno in parte superiori, & in regionis inferioris fede media pericardium nullo intervallo distat *r*, & ejus ossis partem cavam ita replet, ut ipsi suam convexitatem inprimere videatur. Sed præter hanc mediam inter dextras sinistrasque partes regionem, latera sua ab osse pectoris, mediastino & pulmone separata habet. Nempe si pulmones, etiam exemptos, vehementer inflaveris, tunc aut omnino totum pericardium complectuntur & abscondunt, aut minimam imam, mediam & anteriorem particulam nudam relinquunt. Sed etiam post mortem pulmones, cum ad pleuram undique adhæsisent, se pericardio & sterno interposuerunt, ut nusquam is sacculus ad os pectoris perveniret *s*. In cadavere vero plerumque, quando incisoris manus nihil omnino mutavit, neque in pulmonem flatum inpulit, utique pulmo dextri lateris ita se de corde retrahit, ut & mucro dextræ auriculæ, & cordis pars dextra & anterior nuda sit. Ita fere vulgo describitur *t*, sæpius

p Apud *Oribasium* l. c. p. 88.

r *Vesal* p. 727.

s *Opuscul. patholog. obs.* 16.

q *Vesal* L. VI. fig. 4. *Arent Cant. impet. anat.* Tab. IV. *Eustach* l. c. comparando cor figuræ 2. cum pericardio f. 4.

t Confer v. c. *Johannes Astruc* vir doctiss. in thesi ad hæc verba *Ego ex anatome subtiliori ars medica certior.*

tamen nimis magna portio cordis nuda depingitur *v*, quale adparet, quoties aër in pectoris aperti caveam admissus pulmones conpressit, & ad dorsum repulit. Non satis etiam vere cor nudum costas ferire dicitur *x*, & pulmonem sinistrum pro mucrone cordis quasi excisum esse *y*. Cum enim pulmo in vivo homine totum semper pectus repleat, ita pericardium describi oportet, uti se habet, quando pulmo ab aëris externi adflatu liber per pectus expanditur.

§. XIII. *Ut adhæreat vasis magnis: Anterius.*

Quomodo pericardium ad cordis sinus & magna vasa adhæreat, nondum satis plene dictum est, neque fere dici potest, nisi hunc faccum a diaphragmate liberatum, per exiguum circa mucronem incisum vulnus inflaveris, circa inmissum tubulum vero filo vinxeris, ut aërem retineat: quæ quidem administratio in tenerioribus pueris non facilis quidem, nec tamen penitus impossibilis est. Quare ad meas observationes sibi comparatas hos fines describam, etiam icone adjecta, cum res vulga non nota sit.

Anterius res satis facilis est, & plerumque fere vulgo nota. Nempe pericardium adhæret primum, ut a dextris initium fiat, venæ pul-

v A Vesalio v. c. L. VI. 240.
f. 2. Eustachio T. XVI. f. 1. *y* Disdier splanchnologie T.
x Barbaut splanchnologie p. II. p. 60.

monali superiori dextri lateris, ejusque ramo inferiori, & cum ea vena cellulofas plicas ad pulmonem mittit. Hæc adhæfio posteriori loco ponitur, & a vena cava fere absconditur *z*.

Inde ad venam cavam superiorem transit pericardium, ejusque radici, fere qua de aure prodiit, in univerfum pene transverfum innascitur, ita tamen, ut adhæfionis linea finistrorsum adscendat *a*, Vidi etiam potius in principio adscendisse, inde ad oram venæ cavæ sinistram descendisse. A vena cava idem ad aortæ truncum transit, cui fere ad dimidiæ lunæ modum adhæret, superiori loco *b*, quam quidem cavæ venæ, & pene toto pollice superius. Prima adhæfio, quæ dexterior, eadem suprema est, ad eam sedem aortæ, ex qua arteria subclavia dextra prodit *c*, prope summam aurem dextram. Inde finistrorsum descendit *d*, ad oram inferiorem nascentis aortæ; ab ea vero sede transverfum *e* sive horizonti parallelum, in ejus principis arteriæ truncum innascitur; porroque iterum adscendit *f*, semperque finistrorsum una tendit, versus arteriæ pulmonalis confinia, atque in anteriorem partem radicis ductus arteriosi se infigit *g*, cujus ductus

z Hinc non adparet in T. XVI. f. 2. *Eustachii*, & etiam minus in nostra.

a *Eustach.* T. V. f. 2. Conf. etiam *Fascic. nostr.* III. Tab. art. pect. Transversam lineam pinxit *Lanciscus* l. c. T. I. ad K.

b *Lanciscus* l. c.

c Fig. I. nost. M. *Eustach.* T. XT. f. 2. 4.

d Fig. nostr. N. *Eustach.* T. XV. f. 4.

e Fig. nostr.

f Ibid. sub F. ad O.

g Ab O ad P.

aut totam longitudinem; aut portionem alias majorem, & minorem alias, sua cavea continet; ita lunæ crescentis finistrum cornu absolvit, quod dextro cornu aliquanto humilior, angulum pene rectum cum eo efficit.

Hinc vel ad arteriam pulmonalem, qua ex ejus trunco ductus arteriosus prodit, vel etiam exterius ad ramum ejus arteriæ finistrum *g*^{*} pergit, sursum eundo, aque ea arteria fere recta deorsum ad venam pulmonalem ejus lateris tendit *h*, & superiori, & inferiori trunco innatum, proxime divisionem.

§. XIV. *Posterius.*

Hic ultimus finis finistri & anterioris limitis pericardii est. Posterior, multo difficilior, eo modo se habet, quem nunc dicam, initio denuo a dextris facto.

Ad venam pulmonalem superiorem dextram & inferiorem pericardium innascitur *i*, & in utriusque intervallo ad membranam sinus finistri. Pars ejus venæ intra sinum est, pars extra eum.

Inde pergit transversum, adque sinum finistri cordis accedit, qua arteriæ pulmonali vicinus est. Huic sinui, ejusque velamento, undique pericardium continuatur, sive, quod

g^{*} Ad truncum ejus arteriæ communem *Lancisus* l. c. fig. nost. I. K. *Eustach.* T. XV, f. 6.
h Fig. nost. I. ad L.

i Ad initium rami finistri

perinde est, exteriori ei sinui membranam suppeditat. In ea linea nonnulli cæci sacculi & frenula reperiuntur.

Accedit nunc ad communem originem venarum pulmonalium sinistrarum, atque ad eam originem, aut ad utramque etiam venam pulmonalem ejus lateris, adhæret, ut omnino modo unico ibi, & modo duobus *k* foraminibus pericardii sacculus pateat, nempe eo modo pateat, quem exponemus.

Supra venam pulmonalem sinistram pericardium porro radici auriculæ sinistræ adhæret, indeque ad anteriorem earum venarum sedem redit.

Ita se habet, donec ea cellulositas superest, qua ad radicem auriculæ sinistræ pericardium adligatur. Ea vero soluta adparet, pericardium ab ipso sinu sinistro ulterius produci, atque versus truncum arteriæ pulmonalis adscendere. Ita inter adhæSIONem cellulosam, qua pericardium cum sinu sinistro confervet, & inter posteriorem adhæSIONem, qua ad arteriam pulmonalem adnascitur, sacculus cæcus intercipitur. Verum id, quod dico, velamentum ad arteriam pulmonalem *l* pervenit, omnino ad dexteriores orientis rami sinistri hujus arteriæ, ut tamen nonnunquam ad eum ramum extendatur, non tamen ita longe. Immittit se vero toti faciei posteriori arteriæ pulmonalis dextræ *m*, ad origi-

k Ut in fig. nostr. secunda ad Z. *Albini* Fig. nostr. II, D, R. L.
l *Eustachius* T. XV. f. 6. *m* Fig. II, ab R. ad Q.

nem usque rami inferioris hujus trunci, indeque sensim ad ramum superiorem, paulum ad exteriora.

A pulmonali arteria pericardium ad aortam venit, supra ramum dextrum pulmonalis arteriæ, ad latus dextrum & posterius ductus arteriosi, quem uti antè, alias totum, alias majorem, alias minorem ejus portionem comprehendit. Ab ea sede fere transversim faciei posteriori arcus arteriæ aortæ innascitur *n*, sub origine trium magnorum ramorum *o*, ab ingressu ductus arteriosi *p*, ad usque exitum arteriæ subclaviæ dextræ.

Ex hac, & ex anteriori pericardii ad aortam adhæsione, fit anulus, quo eam arteriam & pulmonalem pericardium comprehendit *p*^{*}: nempe circularis omnino limes pericardii excludit partem exiguam inserti in aortam ductus arteriosi, tum tres ramos illos notissimos, quos de arcu suo aorta emittit, ut toti extra pericardium & antè *q* ponantur, & posterius *r*. Ita porro ramus sinister arteriæ pulmonalis extra pericardium est *s*, & dextra pars *t* alias major, alias exigua.

n Flatu utique hæc adhæ- *grandes artères. Lieutaud Mém.*
sio turget P. Q. O. sed ta- *de l'Acad. 1752. p. 257.*
men transversa est, etsi in *q* *Eustachius* l. c. Fig. 4.
arcum ducitur. Transversam *Fig. nost. I. E.*
pingit *Eustachius* l. c.
o *Eustachius* l. c. d. *r* *Eustach. f. 6. fig. nostr.*
p Excludit eum *Eustachius* *II.*
l. c. ad c. *Albini.* *s* *Fig. nostr. II. R. F.*
p^{*} *Gaine donnée aux deux* *t* *Ibid. L.*

Ut res obscura facilius intelligatur, relegendus hunc anulum. Incipit a limite dextro anteriori aortæ *v*, pergit ad initium usque ramus sinistri arteriæ pulmonalis *x*, redit posterius per arteriam pulmonalem dextram *y*, ad usque eundem ramum sinistram *z* arteriæ pulmonalis, & ad oram dextram aortæ *a*, a qua profectus est.

Non ideo totus ambitus aortæ a pericardio tangitur, & fere una quarta pars totius maximi circuli hujus grandis arteriæ nuda est, sineque pericardio, qua nempe pulmonali arteriæ obvertitur, eaque sede omnino sola cellulosa tela duas eas principes arterias colligat.

Qua sede pericardium posterius aortam amplectitur, ea ramo utrique asperæ arteriæ incumbit; non tamen iis cohæret, nisi cellulosæ telæ ope.

§. XV. *Pericardii Cornua, Foramina.*

Anulum & adhæSIONem pericardii ad aortam diximus. Ab ea pergit idem ad venam cavam superiorem, & ei posterius, deinde antèrius adhæret, atque ita circulum circa eam venam absolvit, cui proprium adeo in pericardio foramen est.

Inde

v Fig. no 3. I. M. ad. N. *z* Ibid. F. Q.
x Ibid. ad K. *a* Prope E.
y Fig. II. R. P.

Inde redit ad arteriam pulmonalem dextram, & ad venæ pulmonalis dextræ superioris divisionem porro tendit *b*, cui, in principio nascentium ramorum, adhæret.

Ab utroque latere anuli, aortam & pulmonalem arteriam continentis, cavea pericardii anterior cum posteriori continuatur, viaque libera est, quam flatus percurrit, hinc quidem inter aortam cavamque venam *c*, interque arteriam pulmonalem dextram & ejus lateris aurem; inde inter venam pulmonalem, & sinistram ejus lateris aurem *d*, ad latus arteriæ pulmonalis; nam inter hanc & sinum sinistrum cæcus finis est.

Supereſt occulta adhæſio, ſed præcipua. Nempe a vena pulmonali dextra & ſuperiori, & inferiori (inter utramque inane ſpatium liberum ſupereſt) pericardium pene recta deſcendit, ad venam cavam inferiorem *e*, quod intervallum quidem non magnum eſt. Sed ea tota tamen ſede pericardium auriculæ dextræ cum ſiniſtra confiniis adhæret, ut vix ſatis recte dici poſſit *f*, inter duas venas cavas liberum eſſe. Inferiorem demum venam cavam omnino in circulum ambit, non quidem muſculofis fibris ei connatum, ut nimis ornate Cl. viri *g* ſcripſerunt, ſed tela utique cellulofa.

Atque adeo ſex ſeptem vel octo foramina

b Ad. M. N. f. 2.

c f. 2. P.

d f. 2. O.

e Lanc. T. II. f. 1. ad G.

f Sendac p. 13.

g Lanciſius l. c. p. 24. 25.

T. I. Q.

sunt, si recte ea voce utimur, quibus pericardium patet. Primum est venæ cavæ superioris, alterum aortæ & arteriæ pulmonalis trunco commune, tertium venæ cavæ inferiori proprium. Deinde arteriam pulmonalem dextram transmittit, tunc venas pulmonales dextras, & denique sinistras. In his venis incertus numerus est, ut in uno latere modo unicum pericardii foramen sit, alias duo. Quinque *b* vero foramina non recte numerantur. Eorum ubique ea natura est, ut nihil quidquam ex cavea pericardii effluere queat. Pericardium nempe ad magna, quæ dixi, vasa adhæret, & reflexum, in eorum membranam externam abit *b**, utique adtenuatum, & denuo tene-rius, quando ab iis vasis se super cordis carnem diffundit, eique visceri pro extimo velamento est. Exterius vero pericardii facies cellulosa, in similem telam continuatur, quæ exterior *b*** venam cavam *i*, aortam *h*, arterias pulmonales *l* venasque comitatur, *vaginæ* nomine a nuperis anatomicis ornata, qui nimis firmam, membranæque veræ similem pinxerunt.

Supereſt, ut paucis hiftoriam hujus facci

b Vesalius, P. Noguez &c. 187.

*b** Lancisius l. c. p. 23. *i* Gerard. Blas in miscell.
 Abrah. Kaauw Boerhaave l. anat. p. 228.
 c. n. 152. & in Comment. *k* Lancisius p. 25.
 Acad. Petrop. Nov. T. 1. p. *l* Lancisius T. I. K. K. K.
 364. 365. Senac p. 8. 13. Bar- T. II. f. I. K. K. f. 2. A.
 baut l. c. p. 223. A. Prop. VII. p. 24. Kaauw
*b*** Senac, p. 14. 15. 186. de perspir. hipp. n. 155.

perficiamus. Ex iis nempe, quæ diximus, & ex ea fabrica, quæ flatu impulsio detegitur, sequitur, duo anteriora pericardii cornua esse, & posteriora totidem: quæ cornua totidem cæci sacci sunt, qui flatum impulsum continent.

Cornua posteriora, nondum quidem, quantum novi descripta, sunt ejusmodi. Alterum sinistrum, breve est, & fit ab adhæsione pericardii ad radicem rami sinistri pulmonalis arteriæ & ad ductum arteriosum adnati *m*; ea vero adhæsiō continuatur a trunco ejus arteriæ, sub ductu arterioso, & antrorsum sub ramo sinistro, & circa sinistra ductus arteriosi, indeque sursum per arteriosum ductum.

Alterum, cornu, dextrum, longius *n*, ad dextra rami sinistri pulmonalis arteriæ est, qua pericardium latissime ad aortam adhæret.

Inter hos duos cæcos fines pericardium inferius adhæret, ad radicem subclaviæ arteriæ dextræ, ita nascitur semilunaris o quasi inflati pericardii sinus, cujus cornua sursum respiciunt.

Anteriora cornua notiora sunt, ut tamen a nuperis scriptoribus in unicum *p* cæcum apicem conjungantur. Sed omnino duo sunt. Dextrum *q*, altius est ad exteriora aortæ, ad unicam ab arteriæ subclaviæ dextræ lineam, hanc inter & cavam venam.

m f. nostr. 2. O.

n Ibid. P.

o Ibid. P. Q. F.

p Garengeot T. II. p. 128.

f. 2. Senac T. I. p. 7.

q Fig. nostr. I. M.

Sinistrum aliquanto humilior fit ab adhæ-
sione pericardii in aortæ oram sinistram, quæ
ad anteriora & dexteriora ductus arteriosi po-
nitur, & eadem altissima est. Cum dextro cor-
nu conjungitur per eam lineam, quæ in pe-
ricardii ad eam arteriam insertionem imo loco
est, & conjuncta hæc duo cornua perinde se-
milunarem figuram inflata efficiunt *t.*

Cæci etiam sacci varii sunt, inter sinum
sinistrum & pericardium, inter duas venas pul-
monales sinistras, dextraque duas: inter arte-
riam pulmonalem dextram venamque cavam;
inter istam & aortam; inter arteriam pulmo-
nalem & venam sinistram.

§. XVI. *Natura pericardii cellulosa.*

Diximus pericardii limites, sequitur ut na-
turam ejus sacci exponamus. Firma, alba fi-
brisque destituta membrana est, quæ ex stipa-
ta cellulosa tela facta, in fila etiam cellulosa
per macerationem resolvitur *v.* Adeo robustum
est, ut omnes membranas corporis humani ea
vis superet, qua ruptioni suæ resistit, quando
ab impulso aëre distenditur. In cane certe sex
atmosphærarum pondus cum 18. centesimis tu-
lit *x.*, in quo animale ejus crassities est unius
413mæ partis pollicis: cum in homine aorta,

v. Ibid. 10.

s. Ibid. N.

t. Ibid. 10. N. M.

v. Schobinger l. c. p. 71.

x. Clifton Wintringham in-
quiry into some parts of the
animal structure p. 140.

toties craffior, quatuor tantum atmosphærarum pressionem toleraverit cum 7 decimis *y*. In oviparis quadrupedibus valde robustum est, ut in testudine *z*; & crocodilo *a*, tum in cognatis reptilibus, ut in serpente *b*, robustissimum pariter in piscibus. In anguilla durum & splendidum, tendineo simile, coram video: in aliis cartilagineis piscibus *c* & in raja *d* fere cartilagineum, in lampetra denique *e* omnium totius corporis partium durissimum, & solum inter omnes membranas ossæ naturæ particeps factum est. Æquum est creditu, in his animalibus firmius factum esse, cum nullo diaphragmate fulciatur, & cordi tuendo alias nullæ, alias cartilagineæ debilesque costæ præfectæ sint. In homine etiam antèrius fortius est, quàm circa sinum sinistrum, qua sede, & supra eum sinum, qua arteriis grandibus adhæret, tenuius reperi.

§. XVII. *Lamina unica.*

Perinde ut alia in corpore humano ma-

y Idem p. 49.

z *Parisini* in dissectione ejus animalis. *crit.* p. 369. 370. in harengo *Leipziger Abhandlungen* T. IX. p. 121.

a *Borrich* de hermetica Ægypt. sapientia. p. 276. *Hamel* de herniis p. 107. *d* *Sam. Collins* System. anat. p. 776.

b *Verduc* tr. de l'usage des parties T. II. p. 68. *e* *Bronzer* in libello de calido innato & principatu jecoris, *Rhodii Mantiss.* anat. obs. 22. *Bellin* discors. anat. T. I. n. 5. p. 59. *Power* obs. microsc. II. Blas anat. anim. p. 279.

c Conf. du *Hamel* historia Academ. Reg. Scientiar. p. 67. *Hill* of animals p. 113. In muræna *Severin Zoot. Demo-*

gnarum cavearum velamenta, ut pleuram, & peritonæum, ita pericardium unica membrana fieri reperio, si mediastinum removeris. Ea vero membrana utique, ut eæ, quas nunc nominavi, exterius cellulositate aliqua efflorescit; intus, qua cor continet, levissima & densior apparet. Cellulosa fila vascula irretiunt, & nervi per quosdam quasi canales pericardii ad cor veniunt, pericardio insculptos, filisque cellulosis clausos. Interius, si diduxeris, fibras hujus generis intricatas facile invenias, maxime si maceratio accesserit.

Nominibus magis, quam ipsa re, aliqui recentissimi scriptores a nobis dissentiunt. Nobiscum fere sentit, & unicam veram pericardii laminam admittit Cl. *Disdier f.* Ill. *Lieutaud*, comes nunc archiattrorum gallicorum, tendineam membranam distinguit, & tenerum interius velamentum, & cellulosam telam, quæ utramque membranam uniat. Porro in majoribus & senilibus corporibus tendineas fibras admittit, quarum equidem nullus certus ductus sit, quæ ipsæ cum tendineis fibris diaphragmatis continuentur. Verum ego quidem nihil ultra vidi. Exteriorem laminam *Portalius* retinuit. Ill. *Senacus*, præter mediastinum, duas equidem in pericardio tunicas numerat, sed internam ægre separari fatetur *g*, & de externa, firmiori quidem, recte negat, musculi in

ea naturam esse *b*. Similia, aut propiora nostris *Abrahamus Kaauw* docuit: qui præter mediaſtini adſcititium velamentum *i*, & intimam, cordis operimento continuam *k* tunicam, teneram utramque, aque mediis vasis ſeparatam *l*, nihil etiam in elephanto *m* reperit, niſi cellulofam telam, quæ præcipuum pericardii robur faciat. Neque pericardium, aut a ſcalpello, aut ab oleo vitrioli irritatum, naturam contractilem demonſtrat, uti quidem certe demonſtraret, ſi muſculoſæ naturæ particeps eſſet *n*.

Alii anatomici utique minus ſimplicem facci noſtri hiftoriam dederunt; & inprimis *Lancifius*, præter externam & internam tunicam, mediam utique laminam muſculoſam deſcribit, cujus fibræ aliæ rectæ ſint, & a baſi ad cordis mucronem excurrant *o*, aliæ tranſverſæ *p* illas decuſſent: earumque porro fibrarum addit, alias quidem firmiſſime in ſeptum tranſverſum ſe inmittere, alias ad latera tæniæ terminari, quæ mediam pericardii longitudinem dividat.

Hanc muſculoſam pericardii naturam apud *Albertum Kyperum q* reperio, qui his fibris eam fere directionem tribuit, quæ cordis eſt.

b p. II. 12.

i De perſpir. n. 151.

k n. 152.

l n. 157.

m Nov. Comment. Acad. Petrop. T. I. p. 370.

n Zimmermann de irritabilitate p. 4. 5.

o l. c. Prop. V. p. 22.

p T. III. f. 2. l. 1.

q de humore pericardii n. 20.

Deinde *J. Wilhelmus Pauli* fibrarum duos ordines se decussantes descripsit, quæ fortem membranam efficiant *r*, Et in mediastino; inque pleura, vastissimi animalis & musculofarum striarum stratum nuper vir inprimis curiosus *Stellerus* reperit. Denique *Jacobus Benignus Winslow* & tres laminae pericardii numerat, & mediæ, a qua firmitas totius sacci pendet, fibras tendineas, intricatas tribuit *t*. Tendineam membranam & fibras tendineas habet vir Ill. *J. Lieutaud* *t**. Nuper Cl. *Sabbatier* spasmodicam pericardii constrictionem admisit *t*** ; verum neque tendo convellitur, neque tendinei quid in pericardio humano est.

Porro idem, quem modo citavi, *Johannes Wilhelmus Pauli* siphone suo, & aqua inter fila cellulosa impulsâ, quinque omnino in laminae pericardium divisit, & totidem in morbofo corpore tunicas vidit Ill. *Senac* *u*. Verum siphonis quidem vis omnes membranas in numerosas laminae separat, incerti numeri, quas nullo cultro distinguas. Nos eas solas pro diversis tunicis numeramus, quæ & cultro separari possunt, & diversam fabricam nactæ sunt. Morbos fallere ipse pro ea, qua est prudentia, *Senacus* *x* monet. Cellulosa de-

r In progr. de siphone anatomico Lipsi. 1721. edito, & recuso in collect. nostr. T. VI.

s Manati Comment. Nov. Acad. Petr. T. II. p. 314.

t l. c. n. 79.

*t** Mém. de l'Acad. 1752. p. 251. seqq. *Essays d'Anat.* p. 187.

*t*** *Anat.* p. 135.

x l. c. p. II.

x Ibid.

nique fila esse; quæ in aqua fervida, aut in aceto macerata, robur aliquod induerunt, aut ruborem in maximis & valde sanguineis animalibus accipiunt, & ipse adnotat *y*, & res ipsa me in humano pericardio docuit, quod ego quidem in duas distinctas tunicas nunquam, & multo minus in diversæ fabricæ tunicas separare potui. In vivo animale pericardium non contrahi *Chiracus* testis est *y**.

§. XVIII. *Arteriæ, Venæ, Nervulæ.*

Arteriæ, venæ, nervique pericardii a multis & exiguis trunculis nascuntur, quam non dudum diximus, naturæ consuetudinem in omnibus vastioris ambitus membranis esse. Arteriæ anteriores aliæ sunt, aliæ inferiores, aliæ posteriores.

Illarum pleræque, & quotquot superiorem mediâque sedem tenent, ex mammaria arteria nascuntur, exque earum ramis mediastinis *z*, eoque, qui nervum phrenicum comitatur *a*, exiguo omnino trunculo. Quæ inferiori loco ponuntur, eæ partim ex ramo phrenicæ arteriæ, cum nervo cognomine in pectus recur-

y Ibid. p. 12.

*y** *Advers.* p. 49.

z Minores superiores *fascic.* III. p. 24. not. 6. tab. eo loco pos. *g. fascic.* VIII. p. 20. 21. *Ruyfch Epist.* II. T. II. f. 3. 4. *Senac* p. 17. *Kaauw* n. 656. 3. 4. Inferio-

res majores *fascic.* cit. p. 14. *fasc.* VIII. p. 20. Tab. ead. 3. 21.

a Fascicul. cit. n. 7. in tab. *b. k. Senac* p. 17. Est pericardio diaphragmatica, *Ruyfch* l. c. D. qui nimis magnam pingit.

rente *b*, prodeunt, partim ex aliis phrenicæ ramis *c*.

Sed etiam arteriolæ, quæ faciem planam, diaphragmati innatam, pericardii adeunt, et quidem multis trunculis a ramis phrenicæ *d*, ex tendinea parte carneaque diaphragmatis exeuntibus, ortum ducunt. Has *Ruyschius* imprimis ornavit *e*. Aliæ contra ex pericardio in septum transversum declinant *f*, quas inverfo nomine pericardiaco phrenicas dixeris. Omnes, ut in membranis solent, in retis speciem implicantur *g*, ut ab una in omnes mutuus consensus, sanguinisque liber commeatus pateat.

Posteriorès arteriolæ pericardii primæ quidem sunt ab eo trunculo, quem plerumque in sinistro latere arteria subclavia, aliquando tamen aortæ truncus, nonnunquam mammaria edit *h*. Aliæ, medio fere loco a bronchialibus veniunt *i*, quas alii clari viri, non ideo a nobis diversa docentes, ab intercostalibus derivant *k*. Valde enim perinde est, sive bronchialem arteriam dixeris, sive intercosta-

h In eod. fasciculo n. 8. Tab. cit. 1. & hist. art. renal. p. 54.

c Hist. art. ren. ibid. Ex œsophageis Mém. des sav. étrang. I. p. 291.

d In phrenicæ imprimis sinistra historia hist. art. renal. p. 54. Cowper ad Bidloo T. 21. Nicholls l. c. p. 18. Kaauw n. 656. 2. D. de Marchettis compend. anat. p. 7.

e Ep. 11. T. 11. f. 4. B. B.

f Conf. Senac l. c.

g Ruysch ic. cit.

h Tab. art. bronch. h. & not. 6.

i Ibid. not. 7. 9. Fascic. VIII. p. 21. 22. Nicholls p. 18.

k Kaauw n. 656. 5. Senac p. 17.

lem, quæ partito trunco & pulmonem adit *l*, & spatium costis interpositum. Rarius genus est, quod ex ipso pulmone prodit, & pericardium adit *m*. Aliæ, & plussculæ ab œsophageis *n* prodeunt; aliæ denique aut a coronariis veniunt *o*, aut certe ii rami, quos coronariæ arteriæ ad magnorum vasorum truncos mittunt, cum iis varie inosculantur, qui a bronchialibus, aut a supremis pericardiis, ad pericardium accedunt *p*. Exiguæ cum sint arteriolæ, quascumque pericardium accipit, addit tamen *Senacus*, trunculos in superficie membranæ externæ majores, minores vero inter duas laminas veriores, nempe in ipsa sua substantia habere *q*.

Venæ pericardiæ eunt ad trunculum nervi phrenici comitem *r*, ad alias mediastinas *s*, thymicas *t*, pericardiacas supremas *v*, ad bronchiales, intercostales superiores *x*, ad venæ sine pari ramos mediastinos & œsophageos *y*, ad phrenicas *z*. A coronaria vena ramum ingentem pericardiacum derivat *Vieussenius a*, mihi quidem ignotum, cum sæpissime venas

l Ramus, qui pulmonem adit, potius major est.

m *Fascic.* VIII. p. 22.

n *Tab. art. bronch.* not.

10. *Fascic.* VIII. p. 22.

o Dicentur in cordis historia *sect.* III.

p *Tab. bronch.* not. 9, *Fascic.* VIII. p. 21. 22.

q p. 16.

r *Tab. arter. pect.* i. & n,

7. *tab. bronch.* not 5. *Senac* p. 18.

s *Vesal* p. 718.

t not. 9. *Tab. art. pect.*

v *Ibid.* not. 6. p. 35.

x *Tab. art. bronch.* n. 5. p. 34.

y *Ibid.* not. 12.

z *Tab. art. renal.* p. 16.

a *Tr. du cœur* T. V. p. 2.

coronarias, aëre, aqua tincta, cerave colorata repleverim. Sed neque ea vena pericardiaca mihi innotuit, quam a cava vena *b* alii clari viri derivant, & quæ omnino mihi minus probabilis videtur, cum nullum a cava vena nascentem ramum credam me prætervidisse, nisi superiorem pericardiacam velis, quam modo dixi, & quæ in cavam venam superiorem, aut in mammariam, aut in subclaviam sanguinem refert. Sed neque eæ venæ mihi innotuerunt, quas ex aure dextra *Lancisius* educit *c*.

Lymphæ ductus, quos ad ductum chyli ferum thoracicum *Comperus d* refert, ego quidem ad eas glandulas remitto, quas continuo describam.

Nervi multi quidem pericardium penetrant, ad cor ituri: in eo sacco pauci manere videntur *e*, neque satis noti. Hinc obtusus ejus sensus, aut nullus est *f*. Hinc forte fit, ut pericardii vulnera absque magnis symptomatibus sanentur *g*.

§. XIX. *Aqua pericardii rejicitur.*

Pericardii utilitas dici nequit, nisi aquam ejus facci exposueris. Antiquissima res est,

b Dextram inde venam pericardii derivat *Senac* p. 18.

c T. V. m.

d l. c.

e Conf. hist. nervorum cordis in sect. III. L. IV.

f *Prem. Mémoire sur les*

parties irritables & sensibles p. 35. Ita Cl. *Carrere in Ann.* p. 470.

g *Rhodius Centur. II. obs. 38. Vesling apud Bartholinum in anat.* p. 350.

dicta *Hippocratico* auctori libri *de alimento*, deinde *Galeno*. Non ideo non a multis, aque celebribus, omnino viris impugnata fuit, quorum experimenta non oportet dissimulare, etiam quando nostris contradicunt. Ita in avibus in universum pericardium siccum esse, auctor est *Volcherus Coiter*, non contemnendus anatomes comparatæ scriptor *h*. In falcone nullam reperit *Johannes Muraltus i*. Alii in quadrupedibus incisis nullam viderunt *k*; alii ne in homine quidem. Omnino nullam esse, aut certe non superare unam alteramve guttam, *Schneiderus l* auctor est: præter naturam esse *Bohnius m*, & *Dionis n*, & a morte generari *Ill. Lieutaud*. Sed etiam in hominum ægrotorum cadaveribus nulla fuit, si claris viris fides est. Post subitaneas mortes testimonia adsunt *Georgii Hieronymi Welschii o*, *J. Theodori Schenkii p*, & *P. Dionis q*. Non in omnibus corporibus reperit *J. Lieutaud q**: neque in fatuis omnibus *q** Cl. Greding*. A violenta morte nul-

h *Obs. anat.* p. 131.

i *Vademecum anatomi.* p. 346. *Lieutaud*.

k In cane *Drelincourt Canicid.* 17. *Dionis cours d'anatomie* p. 418. 420. in leone *Serao Neapel.* 1764. 4. In lacerto *Tockaye Jesuitæ Siamenses* in suis *obs. de mathem. & de phys.* p. 51. Negant laniones bobus inesse *Verduc de l'usage des parties T.* II. p. 63. seqq.

l *De catharris L.* II. p. 99,

m *Circul. anat. Progygn.*

XX. p. 383. de *lethalit. vulner.* p. 130. Ex eo *Verduc de l'usage des part.* I. c.

n I. c.

o *Observ. episagmat.* n. 35. qui ægrotus ex ira perierat *P. C. Fabricius progr.* 1759. p. De sero sanguinis p. 26.

q I. c.

*q** *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 267.

*q*** *Greding apud Ludwig advers.* II. p. 4.

lam in suspenso pericardii aquam vidit *Johannes Palfyn r*, in suffocato & in decollato alii *s*. In morbis acutis, ut in ardente febre *t*, hydrophobia *v*, dysenteria *x*, pleuritide *y*, phthificis *y*^{*}, in convulsis *y*^{**} demum & peripneumonici alii clari viri negant se vidisse. Denique in lentis morbis alii nullam reppererunt, cum steatomatibus aortæ *z*, in febre hectica *a*, morbo hypochondriaco *b*, & hydrope *c* etiam ejus generis, in quo aqua in pectoris cavea colligitur *d*. Ea exempla cum nostris evidentissime pugnant.

§. XX. Confirmatur.

Ego quidem minime repugno, quin ea aqua magis in cadaveribus hominum lenta morte extinctorum abundet, & parcior in iis sit, quos subita mors oppressit, uti fere *Spigelius* e olim monuit, deinde *J. Adamus Kulmus* f. Sed

r *Anatom. chirurgie.* p. 271.

s *Schurig. hæmatolog.* p. 362. *Verduc* l. c. p. 65. in decollato.

t *Dominicus Panarolus Pentecost.* I. obs. 31.

v *Codronchus* de eo morbo p. 79. ex *Capivaccio*. *James* canine madness. p. 65.

x *Riolanus anthropograph.* p. 219.

y *Lancisius* l. c. p. 38. addit plerumque desiderari. *Planctus* app. ad acad. conject. p. CIII.

y^{*} *Biumi.*

y^{**} *Morg.* sed. caus. II. p. 410.

z *Stenzel* de steatomat. aortæ p. 9. 10.

a *Zod. Med. Gall. T. I.* p. 128. *Act. Liter. Suec.* 1726. p. 135.

b *Schneider* de corde p. 13.

c *Saviard* obs. 55.

d *Bartholin hist.* 50. *Centur.* I.

e *Anatom.* p. 270. 271.

f *Tabul. anat.* p. 75.

neque id ignoro, aut diffimulo, in fetu humano, inque puero nuper in lucem edito, hanc lympham & copia superare, & colore rubicundiori esse, quod quidem sæpe observavit noster olim Præceptor *Johannes Georgius Duvernoi* g, passim vero & alii confirmant h.

Verum etsi alias uberiores esse, malignius alias apparere dederim, non possum tamen, quin ex meis numerosissimis experimentis in vivis animalibus, inque hominum cadaveribus toties repetitis, firmo animo statuum, nunquam aut in ave, aut in quadrupede, me pericardium absque aqua reperisse.

Numerosissima sunt virorum, qui nobiscum similia viderunt, testimonia. Ergo certo visa est aqua in plurimis animalibus h*: in pericardio limacis i, cochleæ i* & mytuli k, de vermium genere: in anguilla l, ex piscibus; in manati m & urso marino n, ex amphibiorum classe; in salamandra n*, testudine o, croco-

g *Comment. Acad. Petropol. T. II.*

h *T. Bartholinus histor. 25. Centur. III. Schuster de hydr. pericard. Borgaruccius in cont. anat. p. 260.*

h* *Galen. loc. V. ad sect. L. V. James l. c.*

i *Lister de cochleis p. 24. 33.*

i* *Harder multum esse ad-*
didit.

l *Second Mémoire sur le mouv. du sang, exp. §26. In aliis piscibus, varii generis Bellonius.*

m *Steller Nou. Comment. Acad. Petrop. T. II. p. 317.*

n *Idem ibid. p. 343.*

n* *Spalanzan.*

o *Multa in eo animale est Blasius in anat. anim. p. 119. Collins p. 713.*

k *Méry Mémoire de l'Acad. des Scienc. 1711. p. 422.*

dilo *p*, & vipera *q*, de genere oviparorum quadrupedum, & adfinium; in corvo marino *r*, corvo vulgari, & aliis avibus *s*, quas Rupe numerosas incidi: in elephanto *t*, equo *v*, ove *x*, hædo *y*, porco *z*, hyæna *a*, fele *b*, lutra *c* marina, cane *d*, & simia *e*. In vivis animalibus variis testes sunt, J. Berengarius Carpenfis *f*, Nicolaus Massa *g*, Realdus Columbus *h*, Johannes Riolanus *i*, Nicolaus Habicot *k*, H. Vink *k**

Neque rari auctores sunt, qui aquam in pericardio, aut cadaveris, aut denique vivi hominis viderunt, etsi hujus quidem generis experimenta non possunt vulgaria esse. Nunquam

- p* Hamme de Herniis & Blasius. in canibus reperit.
a Blas anatom. animal. p. 75.
q Severinus zootom. democrit. p. 359.
r Mémoires pour servir à l'histoire des animaux. 492.
s Ibid.
t Guil. Stukeley in ejus belluæ anatome edita cum hist. lienis p. 98. Allen Moulins anatom of an Eleph. burnd at Dublin. 539. Add. Chirac advers. p. 57.
v Snape anat. of the horse p. 79. 91. Uberrima est Bourgelat hippiatr. T. II. P. II. p. 389.
x C. Bauhinus theatr. anatom. p. 204. Quotannis solebat in viva ove ostendere.
y Second Memoire &c. Exp. 521.
z Vesalius p. 728. Uberiorem in vivis porcis, quam
d Vesalius l. c. Littre Mem. 1711. p. 29. in vivis canibus, & in nostris experimentis 538. 539. Add. Chirac advers. p. 57.
e Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. I. obs. 61.
f Comment. in Mundinum p. CCCXXXVI. CCCXXXIX.
g Introdect. anat. p. 52. b.
h De re anat. p. 176.
i l. c. p. 218.
k Sémair. anat. journ. IV. legon VII.
*k** bloedvaten p. 15.

quam non reperit Cl. *Greding* *k**. Citabo vero ea sola testimonia, quæ a sanis & subita morte enectis hominibus sumta sunt.

In homine fulgurato cochlear plenum visum est *l*, & quindecim omnino cochlearia in alio, quem nimia contentio cursus suffocaverat *m*. In strangulato aqua pericardii adfuit *n*, & in occisa muliere *o*, alioque sano homine subito enecto *p*. In homine subito mortuo Cl. *Bassani* *p**, in apoplectico vir utilissimus *P. C. Fabricius* *p***. Ejusmodi eventus minime raro in hominibus ultimo supplicio adfectis mihi vidisse contingit.

Sed etiam, cum vivo homini cor ereptum fuisset, in pericardio continuo aperto aqua fuit *q*; inque ægroto denique, cui pericardium pugione perfoßum fuerat, *Veslingius* omnino ad singulos cordis pulsus aliquantum humoris per vulnus expelli vidit, cum ejus hominis curam gereret *r*. Vide, nisi hoc testimonium sufficit,

*k** Adv. Ludwig III. p. 3. 4. drop. pericard. p. 7. & in Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 46.

l Mémoire de l'Acad. des Scienc. avant 1699. T. II, p. 179. p Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1711. n. 7.

m Tulpus L. IV. p* Fränk. Anmerkung. IV. p. 72.

n B. Socer meus H. F. Teichmeyer anthropolog. p. 77. p** II. Sammlung p. 10.

Addit in hominibus eo supplicio adfectis, plus aquæ in pericardio esse. q Vesalius l. c.

o Gottwald Schuster de hy-Tom. II. r Apud Bartholinum in anat. p. 350.

scriptores numerosos, qui variis experimentis & rationibus, hujus aquulæ in corde sani hominis præsentiam tuiti sunt s, & inter præcipuos *Philippum Verheyen*, qui nunquam, nisi in paucissimis forte exemplis, eam desiderari ex suis experimentis testis est t. Constanter se in hominibus vidisse *Schneider t**, *Vink t***, Ill. *Störk t****, in fatuis frequenter *Greding t†*, in infantibus multam t††.

Possis his clarorum virorum sententiam obponere, qui in vivis animalibus v paucam x, aut omnino nullam in pericardio aquam reperiri, aliquot autem a morte horis utique fatis memorabilem copiam in eo sacco esse, adeoque vaporem rectius dici, quam nos aquam dicimus, fatis numerosi docuerunt. Verum ego quidem vaporem de corde exhalantem sæpissime vidi, neque tamen eo minus etiam aquam

s *J. Posthium* ad *Columbum* quem edidit, p. 512. *J. Nardium* in nocte geniali X. p. 693. *C. Hofmannum* de thorace p. 17, qui in feminis uberiorem esse addidit. *Thomam Bartholinum* anat. p. 350. *Richardum Lower*, *J. Conradum Peyerum* in parerg. anat. p. 153. *Jos. Lanzonum* oper. omn. p. 598. *G. C. Schelhammerum* in diss. de aqua pericardii p. 12. *J. Fantonum* l. c. p. 279. *J. Ravium* apud *Valentinum* in amphith. zootom. appendic. p. 87. *Gottwald Schuster* l. l. qui multa exempla citat.

t *Anat.* L. II. p. 108.

t* *Catarrh.* II. c. 9.

t** l. c.

t*** *Ann.* I. p. 138. 139.

t† l. c. multis productis exemplis.

t†† *Journ. de med.* V. p. 120. v *G. Fallopius instit. anat.* p. 17. Dubitat, an multa in vivis animalibus sit, & ex densatis spiritibus fieri existimat; *Abrahamus Kaurw* l. c. n. 543. 651. 697. 699. *P. Senac* l. c. p. 264. *Ant. Deidier* *physiolog.* p. 94. *Car. Aug. a Bergen* de perspir. viscer. diss. II. n. 5.

x Ita in cane *Blasius* vidit *miscell. anat.* p. 228. & olim *Vesalius* l. c.

veram, & in clauso quidem γ , quod aliorum etiam testimoniis confirmo, pericardio, & maxime in vivis canibus. Copiam non sum metitus, quam a duabus drachmis ad tres unciae quartas partes alii definiverunt z .

§. XXI. *Indoles ejus aquæ.*

Natura ejus aquulæ eadem fere est, quæ lymphæ pleuræ & peritonæi. In fetu, & juniore homine rubet, & nonnunquam etiam in aliis vitæ stadiis a , tum post inflammatorios gravesque morbos b . In adulto homine plerumque pellucida & decolor b^* , aut certe flava, eademque tenuis est, qualem etiam in canibus & felibus reperio: spissa tamen nonnunquam etiam in homine c , aut ad frigus spissabilis d , aut demum omnino gelatinosa fuit e . In grandioribus animalibus viscida etiam, & soluti glutinis non dissimilis est, ut in bove

γ J. Berengarius Carpenfis p. 14. de hydropo pericardii
l. c. Haen l. c. 9.

z Verheyen l. c.

b Santorini istoria d'un fe-
to n 51.

a Jafolinus in proprio li-
bello, Spigelius, Fantonus p.

b^* Id. p. 12.

278. Schreiberus Comment.
Acad. Petrop. T. VII. p. 228.

c Lancisius p. 40. Bourdon
descript. anat. p. 256. in fe-
nibus.

Cotunnus isch. p. 16. Subflava
p. 12. Pechlinus de corde p. 314.

d Vieussens traité du cœur
ab init.

meæ editionis, qui equidem
eum colorem tempore, &

e Schlenker in diff. de morb.
ovarîi Douglas Phil. Trans.

quasi extractæ tincturæ tri-
buit. In elephanto rubra

n. 345. In homine melanco-
lico Grëding adv. III. p. 3. 4.

fuit Stukeley, & in ve-
tulo bove Schelhammer l. c.

f, & equo *g*. Sed etiam quæ tenuis fuit, semper tamen de natura albuminosa est, ut ad ignem spissescat *h*, & majori parte sui minorive, uti ovi *i* pars pellucida, coeat. Eadem cum spiritu nitri lactescit, & minus quam lymphæ cogitur *k*. Ab adfuso meraciori vini spiritu flocculi in pericardii aqua, ut in aliis lymphis, nascuntur, inque fibras densantur *k**. Sponte demum in gelatinam constitit *k***. Quare si in cane vapor pericardii totus exhalavit, probabile est, in experimento Cl. viri putridum fuisse. Nam in pectore ipso coagulabilem esse fatetur Cl. *Cotunnus k****.

Sed etiam sapore consentit, qui in vivo animale subsalsus est *l*. Negat *Schelhammerus m* non valde alienæ credulus auctoritati. Facile vero intelligitur, eo minus inesse falsedinis, quo junius, & integrius animal est, de quo sumitur, & aqua recentior.

Analyses raræ sunt. De aqua pericardii destillata gelatinam reliquam fuisse lego, de

f Lower 1. p. 7. Sinibald Hayman Comment. in Boerh. instit. T. V. p. 24.

Apollo bifrons p. 38.

g Viridet du bon chylè p. 11. Gelatinosa la Fosse cours d'hippiatrique.

h Lower 1. c. p. 6. Sauber observ. Med. n. 2. Vieussens 1. c. p. 13. 14. tr. des liqueurs p. 133. Lanson Oper. T. I. p. 597. Kaauw n. 741- Bayle de corp. anim. p. 185. Taury anat. raisonn. p. 53. Cru- stam sibi induxit Greding. *i* Verheyen 1. c. p. 110.

k Verheyen 1. c. Hayman 1. c. Pars duodecima in albumen abit, reliqua lactescit Verduc 1. c.

*k** Ischias nervosa p. 25. 27. *k*** Greding.

*k**** Vieuss. mal. int. 11. p. 67.

l Kaauw 1. c. Drelincourt apud Blasium in anatome simiæ, Verheyen 1. c. *m* 1. c. p. 16.

qua evaporata lixivium manserit, ex quo terra cinerea & sal fixus alcalinæ indolis eductus sit *n*. In alio experimento, hujus liquoris in igne avolantis residuum materies spumosa & terrea fuit *o*.

Per morbos naturam lixiviosam induit, ut alii liquores humani. Est ubi cum syrupo florum malvæ & violarum viridem colorem contraxit, & calcinata pericardii aqua salem fixum cum acidis effervescentem suppeditavit *p*: est ubi cærulea ipsa, neque coagulabilis reperta est *q*: quo frequentia exempla refero, in quibus Cl. viri exiguam hujus aquæ particulam viderunt cogi *q**: est ubi post morbum acutum putrida, & adeo acris fuit, ut cor eroderet *r*, quæ quidem vitia omnia in humore amnii, inque aqua hydropica, per putredinem generantur. Hinc minime rarum est, cor quasi ulceratum *s* circumfusum habuisse liquamen puris simile *s**; verum eain sede pus adfuisse passim legas, & demum ipsum pericardium quasi in pus dissolutum *s***.

n Vieussens traité des li-
queurs p. 133.

o Hayman l. c. *Mal. int.*
II. p. 167.

p Vieussens l. c. p. 14. 15.
Frank de pericardio p. 22.

q Lanson l. c. p. 598.

*q** Morg. *sed. caus.* I. p.
184. II. p. 98. Duverney *posth.*
II. p. 92.

r Fanton *observ. anat.* 4.
Lancisius l. c. p. 40.

s Harder *apiar.* p. 216. cum
hydropo pericardii, ejusque
succi vitiosa crassitie. *Fabri-*

cus ab Aquapendente oper.
chirurg. p. 48. edit. Patav.

Cheselden anat. of hum. body
edit. VI. p. 181. *Blancard*

Jaarregister Cent. VI. n. 23.
pariter cum nimia succi pe-
ricardii copia.

*s** *Birch* T. IV. p. 429. *Se.*
nac II. p. 346. 354. *Lieutaud*
precis. p. 166.

*s*** *Journal de Trevoux* 174.
Avril Medicus Wahrnehm.
p. 653. de *Haen rat. med.*
T. XIV.

Crustam inflammatoriam s***, qua cordis superficies tegebatur, non dudum in febre epidemica mali moris frequenter vidimus.

§. XXII. *Vitiose spissescit, & cor cum pericardio conglutinat.*

Sed etiam aliud vitium est, priori frequentius, quo idem liquor corrumpitur. Nempe ita vehementer spissescit s****, ut cor quasi gelatina obducatur, idque vitium post pleuritides frequens est *z*. Materies crustacea, quasi mellea, exsudans cumque corde cohærescens, & mihi visa est & aliis. Multa aqua pericardii, & cor, atque pulmo, & interna facies ejus sacci, quasi sebo fuso, aut lacte grumoso tecta *v*. In pleuriticis & in peripneumonicis frequenter pleura, & pericardium, crusta sebacea obliniuntur *x*: quale etiam gluten & exterius pulmonem obtegit & interius, & intervalla lobulorum obsidet *y*.

Simile, aliquanto tamen majus, malum est, quando liquor pericardii in granula, fungos squamasque cogitur, quibus cordis externa su-

s*** Störk ann. II. de Haen T. XIV.

s**** Vitio Cotunnus p. 29. 30.

† Conf. Fanton anatom p. 278. & ad gelatinam cor obducentem, & Pechlin l. c. Verduc l. c. p. 110. Breslauer Samlungen 1718. p. 996.

o Barrere observ. anat. nov. ed. obs. 3. 4. 5.

x Senac l. c. T. II. p. 338. 352. Cleghorne epidemic. digest. of minorca p. 248. In febre frequens esse Lind fever. in sect. p. 280.

y Valcarenghi Constit. Epidem. p. 100. 101. 102.

perficies horret, aut demum in crustam cordi adhærentem coit. Ejusmodi pericardium, globulis & granulis lentium similibus plenum, *Zellerus* olim vidit *z.* Cor crusta purulenta obductum, cum simili in pericardio tuberculoso cortice, *Cl. Schmiedelio* dictum est *a.* Cordis & pericardii, & magnorum vasorum superficies quasi scabiosis pustulis inæqualis fuit, in alio exemplo *b.* Frequenter post inflammationes cor crusta obducitur, fibrosa, lamellata, variae crassitie, quam tamen aqua de membrana ejus visceris abluat *c.* Cor scabrum, eminentiis asperum, quibus cum pericardio cohærebat, post morbum acutum *d.* Cor squamis de superficie fluitantibus horrens *e.* Cor & pericardium crusta membranosa sanguinea velatum *f.* Cor globosis eminentiis asperum *g.*

Ejusmodi glutine pericardium cum osse conferruminatum fuisse passim lego, apud Ill. viros *Haenium g** & *Morgagnum g**.* Adfinis morbus est, sed aliquanto plus habet novitatis, quando liquor pericardii in fila laminasque abit, & cordi adhærescit, ut omnino

z In thes. inaugur. medic. Tubing. 1704.

a In diss. inaugur. de exulcerat. pericard. &c. Jenæ an. 1742. proposita, & in Tomo collectionis nostræ practicæ secundo recusa.

b *Augustinus Buddæus* in miscellan. Berolin. T. VI.

c *Hunter* apud *Cleghorne* p. 349.

d *Ruyseh Thes. Anat.* VI. n. 36.

e *Peyer method. anat. practica.* p. 62.

f *Malpigh. oper. postum.* p. 7.

g *Loescl de renib.* p. 60.

*g** *Rat. med.* p. 45.

*g*** *Sed. caus.* I. p. 171.

II. p. 187.

pilosum videatur. Neque enim quidquam hi-
pili sunt, nisi liquor sacci cor complexi, qui
in fibras præter naturam fingitur. Ejusmodi
historiæ minime infrequentes sunt *h*. De *Ari-*
stomene Messeniorum heroe *i*, deque *Hermogene*
k antiqua sive historia est, sive fabula. In ho-
mine bis suspenso cor pilosum vidit *Antonius*
Benivenius l. Latroni cor pilosum *m*. In no-
bili viro cor asperum *n*, & in pleuritico tomen-
tosum *o*. Cordis superficies villosa, ejusque
musculi velamentum laxum, cum pure in pe-
ricardio *p*. Cor villis magnis, longis, latis,
teneris, ex sero coacto manifesto natis *q* hir-
tum. Cor villosum, quasi gelatina inspissata
obductum, & alias corniculis adiposis asperum
r. Cor totum villis, quasi velamento, ex se-
ro densato factis oblitum *s*. Cum in nosoco-
mio Petropolitano medicinam faceret *Damianus*
Sinopeus, frequentia ejusdem mali exempla
vidit. Aliquoties cor villosum fuit *t*, & post
febrem ardentem villi, qui omnino dimidii di-
giti longitudine essent, in cruorem deffluxe-

h Vide collecta apud *Cas-*
parum Baubinum exempla
theatr. p. 223. tum apud *Sachs*
ocean microcosm. p. 32. Conf.
etiam *Senac T. II.* p. 341.
Tardinus de pilis p. 60.

i *Plin. L. XI.* p. 626.

k Apud *Suidam*.

l De morb. abdit. c. 83.

m *Rascynski hist. natur. po-*
lan. append. T. II. p. 457.

Amutus Curat. 65. Cent, VI.

n *Philos. Transact.* n. 5.

o *Domin. Panarolus in ja-*
trologismo 48 *Pentecost.* I.

p *Cowper ad T. 21. operis*
anat. Bidloiani.

q *Nov. Comment. Acad.*
Petrop. T. III. p. 402. 403.

r *Verduc l. c.*

s *Weitbrecht in Comment.*
Acad. Petr. T. V. p. 268.
269. 275.

t In *parergis medicis* p. 31.

runt, ut originem adgnosceres *v.* Cor hirsutum, & asperum, quasi spinosum, pericardium in hæmoptoico fuit *x*, & alias in cachecticis cadaveribus pericardium in carnei fungi naturam degeneravit, cordisque superficies fibrosa, villosa, fungosa, in cruorem pariter dilapsa est *y*.

Si eadem pericardii aqua vel paulo magis inspissata fuerit, nascitur inde cellulosa tela vitiosa, quæ aut aliquam partem pericardii ad cor revincit, aut omnino totum cum corde pericardium unit. Simile aliquid in nonnullis animalibus natura fecit, maxime animalibus frigidi sanguinis, ut in anguilla *z*, quo in pisce ipse eam fabricam vidi, in testudine *a*, & in limace *b* ex vermium genere, & si fides claris viris adhiberi potest, omnino in ave etiam Numidica *c*: his enim animalibus omnino vascula, ut in meis experimentis, pericardium cum corde uniunt, ut nullo modo cor nudare queas, quin magna copia sanguis effundatur. Sed etiam homini natura quidem a pericardio cor liberavit, ex morbo tamen frequentia vincula non raro nascuntur, quæ ex cordis velamento efflorescunt, & in pericardium se inmittunt.

v Ibid. p. 44. 45.

x p. 53. 54.

y p. 46.

z *Second Memoir. sur les parties sensibl. & irrit. Exp.* 527. Vidit etiam J. de Muralt in *vademicum anat.* p. 384. & J. Conradus Peyer in *method. anat. pract.* p. 76. 77.

a *Buffiere lettre à M. Merri p. 38. Caldesi notomia dalle tartarughe p. 60.*

b *Gautier observat. P. III. p. 483.*

c *Quam Parisini Demoiselle vocant, in Memoir. pour servir à l'histoire des animaux.*

Bis factum vidi, in hominibus equidem scele-
ratis, in quibus diuturna in carcere quies,
tristisque mortis meditatio, hoc vitium adju-
visse potuit. Ex spissata tunc lymphæ hæc fre-
na nasci exemplum pulmonis confirmat, quem
adeo vulgo fila, & laminæ vitio natæ, ad pleu-
ram late revinciunt. Ita certe cor cum suo
facco conservere magis mihi probabile videtur,
quam ex defectu aquæ pericardii *d*. In hy-
dropica femina coalitum cum corde pericar-
dium *e*. Cum crassa gelatina pro pericardii li-
quore esset, cor cum eo sacco fibræ cellulosis
conferbuerat *f*. Hæ sunt fibræ, pro musculo-
sis habitæ, quibus cor in sene cum sacco suo
coaluerat *g*. Numerosa cæterum hujus vitii
exempla passim exstant *h*. In tabe *h*^{*}, hydro-
pe *h*^{**} pectoris, asthmate *h*^{***}, post cordis *h*[†],

d Kaaw n. 704.

e Phil. trans. n. 207.

f Douglass in Philos. trans-
act. n. 345.

g Hayman T. V. p. 26.

h Senac T. II. p. 340. 341.
Nihell ad Solani ex pulsu præ-
sagia p. 130. (post morbum
acutum) *Arent Cant impet.*
anat. p. 17. *Damianus Sino-*
peus l. c. p. 31. 44. & alibi.
Eph. Nat. Cur. Vol. V. p.
90. *Phil. Transact.* n. 188.
Philippus Conradus Fabricius
in programme Helmstad.
1750 edito. *Detharding* in
anat. curios. & util. Tribus
quatuorve locis pericardium
cordi cohæserat. Sed etiam

duobus tribusve locis cor cum
pericardio coaluerat in histo-
ria, quam ex *Compero* ci-
tavi. Post vulnus cordis *Rich-*
ard recueil II. p. 594. *Sæ-*
pe Vieussens Mat. int. II. p.
168.

h^{*} *Journ. med.* 1761. mars.
Störk ann. II. A peripneumo-
nia *Sarcone* p. 58.

h^{**} *Brunner de corde occul-*
to. Fränk. Anmerk. T. IV. p.
278. *Bader obs.* 8. *Heuermann*
urin.

h^{***} *Jenty course* T. III. p.
251.

h[†] *Lieutaud sepulchret* II.
p. 47. 17. *Journ. de med.*
1756. febr.

palpitationes, deliquia *b††* animi, aliaque mala *b†††*. Non ideo omnes alias vitiosæ cordis cum suo sacco cohæſionis causas repudiaverim, quas inter inprimis pus numero, in similia fila omnino figurabile, qualia ex lymphâ nascuntur. Ipse vidi in juvene, post palpitationes cordis enormes enecto, pultaceam & purulentam materiem de corde efflorescentem, huic visceri pro glutine fuisse, quo cum pericardio cohærebat. Ejus visci ea natura erat, ut etiam in scirrhosam, & denique in lapideam naturam induraretur *i*, quæ clavorum modo a corde in pericardium se inmittebat.

Sed late etiam, aut undique, nonnunquam cor cum suo sacco cohærescit, plerumque in morboſis exemplis, ut omnino dubites an vere sani fuerint, in quibus ea conjunctio reperta fuisse legitur. Certe, quem sæpe laudamus, *Damianus Sinopens* frequentes historias, sed hecticorum hominum habet, in quibus cor hirsutum, fungosum, cum simili pericardio coaluerat *k*. In hydropico *Idem* cum crassiori corde pericardium connatum reperit *l*. Cor undique quasi adiposis squamis cum pericardio cohæſit *m*. Cor villosum, carnoſo pericardio pe-

b†† Apoplexia *Adams obs.*

b††† Cardialgia *Haen T.*

Xl. Anxietas, debilis pulsus
Mekel mem. V. Xl. Hoc malum
per omnes gradus increſcens
vidi: paucis filis *Morg. sed.*
caus. II. p. 96. ut ipse
reperi, deinde latius, per

cartilaginem, demum totum
pericardium.

i Opuscul. patholog. obs. 52.

k p. 46. 53. 54.

l p. 50. 51.

*m Samuel Schaarschmidt Ber-
lin Nachrichten 1740. obs. 31.*

ne totum adnatum, post cordis palpitaciones *n*. In anheloso pericardium cordi undique adglutinatum *o*. In hydrope pulmonum pericardium cartilagineum, cordi unitum *o**. In hydrope pectoris pericardium sextuplo crassius, cordi adnatum *p*, novo argumento, non videri hujus vitii causam in siccitate esse. Frequenter cum connatis ad pleuram & pericardium pulmonibus hydrops, & cordis cum suo sacco coalitio conjungitur *q*. Post abscessum, qui viscera thoracis & ipsum penè cor consumferat, cor pericardio coaluerat *r*. Cor cum carnofo pericardio totum confusum *s*. In pleuritico *t*, hectico *v*, hæmoptoico *x*, hydrophobo *y* cor undique suo sacco adhæsit. In octogenario, cum passim variæ cordis partes in osseam naturam abiissent, inter eas sedes cor pericardio adnatum fuit *z*. Post perpetuum sterni pondus & anxietates cor perfectè cum

n Senac I. c. p. 341.

o Lancisius I. c. p. 39. & fere simile exemplum habet Beggi apud Pacchionum oper. omn. p. 219. *Essays of a societ. at Edimb.* T. II. n. 23.

*o** Vieussens du cœur p. 15. 16.

p Heurnius. Peyerus method. anat. pract. p. 51. 52. In isto exemplo cor a pericardio separari nequit. Gottlieb. Budæus in *Sammlungen* I. cas. 35.

q Fabricius Bartholetus de respir. p. 271.

r Gouey le veritable Chirurg. p. 269. 270.

s Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 63.

t Agricola *Commerc. Lit. Noric.* 1735. hebd. 8.

v Goelicke obs. anat. chir. II. Cheselden I. c. p. 182.

Lancisius de mortib. subit. L. II. obs. IV. in D. Spada. Benjamin Hoadley of the organs of respiration p. 81.

x C. Stalpart van der Wiel *Centur.* I. obs. 37.

y Senac T. II. p. 340. & T. I. p. 260.

z Jul. Ofrai obs. CXI. Marquet *Journ. de Trev.* Juin 1726.

pericardio connatum *a*. Alia exempla magno numero præsto sunt *b*, in quibus undique cum suo sacco cor conferbuit.

Exstant alia exempla, in quibus hominem sanum fuisse additur, neque ea pauca *c*, mihi tamen hæcenus suspecta, quod omnino cordis necessaria libertas ab eo coalitu plurimum patiatur. Cum enim pericardium diaphragmati inprimis coalescat, non poterit cor, cum pericardio connatum, moveri, aut mucronem suum adducere, aut arctari undique, quin diaphragma una adtrahat, elevet, sinistramque partem ejus necessarij organi ad dextram antrorsum revellat. Ita certe & spiritum ægrius trahi necesse est: & cum omnino septum transversum suæ tractioni resistat, non poterit mucro cordis dextrorsum ad basin accedere, qui in sinistra septi transversi parte retineatur, neque arcum suum, ad anteriora curvum, describere, neque adeo perinde accurate cor arctari. Inde in pluribus exemplis, peramplum cor fuit, cui pericardium connatum esset *d*. Male enim

a Barrere obs. anat. nov. p. 75. 76.

b Kaauw l. c. 365. evidenter cellulosa tela pro vinculo fuit. Oliger Jacobæus de distinguendis cadaveribus per crania p. 23. Olaus Borrichius, iste quidem cum siccitate pericardii, apud Bartholinum in Epist. 93. Centur. III. Fantonus l. c. p. 275. cum pericardium cartilagineum esset, Malpighi de gland. conglob.

c Alexius Littre hist. de l'Acad. Roy. des scienc. 1701, p. 54. Ibid. 1706, hist. I. Heister in observ. med. miscell. n. 4. Cheselden l. c. p. 182. P. Dionis de la mort subite p. 66. si recte virum interpretor.

d Essays of a societ. at Edimb. I. ult. cit. G. Budæus l. c. Dam. Sinopeus p. 44. Philos. Transact. n. 345.

contractum male evacuatur. Similia mala in cordis actione subnascuntur, quando pericardium crassescit *d** & cartilagineum, & demum osseum fit, ut quidem non rarissime factum est. Durum, cartilagineum, cum adhæreretur *Vieussens d***.

Adhæsiō etiam respirationi nocet. Septum enim transversum difficilior explanatur, & respiratio impeditur *d****. Per vulnus tantisper amisso humore motum cordis, utique pergere non mireris *d†*.

§. XXIII. *Cur nullum fuisse dictum sit.*

Cæterum similem præter naturam enatam telam cellulofam effecisse crediderim, ut passim scriptores, & potissimum, qui minus cauti essent, cor pericardio destitutum se conspiciere sibi persuaferint. Si enim in elephanto ejusmodi morbosa cohæsiō Cl. certe viro & industrio alioquin anatomico imponere potuit, ut in tam vasta bestia pericardium desiderari existimaverit, omnino multo facilius in homine, & in minutioribus animalibus, similem errorem eadem causa produxisse potuit, uti recte monet Vir Ill. *Abrahamus Kaauw e.*

*d** Ad pollicem *Bader obs.*
36,

*d*** *Malad. int.* p. 165.

*d**** *ib.* p. 168.

d† *Haen T. XI. Journ.*
de med. 1761. mars *Journ. sav.*
1691, n. 2.

d†† *Greding, Jenty l. c.*
Mem. de Sully T. II. Senac
II, p. 332. *Simon collect.* p.
52. 54.

d††† *Chirac advers.* p. 57.
e Comment. nov. Acad. Pe-
trop. T. I. p. 387.

Quare absentiam pericardii in sanis hominibus, dictam olim *Realdo* quidem *Columbo* *f*, deinde aliis *Cl. viris* *g*, omnino huc retulerim: tum cor absque pericardio in nuper nato infante visum *Cl. Torrez* *h*, & post febrem acutam *D. Finkenau* *i*, aliisque scriptoribus *k*. Eadem iterum causa fecisse videtur, ut sæpe omnino cor absque pericardio se conspexisse, auctor sit *Ludovicus Leodigarius Gouey* *l*. Iterum huc refero cor hectici, nullo obvolutum pericardio *Nicolai Tulpii* *m*, & aliud exemplum in quo, cum pectoris hydrope, cor sebi simile, gelatina procul dubio oblitum, *Idem* vir clar. suo operimento caruisse reliquit *n*.

Alia causa erroris eorum anatomicorum fuit, qui varia animalia pericardio destitui docuerunt, ut terrestrem erinaceum *o*, talpam *p*, testudinem *p*^{*}, galeum *q* raïamque *r* piscem.

- f* *De re anat.* L. XV. p. 265. *n* L. II, c. 44.
g *Bartholinus Cent.* IV, hist. 20. *Harder apiar.* obs. 17. in subito mortuo homine, *Peyer* in *parerg.* III. *Vieussens* in principio operis du cœur. In cane recte valente *Lamy discours anatomiq.* p. III. *h* *Phil. Transf.* n. 461, & in *Memoires des savans étrangers* T. I. p. 140.
i In disp. de pulsu.
k Vide *Eph. Nat. Cur.* Vol. V. p. 256. *Hist. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1712. p. 37.
l l. c. p. 339.
m L. II. c. 25.
o *Negarunt pericardium habere* T. *Bartholinus anat. tert. renov.* p. 349. *G. Blasius anat. anim.* p. 65. *J. Muraltus* l. c. p. 267. *Jos. du Verney* apud *du Hamel histor. Acad. Reg, scient.* p. 229. 243. *J. Conradus Peyer* *parerg. anat.* p. 274. *Targioni viagg.* VII. p. 171. *p* *Blasius* l. c. E. N. C. II. I. obs. 130.
p^{*} *Feuillée suite du journ.*
q *Mémoires pour servir à l'hist. des animaux*, & du *Verney* apud *du Hamel* p. 219.
r *Peyer meth. anat.* p. 77.

Sive enim tenuitas membranæ fuit, sive alia causa, quæ claris viris inposuit, ego certe & in glire, & in talpa, & in erinaceo s nihilo obscurius, quam in aliis magnæ molis quadrupedibus, pericardium reperi. Neque ullum certe animal incidi unquam, ex quadrupedum viviparorum, & oviparorum, ex avium, pisciumve genere, in quo proprio sacco cor non fuerit comprehensum. Similia sunt effata *Loweri t*, & ne in minimis quidem bestiolis defecisse reperi, quoties cor adest, ut in ostreo *v*, mytulo *x*, pectine *y*, cancro *z*.

§. XXIV. *Ejus utilitas.*

Magnæ ergo causæ fuerunt, cur natura cordi ejusmodi utrem membraneum circumposuerit. Non unicus ejus finis fuit *a*, vaporum quo cor humectetur, receptaculum parare, cum etiam in communi pectoris cavea vaporem & aquam præparare facillimum fuisset, inque ea cavea cor nudum suspendere. Sed omnino oportuit, mucroni cordis fundamentum ponere, limitesque figere, ne ponderi obediat, & dextrorsum & sinistrorsum vacillet, vasaque magna,

s Et ante me *Lancisus* l. c. p. 20.

t Nulli avi aut pisci deesse de corde a principio.

v *Willis de anim. brut.* p. 17, 18.

x *Lister* in ejus anatome, *Méry Mémoir. de l'Acad. des scienc.* 1710. p. 422.

y *Philos. Transact.* n. 229.

z *Willis* l. c.

a *Senac* l. c. p. 276.

magna, dum palpitat, detrahat. Nunc, ut de solo homine dicam, mucro cordis coercitus neque deorsum fluctuat, neque sinistrorsum, neque retrorsum, sed unice ad dextram basin sinistrorsum & antrorsum accedit. Quanta confusio in cordis motu, etiam in quadrupedibus nascatur, & quam parum cor suis conatibus proficiat, quam primum pericardio destituitur, facile est in vivo animale perspicere. Quam diu enim pericardium superest, rite & æquabiliter cor movetur, & quævis ejus contractio prioribus similis est & æqualis, iidemque manent termini, intra quos oscillat *b*. Si detraxeris, continuo omnia turbantur, ad alienas regiones cor contractum aberrat, neque contracti porro visceris iter in duobus pulsibus idem est. Hinc iis animalibus fere robustius est, quæ diaphragmate destituuntur *c*. In iis enim, cum solum cordi pro fulcimento sit, firmitus fieri necesse fuit, cum cor alio fundamento destituatur.

§. XXV. *Aquæ Pericardii nimia ubertas.*

Et si paulo fusius de morbis pericardii diximus, liceat tamen paginam unam alteramve alteri morbo inpendere, qui illi contrarius est, quem diximus. Sæpiissime nempe fit, ut aqua cordi circumfusa nimia copia congeratur, ex diminuta procul dubio ea resorptione, quam

b Conf. *Kyper de humore pericard.* Leid. 1741. 4.

continuo ostendemus secundum naturam fieri. Uti enim omnium vaporum reditus per venas in morbis longis difficulter & maligne pergit, ita etiam pericardii aquula in omnibus fere cachecticis *d*, hydropicis *e* & hectici habitus ægris copia nimia peccare solet, quod vitium cum his ægritudinibus conjungi doctissimus olim *Schneiderus* monuit *f*. Peculiariter vero *hydrops pericardii* dicitur, quando ea aqua ad integras libras abundat, eademque cor pondere opprimat, & perpetuo madore macerat, & pulsus inæquales, cordisque palpitaciones *g*, syncopas *g*^{*}, ponderisque sub sternum sensum *h*, & oppressionis metum, & spirandi difficultatem *i*, conjuncta habet. Solet se etiam tristitia *l* adjungere, & nonnunquam aquæ fluctuatio *m* percipi. Quando ex his signis morbi natura certo cognoscitur, egregii viri sunt,

d Lancis. l. c. p. 39. Barrere obs. 1. Vieussens p. 7. Piso colluv. rere obs. 1. Vieussens p. 9. sang. sæpe.

10.

e Duverney I. quem continuo citabo.

f De catarrh. L. II. c. 9. p. 95. 96. In ejusmodi ægrotis quatuor vel sex uncias aquæ se reperire scribit. Post hæmoptysin exemplum habet Jul. Ofrai Observ. de pratique n. 4. Cum cordis laceratione uncia 48. Haen rat. med. IX. c. 1.

g Hiklan L. IV. obs. 51.

g^{} Lieutaud sepulchr. II. p.*

15. Morg. loco c. l. p. 20.

h Suffocatio & anxietas

Barrere obs. anat. nov. Ed. obs. 2. 3.

i ibid. obs. 4. & omnino

asthma Vieussens p. 13. Barrere obs. 234. Lieutaud II.

p. 60. 61. Morg. l. p. 136.

139. Fanton obs. 37. post

pleuritidem. Blas. l. obs.

19.

l Vieussens ibid. p. 9. 10.

m Senac T. II. p. 361.

qui omnino pectus perforare, & aquam detrudere jubent *n*, uti in vulgatis hydropis speciebus fieri solet. Cæterum in ejusmodi malis cor amplum *o*, & molle, & quasi ulcerosum *p* esse solet. Exempla morbi aliqua collegisse liceat.

In phthisica femina aquæ pericardii uncia quinque *q*. In febricitantis cadavere quindécim cochlearia *r*. In alio corpore uncia viginti *s*, & post pleuritidem triginta uncia *t*. Cum lapide in pulmone aquæ in pericardio libra duæ *v*, & totidem in alio cadavere *x*. Mensura aquæ limpidæ in phthisico *y*. Quatuor aquæ libræ cordi circumfusæ, cum admisto pure *z*, & eadem in aliis corporibus copia *a*. Vide alia, ne molestus sim, exempla *b*. Eundem morbum etiam in struthiocamelo *Valisnerius* vidit *c*. Adnotatum est, medio solo in dorso quiescere posse, quibus is hydrops est *c**.

n ibid. p. 366.

o *Tulpius* L. IV. c. 26.

p Ut apud *Bartholetum* de respir. p. 290. *Hannibal Albertinus*.

q *Horstius* obs. 8. *Cotunn.* l. c. p. 15.

r *Tulpius* l. c.

s *Bonnet* in *Sepulchreto*.

t *Blasius* L. I. obs. 19.

v *Hildan* L. II. obs. 29.

x *Diemerbroeck* anat. p. 260, 261.

y *Schneider* de corde. p. 10.

z *Hildan* L. IV. obs. 51.

a *Malpigh.* l. c. p. 7. *Viensens* p. 13.

b *Jasolinus* de aqua pericardii *F. Bartholetus* l. c. *C. Piso* de colluvie serosa sect. III. c. 2. *Nic. Tulpius* L. I. obs. 44. & l. c. *Medici Uraclavienses* in proprio de hoc morbo libello. *Duverney Mémoir. de l'Acad. des Scienc.* 1703. p. 158. *J. Maria Lancisius* l. c. *R. Vieussens* l. c. p. 6. 7. 10. 11. 15. 16. *mal. int.* p. 164. 165. & *c. P. Barrere* obs. anat. Ed. nov.

c *Valisner.* oper. T. I. p. 248.

*c** *Vieuss.* mal. int. p. 165.

Hydropem in cellulosa tela circumposita *Portalius* vidit *c***.

§. XXVI. *Utilitas aquæ Pericardii.*

Ex morbis, quos parca nimis, aut nimis copiosa pericardii aqua generat, ad utilitatem concluditur, quam cordi præstat. Princeps est, qua pericardii cum corde coalitionem avertit. Quanta enim ex ea cohæsiōe vitia nascantur exposuimus *d*. Verum omnes in corpore humano partes continuo connasci, quam primum nullus humor se interponit, & ostendimus *d**, & porro demonstrabimus *e*, & passim testimonia reperimus. Quare absque hac aqua neque cordis libertas, neque sanguinis adeo necessaria expulsio sibi constat.

Non rejecerim etiam alteram utilitatem, qua eadem mitis & glutinosa aqua cordis perpetui & celerrime moti frictionem temperat. Mucrone enim pectus percutit, pericardium impellit; id cum perpetuo fit, non posset certe fieri, quin aliqua pars membranæ tenerrimæ cordis sensim detereretur. Ea detrita nudæ fibræ carneæ etiam ipsæ vulnerarentur, nasceretur inflammatio, & ulcus, gravis certe in eo organo morbus, quo læso absque metu ne hora quidem vitæ superest.

*c*** l. c. p. 61.

d p. 62.

*d** L. I. p. 45.

e In L. XXX. de nutritione.

§. XXVII. *Scaturigo.*

Supereſt, ut fontes exploremus, ex quibus hæc, quam fuſe diximus, lymphæ prodit. Multæ de iis fontibus ſunt Phyſiologorum opinionones. Eos primos dicemus, qui extra pericardium naſci ſcripſerunt. Fuit, qui ramum ex thoracico chyli ductu in pericardium aperiri, & in eum ſaccum aliquam fui ſucci partem effundere, etiam experimento confirmavit: flatum enim in cordis conceptaculum penetraſſe ait, quem in chyli ductum inpulerit *f.* Alii de thymo cogitarunt, vicina, & ampla glandula *g*: alii de glandulis conglobatis, quæ pericardio numeroſæ inſident, maxime in ea ſede, quæ venam cavam ſuperiorem continet, atque aortam *h.* Eo vergebat olim *Richardi Loweri i*, inſignis viri, ſententia: nam eo refero, quæ vir celeberrimus de pericardii glandulis ad baſin cordis ſitis, & aquam eo ſacco contentam ſuppeditantibus ſcripta reliquit. Eum virum alii ſecuti ſunt *k.* Copioſius vero vir olim magnificus *J. Maria Lanciſius* glandulas deſcripſit, anteriores alias, ſub

f *Ant. de Marchettis* in *infrequentes, Bartholini Cent. Phil. Trans. n. 307.* *ll. hiſt. 82.*

g Conjectura fuit *Nicolai i* Edit. angl. p. 4. belg. *Stenonis* f. firmitus propoſita p. 6.

a *Philippo Verheyen Anat. L. k* *G. L. Welfchius* in tab. anat. I. p. p. 161. L. ll. p. 109. 42. & *P. Dionis* l. c. p. 426.

h Sex in aorta canis glandulæ, ne in homine quidem Pro re non penitus firma habuit *J. C. Peyer* in *Exercitation. Anatomicis* p. 117.

mediastino positas *l*: alias posteriores, ad partem internam divisorum bronchorum adjectas *m*: alias in parte superiori pericardii magnis arteriis innexas & bronchis *n*. Eas glandulas scripsit plerumque plumbei coloris, alias rubelli esse & albidi *o*, postque chronicos morbos mole auctas reperiri. Ex iis nunc glandulis natos ductus descripsit, & depinxit, quos compressa glandula manifestiores reddat *p*. Eos ductus pellucidos, non valvulosos, eundo incrementum; plerumque ad pericardium tendere, ejusque partem superiorem & anteriorem *q*, & qua dorso innititur *r*, grandibus, inque pericardio conspicuis, poris perforare docuit *s*, ut guttas exprimere possis. Alios ductus denique vaginulas bronchiorum subire *t* addidit.

Experimentum quidem, ab *Antonio de Marchettis* productum, post plurimas meas ductus thoracici repletiones, audacius & certius falsum esse pronunciasse liceat. Qui a thymo ductus ficti sunt, eos ad nervos vir olim doctissimus *v*, ego ad arteriolas retulerim: succus cæterum thymi albus, a rubra lymphâ pericardiaca fetus humani longissime recedit. Obstat etiam argumentum, quod sæpe repetam, ab

l l. c. T. III. f. 1. potius
nimis numerosas.
m Ibid. f. 2.
n Ibid. ad latus.
o Ibid. p. 34.
p p. 35.

q T. III. f. 1. *h. h.*
r f. 2. ad *f. f. f.*
s Ibid. f. 3.
t Ibid. p. 35.
v *Schelhammer de aquâ pericardii* p. 28.

anatome comparata sumtum. Pluribus enim animalibus aqua pericardii a natura data est, in quibus thymus deficit: eam enim glandulam quadrupedibus viviparis propriam esse reperio. *Lancisiane* glandulæ aut *Petrolianæ* v*, de conglobato & lymphatico genere sunt, de quibus nihil exprimere licet x. Ejus generis carunculæ adeo infinitis locis ponuntur, unde nulla ad pericardium via est, ut etiam iis, quæ viciniore illi sacco sunt, nullum cum ejus cavea commercium esse, recte existimes. Ex vero, quas vir amplissimus depinxit, venulæ, omnino de lymphatica gente fuerunt, ut ex glandulis adgnosco, si amanuensis docti Præfultis vere ad naturam eas pingi curavit. Proprios villos partem aquæ pericardii stillantes *Santorinus* depinxit, quos ejus interpret pro cellulosa adipe ebria tela habet x*.

Supereſt ea opinio, quæ in ipſo pericardio hujus ſucci ſcaturigines ponit. Ergo in ipſa, quam vocant, ſubſtantia pericardii glandulæ ſunt, quas in bubulo pericardio primus *Samuel Collins* y, inde *Joſephus Duverney* z, deinde, ſed multo uberius, *Marcellus Malpighius* deſcripſit a, ad morboſa quidem potius b, quam ad ſana corpora. Exiguæ, de gente ſimpli-

v* Nam ſibi tribuit in *otto ſtadere*.

x Eadem *Jacobi Pozzi* eſt obſervatio in *Commerc. Epiſtolic.* p. 67.

x* *Santorin poſth.* p. 18.

y *System of anatomy* p. 713.

z Ex teſtimonio *Joh. Fan-toni* l. c. p. 277.

a *De gland conglob.* p. 7.

b Nam ſaſſus eſt, in ſano pericardio fabricam dubiam eſſe.

cium glandularum, poris suis in pericardii cavum patere dicuntur, ex quibus succum emittant, qui cor adluit.

Magno hæc plausu, ut omnia fere *Malpighiana*, & tunc, quando nova erant *c*, & nuper *d* accepta sunt. Accedit etiam Cl. *Pozzi* *e* auctoritas, qui in vitulis solidas, albas, racemosas glandulas, inter duas pericardii laminas poni scripsit. Vesiculas pellucidas inter pericardii membranas nuper etiam Vir Ill. proposuit *f*. Poros plerique *g* prosectores retinuerunt, qui expressi aquula stillent. Ejusmodi poros humorem exsudantes in bubulo *h* pericardio, & in elephantino *i* demum, Cl. viri repetierunt.

Fuerunt denique, qui in ipso corde glandulas admiserunt *k*, quæ pressæ liquorem pericardii suppeditent.

Ego vero eo facilius meam ignorantiam agnosco, cum non soli *Malpighii* adversario *l*, sed illustribus etiam anatomicis *m*, non feli-

c A. J. G. Bergero de natur. hum. p. 28. J. M. Hofmanno in disp. de pericardio, Alexio Littre Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1701, p. 54. G. Comper ad Bidloi T. XXI. in morbois corporihus *d* Schmiedel in diss. de exulcer. pericard.

e l. c. p. 68. 69.

f Senac T. I. p. 19.

g J. Conr. Peyer parerg. anat. III. p. 153. J. Dominicus Santorinus p. 143. Jenty III. p. 451. Raymund. Vieussens du cœur p. 14. tr. des liqueurs p. 175. Idem etiam ductus excretorios habet,

h Fanton l. c. p. 284. & animadv. ad Pacchionum p. 109.

i Parisini in memoir. pour servir à l'histoire des animaux.

k Lud. Ferd. Marsigli in husonis anatome, quæ exstat in operis Danubiani T. VI. T. 16.

l Hieronymo Sbaragli Vigil. ment. & ocul. p. 42. Folliculos rejicit.

m J. Domin. Santorini obs. anat. p. 142. Rejecit etiam pericardii glandulas Fridericus Ruyseh advers. anat. I. p. 13.

cior solertia fuerit. Nempe ego quidem nihil unquam aut glandulæ simile in pericardio vidi, aut conspicuo poro, de quo succus exprimi possit, Neque tamen unice ab hac mea minus felici industria me convinci passus sum. Nam & liquoris pericardii coagulabilis natura me commovit, quales lymphæ, longe plerumque, absque cryptarum ambagibus a natura parantur: & denique experimentum confirmavit, quo secretionem succi cordi circumfusi facillime imitor. Si enim liquor pericardiaco simillimus ex arteriis ipsis, non alio organo medio, exsudat, omnino imprudens videtur curiositas, qua alij ex conjectura fontes repetuntur, quorum in ista fabrica pericardii nihil simile reperitur.

Ergo si vivi animalis cor pericardio nudaveris, adparet omnino & ex toto corde, & ex pericardio fumum exhalare, qualem etiam calens peritonæum, & pleura, & dura mater emit, & quem in aquam coire novimus. Idem experimentum ab alijs viris Cl. factum est *n*. Si linteo vivæ bestię cor operueris, id videbis madefieri *o*. In vivo cane videas vaporem fætidum in guttas consistere *o**.

In cane strangulato rubrum liquorem de auriculis exsudare *Portalius* vidit *o***.

n *Kaauw* n. 539. 541. 542. Iosarum se sudantem vidisse. 668. 669. 670. *Senac* l. c. p. *La Fosse* cours d'hippiatr. 267. *Stenzel* de steatom. aortæ. *o** *Kyper* hum. pericard. n. 36. *o* *Stenzel* ibid. De intervallis fibrarum cordis muscu- *o*** *Ad Lieutaud* p. 383.

Sed licet omnino hic arti naturam imitari. Si enim in arterias coronarias cordis aquam crocatam, aut ichthyocollam in debili frumenti spiritu dissolutam, ex siphone inpuleris *p*, tunc equidem manifesto ea aqua, aut gelatina, quam inmisisti, sudabit undique de minimis, nulli oculorum aciei accessis, porulis cordis, aurium, pericardii, magnorum vasorum, inque guttulas colligetur. Adparet adeo, eandem humoris pericardii scaturiginem esse, quæ reliquorum vaporum caveas majores corporis humani replentium, atque eum humorem perinde de osculis minimarum arteriolarum exsudare.

Simili artificio argentum vivum in pericardium depluit, cum in arterias fluidum metallum *Vieußenius q* impulisset. Vidit *Idem* vir Clar. spiritus vini guttulas de exteriori facie cordis stillasse *r*, & aquam de corde mytuli sudasse, alius ex ea gente celebris professor *s* testis est.

Felix ergo medicorum communis *t* olim conjectura fuit, qua hanc pericardii aquam ex vaporibus nasci docuerunt, nullo equidem experimento usi. Sed eo nollem hanc theo-

p *Idem* experimentum fecit
III. *Kaauw* l. c. n. 552. 690.
691. 694.

q *Raym. Vieussens tr. des*
liqueurs p. 175.

r *Idem tr. du cœur* p. 16.

s *Mery Memoir. de l'Acad.*
des scienc. 1710. p. 422. *Ky-*
per l. c. n. 53.

t *Johannes Vesling D. de*
Marchettis, J. Antonides van
der Linden, P. Ant. Moli-
nettus, Ger. Blasius, Isbran-
dus van Diemberbroeck, J.
Jac. Harder, Theodorus Craa-
nen, ut paucos ex plurimis
feligam.

riam extendi, ut de ipso sanguine aliquid per auricularum poros exhalare, aut de pressis auriculis guttulas sanguinis in pericardium stillare doceam v. Novi in fummis naturæ se vindicaturæ conatibus aliquid fieri ejusmodi, quando pulmo immeabilis resistit, cordis vero irritata virtus in obstaculum nititur: uti non dudum in nobili viro factum novi, quem subita spiritus interceptio intra paucissimos dies abstulit, & cui pericardium cruenta lymphæ plenum fuit, cum a morte incideretur. Verum in sano homine ejusmodi nihil locum habere constat, cum aqua pericardii in animalibus viventibus limpida omnino & decolor per id velamentum pelluceat. Denique in alio exemplo vera auriculæ rima sanguinem in pericardium dimisit v*. Cæterum de auriculis Cl. viro vapor uberius exhalare visus est x.

§. XXVIII. *Resorbtio.*

Idem de hoc vapore, quod de omnibus aliis fumis animalibus pronunciare licet. Uti nempe per arterias generantur, ita per venas resummi necesse est, nisi velis in inmensum congeri, & ejusmodi hydropem pericardii efficere, qualem descripsimus. Sed etiam experimentum has venas absorbentes confirmat. Nam

v *Thebes. de circul. sang. cad. des scienc. 1752. p. 262. per cor. p. 30.*

v* *Lieutaud Mem. de l'Acad. 263. x Kaenow n. 694.*

aqua crocata in venas coronarias y cordis impulsæ, omnino guttulis minimis de universo cordis extimo ambitu sudat z. Extimum id velamentum siccum bibit a morte aquam, in quam cor dimiseris a.

An de lymphatico genere ex venulæ fuerint, quæ aquulam cor adluentem resumunt b? Sunt certe, quas diximus, inspersæ pericardio glandulæ, de conglobato genere, sunt interjecta lymphatica vasa a claris viris dicta c. Sed etiam ego & in corde, & in glandulis averfæ parti pericardii bronchisque circumjectis, vasa aquosa & valvulosa reperi. Verum de hali-tuum per lymphatica vasa resorbtione alibi rationes utrinque propositas recensui, meamque sententiam dixi d*.

S E C T I O II.

C O R D I S A U R I C U L Æ.

§. I. *Cor in quibus animalibus natura fecerit.*

COR vocamus cavum musculum, qui sanguinem in maximas animalis arterias expellit.

y Conf. *Idem* n. 703. 748.

z n. 706.

a n. 707.

b Ut *Lancisio* placet l. c. p. 37.

c *Comper* ad *Bidloi* T. XXI. Addit ad ductum thoracicum ire. J. *Fanton* in opuscul. anat. p. 178.

d* L. II. p. 312.

Quare omnia omnino animalia quadrupeda, aves, pisces, insecta corde dotata sunt, quæcunque aut arterias & venas, aut omnino alterum eorum vasorum genus habent. Aliquanto ergo latius hujus primarii organi imperium patet, quam quidem *Aristoteli* notum fuit *d*: neque enim in iis animalibus solis cor reperitur, quibus sanguis inest. Nam omnino & erucis, ut continuo dicitur, suum cor est, paulo alterius figuræ, & longe minoribus etiam animalibus de vermium genere, lumbricis, ostreis *e*, buccinis *f*, pectinibus *g*, lepore marino, pediculis varii generis *h*, & nonnullis microscopicis animalculis *k*, & marino microcosmo *l*, quod inter informissima animalia est. De rotifero ambigitur; sunt qui admittunt *l**, sunt qui dubitant *l***.

Non ideo in omnibus animalibus cor reperitur. Et abest primo, quantum ex communi *Abrahami Tremblay, Caroli Bonnet, Aug. J.*

d De partib. anim. L. III. c. 4. L. IV. c. 1.

e *Harvei Exerc.* I. p. 148.

f *Redi degli anim. vivent. nell. altr. anim.* T. XIX. f. 6.

g *Phil. Transact.* n. 229.

h In humano pediculo & cor & aurem vidit *Henricus Pomer*, duas nempe vesiculas alterne pulsantes, *microscop. obs.* 6. In pediculo cyprini simile cor omnino vidit *Henricus Baker* *employment for the microscope* p. 276.

i *Baker employm.* *ibid.* al-

terne contractum p. 279. *Corti* p. 177. In alia specie nullum vidit p. 294.

k *Description de plusieurs microscopes* p. 54. 55. 69. T. 6. f. 10. in polypo grenade P. I. p. 69. nov. ed. in *chenille*, ut vocat *aquatique* *ibid.* T. I. p. 55.

l 1. c. T. 22. f. 3.

*l** *Corti* p. 173. oscillans ullum quandiu rota circumagitur *Fontan viper.* p. 150.

*l*** *Spalanzanus*, qui pro ventriculo habet.

Roefelii & aliorum clarorum virorum industria constat, a tota polyporum numerosa gente, quæ in dulcibus aquis, aut in tubulis varii generis, aut in caulibus plantarum coralloidum habitat. Abest etiam ab aliis, ejusdem ferè ordinis animalibus, quæ vir in observando clarissimus, *Vitalianus Donati m* in spongiis, alcyoniis, aliisque marinis zoophytis reperit. Nullum est in feta aquatica *m**; nullum quantum reperi, in tænia, in holothurio *m***, nullum in echino *m****. Sed neque microscopica illa natio animalculorum, quorum crudelia bella *Johannes Hill n* descripta dedit, cor reperitur, & in universum ejusmodi organum non videtur desiderari, quoties totum animal unum continuumque intestinum est, tum in iis omnibus bestiolis, quæ nulla a toto reliquo corpore diversa vasa, propriis percursa humoribus, nacta sunt. Quomodo victimæ *o*, & fetus monstrosi, & denique homines corde caruerint, alio loco rectius dicetur.

Fraudi forte fuit *Aristoteli*, longe majori viro, quam quidem vulgo creditur, quod minoribus animalibus, maxime vero de eo genere, cujus longitudinis ad latitudinem magna portio est, alterius, quam nobis, figuræ cor

m In *historia maris hadriatici*.

*m** *Fontana viper.* p. 147.

*m*** *Swed. Wet. Acad. handl.* 1765.

*m**** *Comment. Acad. Bonon.* VI, p. 241.

n In *microscopical observat.*

o Plerumque adipis copiam rudibus professoribus fraudi fuisse, probabilis est *Spigelii* conjectura *hist. anat. corp. hum.* p. 272. Conf. *Kerkring spicileg. obs.* 66.

est. Animalia enim quadrupeda, avesque & plerique pisces, cor crassum, breve, collectum, nacta sunt, qualia quidem corda in cancro etiam, ostreo, pectine, buccino, & nonnullis minoribus bestiolis sunt. Sic & in cochlea veri nominis cor est, certe in cochlea, quæ vitalem humorem per sua vasa in corpus *p* didit.

In vermibus terrestribus & aquaticis, in scolopendra, in marina hystrice, inque multis insectis reperitur alternis nodis interstinctum *q*. Id cor in vermibus videtur intra canalem alimentarium contineri *r*, & ex duobus *s*, tribusve truncis fieri *t*. Idem vero cor, etsi salit motuque videtur peristaltico agitari, tamen quod nulla in vasa suum humorem didat, *Petrus Lyonnet*, certe in eruca, cor verum esse negat. Analogia tamen & motus, & proportio ad corpus cylindricum animalis, cor esse suaserint, & paradoxum videtur cum alii Cl. viri, minori cum vitrorum convexorum apparatu, insectorum vasa viderint, *Lyonneto* nulla adparuisse: de qua equidem lite nihil habeo, quod de meo lucis adferam *t*^{*}.

Unicum denique in omni animale cor est, neque enim exceptionem a monstrosis fetibus repetas, in quibus nonnunquam cum duobus

p Harder in obs.

q Pallas miscell. p. 130. in Nereide.

r Muller Wasserwürmer p. 27. 28. 29.

s Id. ib. Naturforsch. Gesellsch. 373. 374. in animalculo aquatico.

t Naturforsch. Ges. l. c.

t^{*} Conf. L, II, p. 106. seqq.

capitibus duo corda fuerunt. Si unquam ut in raro illo *Vioussenii* *t** exemplo, vere duo corda in eodem homine inque quadrupede visa sunt, putes monstrosæ fabricæ fuisse vestigium, qualis est in corde inverso, quod mucrone suo dextrorsum inclinatur. Duo esse in perdicibus doleas *Sponio* excidisse, erudito viro. *Vioussenii* secundum cor dilatatam venam cavam fuisse *Cl. Sabatier* autumat.

Si cor longum erucarum & vermium quemque nodum habet seorsim salientem *v*, videbitur potius esse canalis alterne dilatatus, quam cordum series. In nereide cuique articulo suam esse arteriam *Mullerus* *x*. Verum non dubium est, quin a cauda una continua serie sanguis ad caput promoveatur.

§. II. *Figura in homine.*

Sed accuratius oportet de cordis figura dicere, qualis in homine est. Eam cum cono comparare possis, quem planum aliquod per axin transeuns bipertit. Ita nascitur, ex rotundo quidem ambitu coni, quem secantes circuli suis peripheriis terminant, *facies convexa* *y*: ex planis vero triangularibus, quæ sectio separavit, *facies cordis plana* *z*, quas voces *J. B. Wins-*

*t** *Mal. int.* T. II.

v *Muller* l. c. p. 175.

x *Wasserwürmer* p. 27. 28.

y *Winslow* *Memoir*, de l'A-

cad. des scienc. 1715. p. 229.

Expos. anat. T. IV. *Traité*

de la poitrine n. 70. 76. 77.

B. *Winslowus* utiliter excogitavit. Easdem cordis facies F. *Ruyschius* *a* non ignoravit, non tamen satis recte in robustis hominibus solis adparere putavit.

Verum, uti in universum natura in corpore humano vix unquam figuras penitus regulares secuta est, ita neque in his faciebus perfecta coni secti similitudo reperitur. Nam superior quidem cordis facies sic satis coni teretem rotunditatem, in acumen extenuatam refert, cujus altera medietas in plano convexo, altera in plano cordis rectilineo conspicitur. Deinde & in superiori plano, & in inferiori etiam magis, linea depressa *b* eam teretem rotunditatem terminat, atque vasa majora educit, & cor bipertit.

Anterior vero eademque humilior cordis sedes non perinde convexa est; sed in superiori plano pene plana, antrorsum extenuatur in aciem, quæ in plano inferiori, alteram pariter rectilineam superficiem cordis terminat. Hic planus angulus insigniter acutus est. Quare si minutius figuram scrutari placet, quæ a cordis sectione nascitur, circulus erit, ex cujus ambitu duæ tangentes ducuntur, quarum altera horizonti parallela, cum altera oblique ad istum inclinata angulum acutum intercipit. Hanc aciem marginem cordis *c* acutum vocavi. *Ve-*

a *Ruysch Thes.* IV. n. 96.
In T. III. f. 1. planam faciem, in f. 2. convexam exprimit.

b *Conf. fascic.* IV. *1c.* anat. f. 3. *Senac* T. V. f. 2.

c *Diff. de vas. cord. propr.* n. 2.

salio d non ignoratus fuit, ut tamen dextræ fedi cordis non penitus accurate tribueret, qui totus anterior sit.

Porro uti in cono & basis est, & apex, ita etiam cordi sua, cum hoc nomine vulgo nota, & *basis* est, & *apex* sive mucro. Et illa quidem variis additamentis aucta, sed tecta etiam & occultata, tota in homine dexterior est, quam medium sternum, atque una, si cum mucrone comparaveris, posteriori loco ponitur, & aliquanto superior. Si accuratius cum costis contuleris, pars baseos ima respondet vertebræ octavæ, eaque aliquanto dexterior est. Anterius retro costam quintam, quartam, tertiam, & secundam ponitur *e*.

Mucro cordis neque in omnibus animalibus, neque in ejusdem animalis quavis ætate, idem est, semper equidem basi gracilior, sed multo in nonnullis animalibus acutior *f*, in homine obtusior, & in fetu, quantum vidi *g*, aliquanto etiam, quam in adulto crassior, cum uterque ventriculus in ea ætate pene æque longus sit, in adulto sinister magis superet.

d L. VI. c. 9. p. 729.

e Eustach T. XXV.

f Longissimum vidi ventriculum finitrum in fetu ovillo, longissimum etiam in hædulo *Second mémoire sur le mouvement du cœur* Exp. 484. In cane, quam in homine, cor acutius esse auctor est *Alex. Monroo essay on com-*

parative anatom. p. 42. In pullo ovi incubati diu ventriculus dexter brevissimus est, mucro vero satis acutus, unico fit colliculo.

g Vide icones nostras ad valvulam Eustachianam in *fasciculo* IV. datas f. 3. 4. Fetus ventriculus dexter æque longus est *Harveii* p. 153.

Bicollis adeo *b* in homine mucro, ex duorum conorum apicibus componitur, quorum anterior plerumque brevior, sinister plerumque longior est. Neque enim dissimulo, etiam in homine nuper in lucem edito, dextri ventriculi longitudinem aliquando superasse.

Non ergo soli elephanto cor bicolle est *z* aut raris nonnullis hominibus *k*: sed ea ejus visceris maxime frequens figura est, ut duobus obtusis colliculis finiatur, quos crena dividit ei lineæ continuata, quam dixi cor dividere. Recta ita se plerumque habere, post antiquissimos anatomicos *l*, monet *Morgagnus m*, & *Santorinus n*, etiam si uterque, ad alia a nostris experimenta, aliqua contraria exempla citat, in quibus duo vertices minus evidenter distinguebantur. In *Dryandri* icone sic *o* satis bifidus cordis apex bene exprimitur; in *Ruyschiana* vero elegantissime *o**. Alias divisio magis evidens, & cor pene bifidum fuit *o***.

§. III. Cordis situs.

Cæterum mucro cordis & anterior *p* quam

b Ibid. f. 3.

z Ut veteribus & *Guil. Stukeley* visum in anatome elephante, quæ prodiit cum ejus *history of the spleen* p. 79.

k Ut *Riolano* l. c. p. 236.

l Apud *Galenum* adm. anat. L. VII. c. 10.

m *Epist. anat.* XV. n. 59.

n *Observ. anat.* p. 143.

o Ad *Mundinum*.

*o** *Thes.* IV. T. III.

*o*** *Barthol.* Cent. I. obs. 67.

p *Morgagn.* ibid. n. 51. ss. *Walther* de obes. & vorac. p. 7. & olim *Vesalius* l. c. p. 730. priorque *Aristoteles* *histor. anim.* L. I. c. 17.

basis est, & aliquanto inferior *q*, atque in aliis cadaveribus respondit parti cartilagineæ costæ quintæ, in aliis confiniis cartilagineæ & osseæ partis dextræ costæ *r*, aut hujus cartilagini. Idem mucro nudus pectus percutere videtur, si ex cadavere judicare licet, pro ipso enim de sinistro pulmone quasi particula defecta est, cum reliquam cordis longitudinem pulmones contegant *s*. Quomodo in vivo homine pulmo amplior sit, alias ostendi *t*.

His præmissis facilius nunc intelligitur, quomodo in homine cor positum sit. Nempe tota facies inferior pericardio incumbit, hoc transverso septo, in ea, quam descripsi, sede *v*. Facies vero convexa ita surgit, ut ea pars altissima sit, ex qua pulmonalis arteria prodit *x*.

Cum reliquo corpore humano unice jungitur per vasa, & per sinus venosos. Isti nempe sinister quidem in transversa linea *y*, dexter in perpendiculari *z* cum pericardio cohererent. Deinde arteriæ pulmonalis ramus dexter *a* & truncus *b*, aortæ truncus *c*, venæ pul-

q Morgagn. ibid. n. 55.
Senac p. 183.

r Winslow l. c. n. 74. *Dis-*
dier l. c. p. 31, 32 Ad car-
 tilagines septæ & septimæ
 costæ *Vesal.* p. 730.

s Conf. *Santorin* p. 142.
Winslow *Memoir.* l. c. p.
 231. *Cheselden* T. XXI. l. c.
t *S.* I. p. 27.

v Morgagni l. c. n. 51.

x Id. ib. n. 57. 58. *Ruyssch*
Thef. anat. IV. tab. 3. f. 2.
Winslow *Memoir.* l. c. *Ex-*
posit. anat. l. c. n. 75.

y p. 30.

z p. 33.

a Ib.

b p. 30.

c Ib.

monales omnes, aut binæ aut singulæ *d*, vena cava superior *e* & inferior *f*, cum pericardio coalescunt, eaque ratione cordis pars superior & dextra firmatur, quantum quidem ab ipso pericardio firmitatis accedere potest, & imprimis a magnorum vasorum progressu, quem totum undique ad vicina viscera, ossa, musculos, partes firmas alias cellulosa tela revincit *g*. Pars reliqua media inferior & sinistra cordis tota libera est, quantum quidem limites pericardii permittunt.

Cæterum omnino non potest dissimulari, hunc verum cordis humani situm vetustis anatomicis non satis intellectum fuisse, cum in tanta cadaverum humanorum raritate ad bestias confugerent, in quibus cor omnino aliter ponitur. In quadrupedibus nempe sternum horizonti fere parallelum est; huic cor ita incumbit, ut basis pene integre in cadavere supino superior, sive capiti propior, mucro perinde pene perfecte inferior, sive abdomini vicinior sit, etsi aliquantum a septo transverso distat *i*. Deinde parum abest, quin linea pectus per medium secans, perinde etiam conum cordis æqualiter bipertiat *k*. Suavi adeo in tanto hominum a bestiis discrimine risu dignum est & dissidium medicorum Durlacensium

d p. 28. 29. 30.

e p. 28.

f p. 34.

g L. II. p. 118. seqq.

i Morgagn. l. c. n. 51.

k Morgagni l. c. n. 55.
Monroo essay on comparative anatomy p. 40. de cane locutus.

de cordis situ, & iudicium ex inspecta serofa sumtum, in qua tanta cum indignatione principis ostensum est, cor sinisterius poni, ut medicus aula ejiceretur, qui in medio pectore cor sedere dixerat *l*. Sed etiam nuperiores medici pro re insolita habuerunt, quod cor mucroni suo non diaphragma verum sinistras costas respiceret *l**.

Ex animalium incisione, & forte ex cordis etiam humani de suis nexubus liberati incauta contemplatione, factum est, ut cordis duo ventriculi, duæque auriculæ, perinde in homine a dextro & sinistro latere nomen habeant, ac quidem in brutis animalibus habere æquum fuerat. Deinde etiam in satis nuperis iconibus *m* mala illa cordis positio conservatur, in qua cor mucrone suo pendet, neque diaphragmati innectitur.

Et tamen antiquus ille *Aristoteles*, cor in homine ad læva spectare *n*, deinde *Plinius* *o*, & *Ælianus* *p* homini cor ad lævam papillam fallere, reliquis animalibus magis in medio esse, scriptum reliquerunt. *Vesalius* in tanta cum humanis cadaveribus consuetudine non potuit non naturam verbis describere: icones non quidem omnes *q*, sed aliquas tamen bonas dedit *r*. *Columbus* *s* etiam cor jacere,

l Thoner observ. med. 102. L. I. c. 17.

*l** E. N. C. Dec. III. ann. 3. obs. 188.

m Bidloo T. XXIV. Verheyen T. XIX. f. 2.

n Hist. anim. L. III. c. 4.

a L. XI. p. 625. edit. Hard. *p* De animal. L. IV. e. 19.

q L. VI. f. 3. 4.

r Ejusd. L. f. 5.

s De re anat. p. 176.

basinque in dextro latere, apicem in sinistro, recte monuit. *Eustachius* *t* cordis procumbentis verissimas icones dedit. *Lowerus*, post diuturnum erroris regnum, cor humanum toto latere transverso septo incumbere docuit *v*. Addidit, primus ni fallor, *J. Nicolaus Pechlin* *x*, vere superiorem ventriculum esse, qui vulgo sinister vocetur. *Fridericus Ruyschius* *y*, priorum naturæ vindicum ignarus, ad proprias incisiones coætaneorum scriptorum errorem redarguit, bonasque dedit icones *z*. Ita & *Cantius* scripsit *a*, & fusc, proque rei dignitate, *J. Benignus Winslow* *b*, idemque nomina ventriculorum ad naturam reformavit, quem recentiorum caterva *c*, ut fere solet, tota secuta est.

Et si hic omnino verus cordis situs est, in re tamen & in physiologicis, & in adgnosendis cordis morbis, magni momenti, addere omnino oportet, quo modo is situs mutetur. Et primum, cum septi transversi motu non potest non etiam cor sedem suam mutare, & inspirante animali retrorsum descendere, expirante sursum & extrorsum *c**, minus in sano homine & in exiguis inspirationibus, magis in homine, qui cum contentione spiritum ducit. Mi-

t T. XV. f. 2, 4. T. XVI. f. 1. 2. T. XV.

v l. c. p. 7.

x De cordis fabrica & usu.

y Advers. anat. I. n. 6.

z Thesaur. anat. IV. T. III.

a Impet. anat. T. IV.

b Winslow Mem. l. c. Expos. l. c. n. 75.

c Cheselden l. c. T. XXI. Garengot splanchnolog. T. II. T. II. 14.

*c** Habet etiam Sabbatier anat. II. p. 136. 137.

rum est, neque ei credibile, qui nunquam vidit, quam vehementer cum septo transverso, dum animal aërem adtrahit, cor deorsum, retrorsumque moveatur: quam violenter demum, dum pectus in expiratione arctatur, sursum idem & antrorsum revellatur *d*, & de pectore exprimatur.

Porro jacenti homini & supino, de sterno ad dorsi spinam idem cor relabitur, & in aortam decumbit. Quando antrorsum corpus inclinamus, idem ab aorta prorsum, versusque sternum declinat *d**. Quando demum in dextrum latus strati somnum capimus, tunc totum cor ad costas ejus sedis pulmonemque vergit, sinistrum vero pulmonem liberat; & vicissim. Sed etiam a turgido ventriculo mucro cordis sursum repelli potest, ut interim basis descendat: totum vero sursum removeri, quando uterus gravidus, aliaque causa abdomen undique distendens diaphragma sursum urget. Idem exhaustis subito hydropicorum aquis in abdomen descendit, aliosque cum suis vasis angulos facit, aortamque secum detrahit. Alibi ostendemus, qualia corollaria ex his observationibus sequantur.

§. IV. *Vitiosus.*

Rarior est, & aliquam curiositatem meretur;

d Vide *Fin second Mem. sur les parties irritables & sensibles* Exp. 507. 508. 509. *d** *Sabbatier ib.*

cordis inversus situs, ut mucrone suo in dextram pectoris caveam producatur, basis in sinistra sede sit, atque una omnia vasa, & abdominalis viscera, a dextris ad sinistra transferantur. Aliquot exempla hujus monstrificæ & congenitæ fabricæ *e* reperi, quæ nihil de corporis integritate detrahit, & in validissimis hominibus *f* reperta est. Huc pertinere videtur homo, cui nuper cor sub dextra papilla saliit *g*.

Alio modo, inque morbis, & funesto quidem eventu *h*, cordis pulsatio in dextra sede pectoris percepta fuit, sive vere cor ex morbo aliquo, ut ex destructo pulmone *i*, in alienam sedem migraverit, sive aneurysma aortæ *k* pulsu suo imposuerit, ut cor ibi esse crederetur, ubi pulsus erat. Ita certe in nupero exemplo se habuit, in quo manifesto pulsus sensim a sinistris ad dextra migravit, ut inter secundam & tertiam costam, ad uncia a sterno distan-

e *Mentelius* in scriptis cum *Pecqueti* diss. editis anno 1654. p. 146. *Fridericus Hofmannus* celebrioris *Friderici* pater, in *kardianastrophes* admiranda historia, cum qua conferri potest *Cl.* olim *Moellenbroeck* in *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. II. obs. 76.* Porro *Johannes Mery* apud *du Hamel histor. Acad. Reg. scient. L. III. c. 2.* *Cl. Daubenton* description du cabinet du Roi *T. III. p. 204.* *Aubertin Journ. de med. 1776. May. Stutgard æcon. Saml. n. 2.*

rum cadavera *Mentelius* & *Meryus* dissecuerunt.

g *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. II. obs. 194.* & *Memoir. de l'Acad. des scienc. 1743. p. 356.*

h Latus dextrum pectoris feriri, funestum est *Riolan. animadvers. in C. Bauh. p. 703.*

i *Journal des sçavans 1668. n. 3.*

k *Lancis p. 132.* Funestum & hereditarium morbum esse *J. L. Targioni raccolt. I. p. 122.*

f Latrones fuerunt, quo-

tiam perciperetur. In latere dextro cor frequenter pulsavit, idque vitium sæpius *Storchi*us vidit, quando aqua in pectus effusa erat *k**. In aperto cadavere cor ad perpendicularum positum, quale in brutis animalibus est, aortæ vero aneurysma repertum est *l*.

Alio modo cor inversum vidit *Josephus Ignatius Torrez*, & apud Ill. *Sandyfortium* Cl. *Dinkler*, ut apex sursum respiceret, basis inferiori loco esset *m*: alio, procul dubio frequentiori, idem viscus ad septimam costam in diaphragma prolapsum *Pacchionus n* vidit. Neque absque exemplo est, pariter uti nonnunquam abdomini sua tegumenta deficiunt, ita per aliquod parietum pectoris deliquium cor nudum pendulumque, in catellis *o*, & in nuper natis hominibus *p*, de pectore emeruisse, nudumque circumgestatum fuisse.

§. V. *Auricule Cordis in universum.*

Has quasi primas lineas historię cordis circumscripsimus. Nunc per singula ituri initium ab appendicibus cordis sumemus, aut atriis,

*k** *Jahrgang* 1721. p. 58.
& alias.

l *Eph. Nat. Cur.* Vol. X.
obs. 39.

m *Philos. Transact.* n. 461.
Mémoires des savans étrangers
T. I. p. 140.

n *Oper. omn.* p. 212.

o *Journal des savans* 1681.
n. 14.

p Cl. *Buttnerus* in proprio libello a 1747. Regiomonti edito. *Martinus Martinez* in lib. de corde monstroso infantuli, quem in II. tomo meæ collectionis anatomic. disput. recudi feci.

quæ ab aliqua in dextris similitudine *auricularum cordis* nomine veniunt, & quorum pars *sinuum* nomine nota est. Non absque aliquo discrimine scriptores anatomici his vocibus utuntur. Plerique, & antiqui, & recentiores *q* auctores, communi nomine *auriculæ* id totum receptaculum intelligunt, quod a magnis venis, in dextro, & in sinistro latere, sanguinem accipit, & utrivis tradit ventriculo. Alii, & princeps *Boerhaavius r*, strictius aliquanto auris significationem finiunt, eoque nomine unice eam caveam intelligunt, quæ carneis laceratis intus percursa, marginibus crenatis distinguitur. Idem sinus nomine atrii cordis eam partem intelligunt, quæ & extus absque crenis levis, & intus absque cancellis est. Non potui hic in sensu vocum discrimen dissimulare, quod omnino in ista theoria circuitus sanguinei insignem errorem peperit.

Cor venarum esse principium olim *Aristoteles r** dixit. Cor ad venas pertinere idem *Stagyrites r***. De auriculis res manifestior est: ut non male *auriculæ cordis* dudum ad venarum partes relatæ *r**** fuerint. Eas æque late pa-

q Winslow l. c. n. 65 Wal- *hault in observaz. anat. syst-*
ther de cordis auricularum fa- *scbe p. 63.*
brica n. XI.

r Sonn. vigil. Part. anim.*
r Instit. Rei Med. n. 158. II. c. 4.

*r** Part. Anim. II. c. 4.*
Eodem modo his vocibus ut- *r*** Back de corde p. 159.*
tuntur J. Jacobus Rau in
append. ad amphitheatr. Zoo- *Helvetius éclaircissement p. 41.*
zomic, & Simon Petrus Rou- *&c. Weitbrecht Comment.*
Acad. Petrop. vol. V. p. 300.

tere constat, quam venosum systema, ut nullum omnino animal cor auriculis destitutum habeat, cui venæ fuerint: neque enim in iis animalibus aures reperio, quibus cor longum, idemque etiam princeps arteria est, & in quibus vasa venosa ab arteriosis distincta nondum evicta sunt. Ad venosum enim sanguinem recipiendum manifesto auriculæ factæ sunt, tum ut musculosa vi in cor urgeatur, & majori unda cor melius distendat s, atque acutiori stimulo ejus musculi contractionem provocet: tum inprimis, ut receptaculum sanguini venoso præbeant, quoties aut cor in contractione sua laborans eum sanguinem admittere nequit, aut pulmo sanguine plenus in nixu, inspiratione diuturna, aliisque ex causis, transitum cruoris per pulmonem morantibus, novo a venis redituro sanguini resistit s*. Hanc enim aurium fabricandarum causam esse exemplo receptaculi venosi, amplissimi, demonstrari videtur, quod in iis animalibus reperitur, quorum vita amphibia longas sub aquis moras requirit, ut in testudine, cujus venosum receptaculum & a *Johanne Mery t* & a *Josepho Duverney v* descriptum existat. Tanto nempe amplius venoso sanguini receptaculum natura paravit, quanto diutius prævidebat sanguinem ante cor admissionem expectaturum esse. Quomodo vero ve-

s Conf. *Senac l. c. p. 343. scienc. 1703. Hill reviem p.*

s* *Sauvages de pulsæ p. 14. 113.*

15.

t *Memoir. de l'Acad. des*

v *Ibid. a 1699.*

nae contracto cordi, magis quam robustior auricula, resistere possint, aut quomodo frangendæ huic sanguinis venosi resistentiæ aures inserviant, ego quidem non intelligo. Ranæ aliquid simile est, vena nempe cava sub corde amplissima; sic in piscibus video, inque phoca, calido animale, quod ex vitæ suæ ratione diu sub aquis degere cogitur. Amplissimum receptaculum in bipede amphibio *Hunterus* reperit, pericardii simile, & perinde cor comprehendens.

Auriculæ cordis in iis animalibus binæ sunt, quibus sanguis calet: & quibus iisdem duo cordis ventriculi sunt, & quatuor vasa magna cordi connectuntur, & demum sanguis ex priori ventriculo in posteriorem tunc demum trajicitur, quando per pulmonem totus transiit. His enim animalibus, uti duo trunci venarum, ita duo atria sunt, in quæ eorum truncorum sanguis effunditur. Contra unica auricula est, ubicunque unicus cordis ventriculus α , & ubi sanguinis exigua portio per pulmonem trajicitur, quibus etiam animalibus sanguis friget, aut certe exiguo super aquam gradu tepet. Unicam certe ego auriculam in piscibus γ reperi, quoscunque incidi, neque rationem intelligo, quare duas pro unica vena natura parare voluisset. Ergo, ut aliis auctoritatibus meam tuear, unica auris, inter pisces, reperta

α *Harvei* p. 76.

pisc. p. 105. *Artedi ichthyolog.*

γ *Rondelet de piscibus* L. p. 29.

III. c. 14. *Severinus de respir.*

est in salmone *z*, mustela *a*, cyprino *b* plano, lampetra *e*, acipensere *c*^{*}, galeo *d*, cane carcharia *d*^{*}, xiphia *e*, mola *f*, rana *g* piscatrice, torpedine *h*. Grandis vero pro cordis portione auricula, & pone cor, & dexterior ponitur.

Quare, cum nonnulli scriptores etiam in piscibus duas auriculas cordi tribuant, videntur omnino aliqui Cl. viri, aortæ durum crassumque bulbum, pro *auricula* habuisse *i*, quam etiam hoc nomine addito *arteriosæ* epitheto designant: alios receptaculum venosum in auriculam patens pro vera aure numerasse existimabile est. Et illum quidem bulbum aortæ piscium dudum *Casalpinus k* pro tertio cordis ventriculo habuit.

Sed etiam in quadrupedibus oviparis, quæ alioquin piscium classem cum avibus media conjungere videntur, unicam aurem reperi, in lacerta vulgari, in altera viridi elegantiori, in rana, & bufone: in quibus omnibus redeuns

z Gering in disp. cit. *Leeuwenhoeck Philos. Transact.* n. 319. f. 2.

a Gering l. c.

b Collins l. c. T. 34.

c Idem p. 777. *Power obs.* 32.

c^{*} Gronov. *Mus. Ichthyol.* II. p. 44.

d Collins T. 32. & in *memoir. pour servir à l'histoire des animaux.*

d^{*} Collins T. 71.

e Bartholin *hist.* 16.^a Centur.

II.

f Janus Plancus in *Comment. Acad. Bononiens* T. II. P. II. p. 301.

g Charleton *Onomast. Zoic.* p. 70. de piscibus.

h Lorenzini *crampfish* p. 85.

i Ut Cl. Perrault *essays de physique* T. III. p. 260. T. XII. f. 3. Conf. Gering &

Leeuwenhoeck l. c. In *Xiphia Kölpin Sw. Wet. Handl.*

k *Quæst. peripatet.* p. 119.

a 119. b.

ex venis unda sanguinis totam aurem una replet, & una, dum in ventriculum transit, tota deferit. Similia nostris testimonia sunt in testudine *l*, crocodilo *m*, vipera europæa *n*, & altera caudifona *o*, inque amphibio animale bipede *Hunteri*.

Mirum in re facili potuisse dissenfum inter scriptores locum habere : non in testudine sola *p*, singulari animale, & cujus cor in universum inter unius, duorumque ventriculorum corda ambigit : sed omnino etiam in crocodilo *q*, chamæleonte *r*, rana *s* denique, quod animal mihi adeo familiare est, ut neque canes magis familiares sint. Suspiceris alteram auriculam hoc ipsum carnosum esse receptaculum, vel demum imperfecto septo auriculam dividi, ut in lacerta apode *s**.

l Ita *Blasius miscellan. anat.* p. 272. *Collins l. c.* p. 773.

Olig. Jacobæus de ramis p. 105. Bipartitam tamen vocat.

m Ita dignus testis *Olaus Borrichius in hermetica sapientia Ægypt.* p. 276.

n *Franciscus Redus degli insetti* p. 73. semibilocularem fecit. *Charas T. III. anatomes viperæ*, nam alter ventriculus eorum, quos numerat, omnino auricula est. *Albertus Seba Thesaur. T.* 109. f. 9. etiam semiduplicem vocat.

o *Tyson Phil. Transact.* n. 144.

p Duas huic auriculas tribuunt *Josephus Duverney l.*

c. Mery l. c. Johannes Faber ad F. Hernandez p. 728.

J. Bap. Caldesi observ. anat. nelle Tartarughe p. 60. *Fryer itin. Orient.* p. 123. *Du Tertre hist. des Iles Antill. T. II.* p. 228. *Griffith Hughes natural histor. of Barbados* p. 309.

q *Jesuitæ Siameses in Observ. d'Anat. & de Physique* p. 28. *Duverney ibid.* p. 32.

r *Parisini in Memoir. pour servir à l'histoire des animaux* : *J. Nic. Pechlin in observ.* p. 387. *Ant. Valisneri in oper. omn. T. II.* p. 417.

s *De ranis* p. 83. 84.

*s** *Nov. Comm. Acad. Pe-*

trop. Vol. XIX.

Unicam demum auriculam vermes & insecta ejus classis nacta sunt, cui cor breve est, astacus *t*, crabro *v*, ostreum *x*, mytulus *y*, buccinum *z*, cochleæ.

§. VI. *Auricula dextra.*

Verum ad hominem rediisse præstat. Ejus ergo cordi duæ auriculæ præponuntur, quarum quæ *dextra* est, id nomen utique merito accepit, quæ adeo dextra sit, ut nihil in toto corde sit dexterius: nisi forte ex subtiliori anatomicæ aliquam particulam sinistri sinus excipere volueris, quæ duabus venis pulmonalibus interjicitur.

Eadem fere ad perpendiculum ponitur, atque ima sua parte transverso septo nititur *a*.

Figuram verbis depingere difficile fuerit. Ad corpus elliptoides tamen aliquantum accedit, cum media, & altior quam media pars latior sit *b*, infima vero & suprema in acutum & cæcum finem desinat. Inferior terminus, qui ad sinistriora venæ cavæ inferioris ponitur, idem brevis est. Superior finis *appendicis* fere nomine venit, quod a reliqua auriculæ

t Willis de anim. brut. T. III. f. 1. S.

v Harvei p. 160.

x Willis l. c. p. 17. Lister de conchyl. bivalv. p. 77.

y Lister de conchyl. bivalv. T. II. f. 2.

z Idem Exercit. II. de buccinis p. 79.

a Conf. figuram Cheseldenii T. 21.

b Amplitudinem ejus auriculæ recte expressit Eustachius T. XV. f. 2.

culæ longitudine robusto, transverso fasciculo musculofo separetur. Acuta est, & curva, ut sursum convexa sit, atque deorsum quasi excisa. Eadem pene transversa, trans aortam incedit, inque hujus arteriæ, ejusque quæ pulmonem adit, intervallo terminatur, aut ad dextram demum & inferiorem oram ejusdem arteriæ, aque eo intervallo figuratur. Eam nimis brevem alii *c* pinxerunt, alii nimis rotundam *d*. Mucronem *Vesalius e* dixit, & *J. Benignus Winslow f*.

Limes auriculæ dextræ anterior & dexter solet antrorsum, qua ventriculo adhæret, eminare; dextrorsum vero & simul retrorsum se recipere versus venas cavas, quibus ita adglutinatur, ut aliquamdiu & superiorem eorum truncorum venosorum & inferiorem distinguas, in media vero altitudine, quid ad venas pertineat, quid ad aurem, ægrius separes. Hinc factum est, ut dudum Cl. viri in diversas sententias abierint, cum alii venam cavam inferiorem superiori continuari scriberent, alii utramque venam conjungi negarent. Unicam venam *Winslowus* facit, & continuam *g*, duas *Morgagnus g**. Ill. *Waltherus h*, & *Senac i*, & *Portalius i**,

c *Eustachius* T, XVI. f. 1.

g *Ruyfch Epist.* III. T. 3.

f 2. *Thef.* IV. T. III. *Chefelden* T. 21.

d *De la circulation du sang* T. I.

e p. 739. L. IV. c. 14.

f l. c. n. 66.

g *Traité des veines* n. 9.

*g** *Adv. Anat.* V. 22.

h *De fabrica cordis auricularum* p. 11. Fatetur tamen una quarta parte conjungi.

i l. c. p. 215.

*i** *Ad Liehtaud* T. I. p. 414. 415.

quod inter utramque particula interponatur, cujus fibræ aliam, quam in venis, directionem sequuntur. Mihi quidem visum est, & anterior & posterior aliquam particulam esse, quæ cancellatis & eminentibus fibris destituatur, & in qua omnino absque magno errore utramque venam conjungi adfirmes, ut tamen veræ carnis aliqua crassitie distingui videantur.

Posterior & dextra facies atrii, quando omnia integra sunt, oculis non conspicua, eadem levis, & septi loco inter dextram aurem atque sinistram, magis tamen versus dextram aurem eminet. Ea perinde & sursum, & deorsum, membrana sua exteriori, & imprimis interiori, manifesto continuatur *k*, neque facile esse credo, tendineum anulum ostendere *l*, cujus ope utraque vena cava cum dextro sinu coherere dicitur.

§. VII. *Venæ Cavæ.*

Venæ cavæ in homine utique duæ *n* sunt. Inferior brevissima est, ut ea nota fabrica humana a quadrupedum natura facile separaretur, quibus eadem vena in thorace longa est. Ea diversitas a cordis situ pendet, cum enim in homine tota lata planaue facie septo transver-

k Eustach. T. XVI. f. 2.

p. 216.

l Ill. Senaco dictum l. c.

n Conf. n. 6.

fo incumbat o, non potuit inter aurem septumque longa vena poni: contra in brutis animalibus, quibus solo suo apice pericardium ad diaphragma pertingit, satis insignis ab eo musculo ad aurem dextram distantia est, & venæ cavæ proprius eo potissimum loco pulmonis lobus subjici solet. Eadem vena cava inferior aliquanto, quam superior, amplior est, ut omnino diametri sint in ratione sesqui altera p.

Superiorem venam cavam describemus q, qua parte pericardio continetur. Ea inferiori minor, recta sursum tendit, & absque ramis ad eam sedem venit, in qua pericardium sibi innatum recipit. Rarissimum est, intra pericardii caveam venam sine pari in cavam superiorem se inmittere, vidit tamen *Guilielmus Cheselden* r, & in sue *Claudius Nicolaus le Cat* s, in equo & bove certe in basin auriculæ *Lancisus*. In simia videtur ea fabrica frequenter reperiri, cum non aliam *Galenus* describat t. Eum virum, per experimenta in homine facta, doctus refutat *Vesalius* v, cui ridiculo argumento obviam ivit *Jacobus Sylvius* x: longiora nempe olim hominum pectora fuisse, quam quidem nostro ævo sint, hinc azygam venam, cui semper eandem longitudinem

o p. 84. 85.

p Uti 12. + $\frac{5}{22}$ ad 8. + $\frac{20}{22}$

Santorin observ. anat. p. 145.

q *Eustach. T. XV. f. 2.*

r *Phil. Transact. n. 337.*

s *Histoir. de l'Acad. Roy.*

des scienc. 1738. obs. 6. 7.

t *Administr. anat. L. VII.*

c. 9.

v L. III. c. 7.

x In calumniæ 17. depul-

sione p. 144.

fuisse necesse est recipere, non potuisse eo ævo pericardium superare, uti nunc quidem in breviori pectore superat. Figmenta acerbi senis *Eustachius* cum risu repudiavit, strenuus alias *Galenus* defensor. Etiam hoc rarum est, venam cavam inferiorem circa cor inflexam, cum superiori cava in imam partem auriculæ dextræ se innisisse. Vidit idem olim *Cheseldenius* y. Rarius est, duas venas in agno cor subiisse z, aut duplicem ejusmodi venam in homine fuisse, uti obscurius *Bartholinus* a, ornate tamen & ad proprium experimentum descripsit Vir Cl. *Philippus Adolphus Boehmer* b. Sed etiam venæ cavæ inferioris aliquæ monstrosæ fabricæ occurrerunt. Venam cavam abdominalem duplicem vidit *Theodorus Kerkring* c; duas etiam, sed transverso trunco conjunctas, J. *Zacharias Petsche* d, duas demum Cl. *Scherer* e, sub hepate divisas: duas C. *Pohle**, quæ aortæ utrumque latus tegebant, & quarum dextra major erat, sinistra ex renali sinistra orta in duas iliacas fidebatur. Alio modo duæ cavæ venæ sunt, & constanter, in oviparis frigidis ut in crocodilo e**.

Cæterum & superiori cavæ & inferiori pro-

y l. c.

z *Bartholin histor.* 84. Cent. II.

a Ibid. ex *Falcoburgio*.

b In præfat. ad *Fascic.* I. *observ anat.* p. XII.

c *Spicileg. anat. obs.* 29.

d In diff. inaug. sæpe laudata, atque in collectione nostra recusa n. 77.

e In Cl. *Timmermanni* diff. inaug. de notandis circa naturæ in humana machina lusus p. 54. 55. Uterque ramus in iliacam sui lateris venam continuabatur.

e* *Progr. de venar. variet.* 1773. 4.

e** *Acad. Parisini. Mem. pour l'hist. &c.*

pe cor fabrica musculosa est. In superiori trunco, ad digiti supra cor longitudinem, carneas transversas fibras dudum reperit J. *Nicolaus Pecklin f*, quas sphincteris nomine alii donarunt g, minus commode, cum nunquam ad sphincteris modum suam venam claudant. Similes etiam in cava inferiori fibræ h ad hepar usque reperiuntur, quas vel ex contractione venæ cavæ agnoscas, quæ adeo manifesta, alibi dicetur.

§. VIII. *Pectinati muscoli Auriculæ dextræ*

Ad interiorem fabricam auriculæ dextræ progredimur. Ea in homine est ejusmodi. Ea pars atrii cordis, quæ carnosus lacertis distinguitur i, mediisque foveis, ea exteriores quidem fibras in universum transversas habet k. Interior facies numerosis musculis percurritur, in universum sibi parallelis, etsi ea vox non accurate vera est, cum ii musculi se passim ad per acutos angulos decussent, perque ramos parallelos in retis speciem conjungantur: qui rami & variæ magnitudinis, atque ipsi perinde ramosi sunt l. Eorum alii membranæ externæ

f De fabrica & usu cordis. n. 9.

g C. Bartholinus f. & nep. de diaphragmate c. 3. f. 1. Vieussens tr. du cœur p. 34. tab. 3. f. 1. Eas fibras a fibris posterioribus auriculæ deducit.

h Vieussens du cœur p. 34.

35. Etiam a fibris auriculæ has fibras derivat.

i Vesalius p. 740.

k Vieussens du cœur Tab. 3. f. 1. d.

l Senac in tab. 16. passim, maxime ad g. g.

auriculæ innascuntur: alii ab ea aliquantum distant, ut stylus interponi possit *m*. Pars auriculæ, quæ valvulæ Eustachianæ propior, eadem in universum levior est, & minores muculos habet. Cæterum hos lacertos breviter descripsit J. *Benignus Winslow n*: bonam iconem dederunt *Ruyschius o* & Ill. *Senac p*, nimis potius regulares delineavit *Lowerus q*, nimisque rotunde *Raymundus Vieussens r*.

Horum lacertorum duo fines sunt; alter anterior, est in auriculæ cum corde conjunctione *s*, ubi in albam cellulofam telam *t* desinunt, quæ auriculas ad cor revincit. Ita fit, ut auricula a corde, nullo lacerto violato, separari possit. De eo limite alibi dicere oportet. Posterior terminus est in levi parte auriculæ, quæ sinus dicitur, & in septo duarum auricularum, qua sede aliquæ fibræ dextri atrii in fibras carneas sinistrae auriculæ continuantur *v*.

Reliqua eorum lacertorum longitudo arcum describit, fere dimidio circulo minorem. Cum præterea alii aliis longiores sint, totus ambitus extremus & dexter auriculæ, uterque vero appendicis crenatus adparet, quales gallorum cristæ sunt, cum longior semicirculus dentem eminentem, vicinus alter & brevior duorum

m *Ruysch Epist. X. tab.* *r* l. c.
ii. f. 5. B. *s* *Lower l. c. a. a. a.*
n l. c. n. 67. *t* Unionem membranarum
o *Epist. 10. T. XI. f. r.* cordis vocat Ill. *Senac p. 207.*
p T. 12. & 16. *v* *Ex Ill. Senac tab. 9. f.*
q l. c. t. 5. f. 2. i. g. g. G. G.

dentium intervallum efficiat. In plenissima auricula hi dentes minus adparent.

In appendice auriculæ iidem lacerti majorem partem circuli sua longitudine \propto describunt, & ad tres fere majores fasciculos pertinent, anteriorem, posteriorem, & inferiorem, qui ab auricula appendicem separat. Iidem muscoli sibi inponuntur, neque ejus appendicis cavea continuatur, sed per eas quasi trabeculas separatur. Cum de industria minutius inquirerem, ita se habere reperi, uti dicam.

Prior musculus ex ora carnea, aurem dextram cum ejus lateris ventriculo connectente, ortus, in circuli modum ducebatur, circa radicem appendicis anteriorem, & circa oram posteriorem auriculæ, quæ septum auricularum efficit. Ejus musculi finis paulo sinisterior fuit, quam est *Eustachii* valvula. Ab hoc musculo posterius & dexterius, deinde ab altero ejus fine anteriori & sinistro & circulo ostii venosi dextri, nati sunt lacerti semicirculares auriculæ. Porro ab eodem musculo pars lacertorum appendicis dextra provenit, eorum nempe, qui sinistrorsum palmatim dispersi, alteri simili fasciculo obviam venerunt.

Is alter fasciculus natus est ex musculo altero appendicis dextræ auriculæ, orto ex parte superiori ostii venosi dextri, in fede acuti marginis, & in appendicem unice producto. Alias

idem musculus etiam in auriculam fibras suas ad radiorum effigiem spargit.

Tertius musculus, appendicis auriculæ, in alio cadavere adfuit, qui ex ostio venoso dextri ventriculi adscendit, priori paulo superior, & recta sursum porrectus, radiatas in cavam appendicem fibras edidit. Hic lacertus in altero cadavere non adparuit. Cum his nostris ea conferri possunt, quæ *Vieuassenius* y & Ill. *Senac* z de fibris dextræ auriculæ scripserunt. Ægre autem hæc absque figuris, aut præsentem cadavere rite describuntur.

Nuper demum Cl. *Portalius* z* has fibras auriculæ dextræ noviter descriptas dedit. In universum enim fere alias longitudinales, cordi parallelas esse; non oriri a fibris cordis, hinc auriculam coctam de corde decedere, ut in morbo etiam visum est z**. Aliæ porro Cl. fibræ auriculæ dextræ circumducuntur, eæque uberiores sunt. In apice uniformiter contorqueri addit, & vasa (quæ?) ambire, denique in fasciculos abire; supremas sibi propiores esse; in conjunctione auris dextræ cum vena cava superiori in torum intumescere. In fundo auricularum telam esse fibrarum muscularium; sub iis duos latos fasciculos se decussare, in ventriculos terminatos, & pone utramque aortam uniri. Sub istis planum esse continuum fibrarum longitudinalium

y l. c. p. 40.

z p. 207. seqq.

z* l. c. p. 400. seqq.

z** Apud *Queye Sync.* p. 76. sacculus pulmonalis ab auricula divulsus dicitur.

pene parallelarum, transversarum, quæ se circa orificia in appendices auricularum demittant, & circa orificia ventriculorum circumducant. Ex fundo auriculæ dextræ in columnas recurvas secedere, & in diversa abire versus auriculæ convexitatem; alias compositas, simplices alias, quarum illæ passim tendineæ sint, istæ totæ carneæ. Hæ columnæ simplices & compositæ, faciunt rete ventriculorum rete fere simile.

Exterius fasciculo musculofo ambeuntur, & duos fasciculos constituunt, in vena cava inferiori, inque superiori, positos, ad latera discedentes, etiam circulares. Nolim nuperrimam descriptionem per me ignorari, etsi mihi intellectu difficilis fuit.

Cæterum membrana tenera & levis, cum cordis *a* cumque venæ cavæ interiori velamento continuata, interior auriculam oblinet: exterius eidem cordis extimum involucrum inponitur, quod a pericardio nascitur. Cum vero utraque membrana tenerrima sit, & inter musculosos arcus intervalla media relinquantur, in quibus præter eas membranas nihil distendenti sanguini resistit, & auris luci obversa pelluceat *b*, intelligitur, auriculam dextram & valide dilatari posse, & demum rumpi. Utrumque vitium inprimis imminet, quando aliquod obstaculum sanguinis per pulmonem iter moratur, cavæque venæ sanguinem in auriculam conveyere pergunt, quem cor dextrum nequit emit-

a Vieussens de remot. & proxim. princip. p. 76.

b Thebes de sang. circ. per cor. p. 29, Winslow 1, c.

tere. Ita a nixu fit, aut a pòlypo dextri ventriculi, inque sinistri ventriculi vitiis circuitum sanguinis morantibus. Verum hæc exempla alium sibi locum postulant *b**. In pullo incubato aliquoties nimiam dextræ auriculæ dilatationem vidi.

§. IX. *Sinus dexter.*

De auriculæ dextræ parte levi nunc dicere oportet. Ejus altera medietas, eademque major, utique recte *Septum auricularum* audit, & ab ora dextra venæ cavæ inferioris ad eandem oram venæ cavæ superioris continuatur: sinisterius vero columna isthmi sinistra terminatur, quam paulo post describemus. Ultra eam columnam, versus sinistra, aliqua adhuc auriculæ particula levis est, intercepta inter eum isthmum, & inter cordis ostium, ad sinistra venæ cavæ; ea sedes est, quam tenet carneus valensque fasciculus, a quo semicirculares musculi pectinatæ partis auriculæ nascuntur, & qui idem ostium venosum dextrum circumit. Hæc, quam nunc diximus, atrii cordis sedes levis est, si paucas reticulatas fibras exceperis, quæ vel ad imam partem fossæ ovalis, vel ad *Eustachii* valvulam pertinent. Hanc partem levem *sinus dextri* nomine inprimis *Boerhaavius* distinxit *c*, & ab auricula separavit.

Ejus fabrica præter duas membranas exti-

*b** Don. Monro in *Ess. phys.* *c* *Instit. rei Med.* n. 135. and *litterar* III, p. 272. &c.

mam cordis, intimamque, adipe aliquo, sed inprimis fibris musculosis constat. Earum iter adeo difficile est, ut neque *Waltheri d* sermo, neque *Vieussenii e*, neque *Petri Simonis Rouhault f*, neque *Ill. & nuperi de cordis fabrica auctoris g* descriptio facile intelligatur. Cum enim neque multa strata efficiant, neque crassæ sint, neque a suo velamento facile, absque aliqua laceratione, separentur, & cum præterea eæ fibræ varias directiones sequantur, fit omnino, ut neque in cadavere nitide extricari possint, neque verbis ita describi, ut in lectoris animum pura rei idea transeat. Quare neque ipse descriptionem rei obscuræ hic exhibeo, & ad auctores, quos citavi, remitto, quorum quidem, qui nuperrimus est, & reliquis curiosior, has fibras labyrinthum *h* vocat, a rei veritate victus.

Cæterum in hoc, quod dixi septo, sinister sinus dextro posterius oppositus confervet. Pars ejus conjunctionis cellulosa tela fit, ut per aliquam suæ longitudinis partem dextrum sinum a sinistro illæsum separare possis: in ea parte cuique sinui suæ propriæ fibræ sunt. In reliqua parte utique separatio non procedit, quin aliquas carneas fibras laceres, cum eæ, quæ dextri sinus sunt, cum iis intertextæ *i* cohæreant,

d De fabrica auricular. cord.

h p. 209.

e de erubescens.

i In fovea interjectus Senac

e l. c. p. 40. 41.

Senac T. 10. f. 1. f. g. g.

f Reponse à M. W. p. 6. 7.

Vieussens p. 41.

g Senac p. 207. seqq.

quæ ad finistrum pertinent: unusque solidus integerrimus utriusque sinus paries sit. Exteriores cæterum, dextræ partis septi aurium fibræ, in universum transversæ sunt, interiores contrariis itineribus se decussant *k*.

§. X. *Tuberculum Loweri.*

Faciliora sunt, quæ ad absolvendam sinus dextri historiam addemus. De ea autem omnino oportet rejicere celebre illud *Loweri l tuberculum*, quod ex subjecta pinguedine elatum, inter venam cavam superiorem & inferiorem in angulo ponitur, quem ea sede Cl. *Auctor* depingit, & exterius *m* sinui dextro adsidet. Id tuberculum cupide receptum est, ut fere sit ab iis scriptoribus, quibus occasio ad propria experimenta nulla est *n*: deinde etiam ab aliis, qui tamen omnino in corporibus humanis disseccandis se exercuerant *o*.

Verum ante omnia monemus superiorem sinus dextri partem cum inferiori omnino angulum dextrorsum cavum, neque in homine, neque in ani-

k Senac T. 9. f. 2. 3.

l l. c. p. 34.

m Ibid. tab. 2. f. 1. 2.

n Guil. Wood *mechanic, descript. of the heart* p. 10. tab. 1. f. 2. J. Henricus Croeser in *diff. de circul. sang.* J. Henricus Schulze in *commerc. lit. Noric.* 1731. Spec. 5, & in *physiologia* sua p. 36.

ubi plurimum huic partioulæ tribuit.

o Huc Philippus Verheyen pertinet, qui etiam iconem dedit *anat. L. I. tab. 20. f. 11. L. II. tab. 4. f. 2.* Henricus Albertus Nicolai de *direct. vasor.* p. 52. qui idem tuberculum musculosum fecit, & Guil. Cheselden l. c. p. 178.

malibus intercipisse, in quibus in hanc rem inquisivi. Et in nostro quidem genere, omnino dextrorsum potius gibbus sinus *p* eminet, quem oportebat, ex *Loweri* placitis, eo loco aliquo sinu excavari. Semel ejusmodi angulum vir exercitatissimus reperit *q*.

Deinde ea sede, qua tuberculum oportuisset eminere, nihil reperio *r* præter aliquam nonnunquam adipis glebulam, quæ inter fibras musculares & membranam externam dextri sinus media interponitur, & cujus ad mutandum sanguinis iter, ad avertendum a sanguine venæ cavæ inferioris pondere sanguinis venæ cavæ inferioris, ad sanguinem in auriculam dextram *t* ducendum, nulla omnino est potestas.

Quare alii profectores hoc tuberculum omnino rejecerunt *v*, alii ad aliam in dextro sinu particulam id nomen retulerunt, ad isthmum nempe *v*, aut ad *Eustachii* valvulam *y*. Neutram *z* particulam *Lowerus* intellexit, neque dictu

p Confer iconem *Friderici* XV. n. 43. 44. *Adversar. Ruysch epist. anat.* X. tab. *Anat.* V. n. 15. XI. f. 3. B. & f. 4.

q Confer loca, quæ de tuberculo citavimus.

r Neque reperit *Augustinus Fridericus Walther* l. c. p. XI.

s *Lower* p. 35.

t *Cheselden* l. c.

v *Homobonus Pisoni* *disquisit. de circulat.* p. 343. *Laurerentius Heisterus* in *compend. anat.* n. 44. A. F. *Walther* l. c. p. 59. J. B. *Morgagni Epist. Anat.*

x *H. Ridley observ. anat. pract.* p. 184. cum de-

biscentiam inter id, de quo sermo est tuberculum, & valvulam foraminis ovalis citet.

y *Lancisus* ad *Eustachii* Tab. 16. f. 3. de mot. cord. *Propos.* 36.

z Recte isthmum non intellexisse monet Cl. J. *Jacobus Huber de foramin. ovali* n. 20.

facile est, quid omnino voluerit. In capella tamen *a*, vervece *b*, & bove *c* aliquid simile viri summæ auctoritatis reppererunt.

§. XI. *Fossa ovalis.*

Verum si nullum exterius tuberculum sinui dextro adsidet, interius tamen varii in ea parte colliculi eminent. Primo loco de *fossa ovali* dicemus, quam *venæ cavæ fossam*, minus proprie, *Raymundus Vieussens d* dixit. In septo nempe, quod dextram auriculam a sinistra dividit, media inter utramque venam cavam, sedes ita retrorsum deprimitur, ut vestigium in univrsum ellipticum in ipso septo exsculpatur. In eo vestigio paucae omnino fibræ carneæ supersunt, ut luci obversum pelluceat, solæque pene membranæ utriusque auriculæ supersint *e*. Deinde ita oblique ponitur, ut parte superiori una magis ad posteriora cavum sit *f*, deorsum vero paulatim ad priora emineat, minusque profunde effodiatur, donec in venam cavam inferiorem explanatum evanescat. In eo vestigio membrana dextri sinus alias levis *g* est,

a Morgagnus l. c.

b Idem ibid.

c In eo animale majus esse tuberculum *Joh. Fantonus* auctor est in *anat. corp. hum.* p. 291.

d *Tr. du cœur* tab. 2. f. 1. tab. 10. f. 1. tab. 11. f. 1.

e Vide fascic. IV. l. c.

f *Trem de differ. fetus & adult.* fig. 10. Conf. *Fascicul.*

nostrum IV. in descriptione valvulæ *Eustachii*, quo loco has particulas fusiùs descripsi p. 4. Adde hujus operis tab. II.

g *Comper myotom. nov.* Tab. 17. f. 1. *Trem* f. 25. 26. *Le Cat Phil. Trans.* n. 460. Iconum nostrarum in fascic. IV. quintam

alias reticulata *b*, ut aut totam fossam, aut partem certe inferiorem, variæ fibræ obducant, quæ sibi ramosæ intrlicantur. Id reticulum aliquando adeo conspicuum est, ut secundam quasi valvulam referat, quæ ab isthmi sinistro fine dextrorsum & retrorsum descendit, per ipsam columnam dextram isthmi, inque eam columnam valvulamque veriore ovalis foraminis finem facit; ejus vero arcus vulgari isthmi arcui contrarius obvertitur, suaque cornua sursum erigit. Sic etiam alias in homine nuper nato ex valvula ovati foraminis membranulam aliam adscendisse, inque supremum cavumque arcum anuli ovalis se innisisse vidi. Superius reticulum adesse rarius est.

Ita in adulto homine; in fetu vero, in quo hujus fossæ alia natura, & nobilis est utilitas, alio loco describetur *b**. Possunt interim comparari, quæ alii Clari viri de hac particula reliquerunt *i*.

§. XII. *Anulus ovalis.*

Vestigium ovale colliculus tumidus circumit, quem *isthmum*, ab aliqua cum solido duobus maribus interjecto terræ tractu similitudine

b In nostrarum figurarum *b** L. XXIX.
octava c. F. & hujus operis i Vicussens, Cl. Nic. le
tab. 2, sub L. Cat 1, c.

Vieussenius olim dixit *k*, nos *anulum fossæ ovalis* vocamus *l*. Hujus anuli aliqua vestigia apud antiquiores anatomicos reperio *m*. Evidentius *Nathanael Highmor* *n* strigam cartilaginofam dixit, quæ in media vena cava emineat. Aliam iconem dedit *Johannes Mery* *o*, cui superior pars septi aurium est: lunatum vero nimisque brevem arcum delineavit. Vittam musculofam vocavit *J. Maria Lancisius* *p*: iconem etiam *Trewius* *q* proposuit. Idem esse nonnullorum *tuberculum* non dudum monui *r*.

Hujus ergo anuli pars superior arcus est, carneisque fibris *s* pariter in arcum flexis, atque interiori auriculæ membrana tectis fit, cornubusque suis ad inferiora respicit. Ea cornua, quæ vulgo *isthmi columnæ* dicuntur *t*, satis recta secundum vestigium ovale descendunt, imis tamen finibus se mutuo respiciunt, iisque ad se mutuo convergentibus, aut omnino extenuata & planiora se amplectuntur, aut certe exiguo intervallo

k *Tr. du cœur* p. 37. tab. 2. f. 1. obscure neque optime tab. f. 4. f. 1. In primo opere *carneam fibram* dixerat, aliamque malam figuram dederat *de remot.* & *proxim. princip.* p. 128. 129. Tab. 6.

l *l. c.*

m *Hieronimus Fabricius* ab *Aquapendente* *de formato fetu* tab. 6. f. 14. tab. 10. f. 23. 24. *Michael Rupert Besler* in iconē, quæ exstat in ejus *admir. part. fetus delineatio-*

ne. Cæcilius Folius in editione *Veneta libelli, de via sanguinis* &c.

n *Disquisit. anat.* T. 12. f. 3. cum rudi iconē.

o *De la circulation du sang dans le fetus* f. 6. 7. 8.

p *l. c.* p. 108. edit. 1745.

q *l. c.* f. 20. &c.

r p. 314.

s *Mery* *l. c.*

t *P. Simon Rouhault* *offere.* *anat. fische* p. 66. *réponse à M. Winslow* p. 8.

tervallo distant. Quare hic anulus aut penitus ovalis est, aut certe exiguum, perinde ut tympani anulus, deliquium patitur v.

Harum porro columnarum dexterior & minus eminet, & levior est: sinistra, quæ venæ coronariæ ostium a fossa ovali separat, robustior eadem fibras carneas manifestius descendentes habet x.

Inter hujus isthmi summam sedem & ovalem fossam, ductus cæci & tubuli y superesse solent, ad auriculam dextram aperti, ad sinistrae sedem clausi: sed eos ductus rectius dicemus, quando de fetu, deque peculiaribus in fetu sanguinis viis sermo erit.

§. XIII. *Valvula Eustachii.*

Sequitur conjuncta cum isthmi sinistra columna *valvula*, quam fere ab inventore *Eustachianam* nominant. Certe clari viri voces z eo pertinent, etsi icon obscura est, atque reticulum versus superiorem venam cavam obversum, lunatam vero membranam, si ex figura a judices, deorsum convexam habet, ut vix naturam agnoscas, & ad foramen ovale, cum sua valvula, nuperus *Eustachii* interpretes b italus

v Fascic. IV. fig. 1. Aliquanto majus intervallum est tab. 2. sub M. O.

x Fascic. IV. 8. Fibras tamen non exprimit.

y Ibid. p. 10.

z De vena sine pari antigram XI.

a Tab. 8. f. 6.

b Caietanus Petriolus ad eam *Eustachii* figuram in tab. 16. f. 3. p. 93.

retulerit, post similem *Johannis Riolani* c conjecturam. Non ideo nego, aliam etiam ejus olim celeberrimi viri conjecturam exstare, atque ab eo veram Eustachii valvulam designari, quam eo ipso loco adesse negat *d*, & *reticularem membranam* nominat, in *auriculæ orificio oppositam*. Certius huc revoco *Johannis Sperlingii* e, valvulam, quæ prope venæ coronariæ ostium posita cavet, ne sanguis in venam cavam retrocedat.

Huic autem valvulæ in universum lunæ crescentis figura est, ut media parte latior, utrinque extenuetur. Qua latissima est, valde diversam diametrum habet. Nam & in adultis hominibus, & in fetibus nondum in lucem editis, a lineæ latitudine *f* ad dimidiam unciam *g* per omnes intermedios gradus variabilem *h* reperio. Uti latior est, ita majorem

c *Animadvers.* in *C. Bauhin.* p. 702.

d l. c. *Conf.* p. 705.

e *Anthropolog. phys. spec.* p. 432.

f Ejusmodi angustam valvulam, aut omnino non multo latiore pingunt *Guilielmus Cowper myotom. nov. T.* 37. f. 2. *J. Cr. Garengot splachnolog. T. II.* p. 140. f. 2. *C. Jac. Trew* f. l. c. f. 41. & paulo latiore f. 59. 60.

g Ita in hujus operis Tab. I. se habuit ad Q. inque fasciculæ IV. iconum T. I. fig. 7. Latam etiam depinxit *Lan-*

cifius I. c. p. 109. 110. & *C. Trew* f. 20: & descripsit *Jos. Duverney* apud *Ill. Senac T. II.* p. 631. *Morgagnus Epist.* XV. n. 28. 40. *Petrus Simon Roubault* l. c. p. 70. *J. Wilh. Albrecht* in *parænesi ad discipulos* & docent.

h Variabilem esse etiam alii Cl. viri monuerunt, ut *Jos. Duverney* in *Memoir. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1717. *Jac. Benignus Winslow* ibid. 1725. p. 25. *P. Senac* l. c. T. II. p. 678. *J. B. Morgagnus* n. 28. qui idem varios naturæ lusus sibi vi-
los recenset.

etiam venæ cavæ portionem tegit & occupat, quartam *i*, tertiam *k*, mediam & ultra *l*.

Ad perpendiculum ponitur, ut latior pars ima sit, cornua superiora; eademque constantem limitem inter auriculæ dextræ radicem ventriculo ejus lateris contiguam, interque inferiorem venam cavam efficiat. Possit deorsum convexa *m* fieri, si sanguis superne incubuerit, neque inferne alia cruoris unda æquilibrium restituerit.

Cornu posterius alias simplex est, duplex alias. Primaria & constans origo valvulæ *Eustachii* est ex isthmi, quem diximus, sinistra columna, cujus magna pars omnino in valvulam nostram degenerat, ad eam ipsam sedem, ad quam paulo sinisterior valvula venæ coronariæ incipit *n*. Vidi tamen sinisterius, quam fossa ovalis est, a columna carnea, osculo venæ coronariæ circumducta, vel ab eo musculofo margine, qui auriculam dextram orditur *o*, id posterius valvulæ Eustachianæ cornu natum fuisse.

Quando accessoria tenuisque stria ad id cornu accedit, tunc ea utique cum valvula coronariæ venæ osculo præposita continuatur. Ita quinquies omnino se habuisse vidi, & alii

i Tertiam *Walther de fabrica auricularum cordis.*

k Ut in icône Tab. II.

l *Albrecht l. c.*

m Qualem *Clar. Verdier* descripsit in *Cours d'anatomie*, l. c.

n *Conf. Cl. Senac T. I. p. 228. T. II. p. 624. Tab. nostr. 2. ad O & fig. 7. a fig. 8. a fasciculi IV.*

o *Rouhault offerr. p. 21.*

viderunt *p*. Id ipsum tamen filum carneum ad duas etiam ab ejus origine lineas ex valvula Eustachiana natum, vidi in eam partem ostii venosi dextri cordis abiisse, quæ septo ejus visceris respondet.

Ita nata valvula descendit, neque longe ab origine sua latissima est, porroque ad priora pergit, & venæ cavæ in sinum dextrum se inmittentis ostium circumit, iterumque in alterum, antèrius, corniculum gracilescit.

Id antèrius cornu, e regione originis cornu posterioris, in membranam antèrioris *q* partis venæ cavæ proximam longo fere filamento, & sensim gracilescente *r* evanescit. Hoc cornu æque altum est, aut paulo etiam humilior, quam posterior valvulæ origo: dimidiam adeo & sinistram fere venæ cavæ peripheriam valvula emetitur, aliquanto tamen longiorem, aut contra breviorè *s*, aut tertiam demum partem ambitus auriculæ circumlegit. Eadem in aliis & aliis cadaveribus varia valvula ex membrana interna dextræ auriculæ fit, quæ abscedens de eo receptaculo, inque seipsam ex acie redeuns, in venæ cavæ internam membranam

p J. B. Morgagnus *Epist. Anat.* XV. n. 40. P. Senac *cœur* cava sternum contingit Eustachius l. c.

T. I. p. 228. 229. Caiet. *Petryolus*, ad Eustachii tabulam *r* In icone nostra 7. & 8. b. quæ nondum totam longitudinem exprimit, tum tab. XV. J. Godofridus Brendel 2. P. & in icone J. M. Lancisii. in program. de valvulo Eustach. in II. tomo nostrarum disputationum resuso.

q In ea regione, qua vena

s Morgagn. l. c. n. 23. 40.

abit: media vero cellulosa tela inter utramque, quam dixi, laminam interponitur, tum fibræ carneæ venæ. Ita in fetu se habet & in juniori homine, & talem *Comperus* depictam dedit *t*. Nam in adulto paulatim, ut in carunculis fit, quæ de lacerato hymene supersunt, etiam *Eustachii* valvula crassescit, & carnosa, & pulposa fit, potissimum, qua de auricula dextra primum exsurgit. Talem *Waltherus* *v* descripsit, & Ill. *Trewius* *x*. Alias tota in ~~car~~nis similitudinem abit.

Eadem, quando integerrima, nihilque alieni passa est, utique simplices & æquabiles parietes habet, nulloque rete interrumpitur. Ita longe plerumque in fetu se habet, ut omnino raro *Morgagnus* *y* non integram viderit, neque alia fabrica Illustri quem nuper laudavi *Trewio* *z*, & J. F. *Crellio* *a* occurrerit. Sed etiam in adultis hominibus multo frequentius integra est, ut omnino decies in sexaginta cadaveribus reticulatam viderim *b*. Verum etiam, quando reticulum additum habet, origo tamen valvulæ, quæ de auris ambitu surgit, solida & absque foraminibus est *c*, solusque fluctuans margo, qui aciem efficit, variis foraminibus

t *Myotom. nov.* Tab. 37.
f. 2. Confer nostras icones f.
7. fasciculi IV. & Tab. II.
hujus operis.

v In citato progr.

x l. c.

y l. c. n. 28. 40.

z l. c. p. 52.

a l. c.

b Conf. *Fascicul.* IV. p. 13.
& consentientem *Morgagnum*
n. 28.

c *Eustachius* l. c. *Morgagn.*
l. c. *Winslow* l. c. ann. 1717.
p. 215.

inter firmiores fibras interceptis pertunditur *d*. Perpetuo vero reticulum adesse, quod clavis viris post pauciores dissectiones excidit *e*, id utique numerosissima nostra experimenta me non sinunt admittere. Sed neque facile puto valvulam desiderari, etsi ea *Duverneyi* vox exstat.

Quare, cum in fetu reticulum nondum appareat, in homine vero adulto subnascatur, cumque eodem modo integerrimæ membranæ valvularum arteriosarum cordis, ostioli venæ coronariæ, atque parietis, qui foramini ovali claudendo destinatus est, pariter in adultis hominibus, in reticuli naturam sæpe abeant, cum eadem in falce cerebri degeneratio succedat, videtur omnino a violentia aliqua, & præter naturæ finem, hæc reticulata fabrica in nostra valvula nasci, quoties sanguinis per pulmones motui potentius obstaculum opponitur, ut lucra aliqua sanguinis ex aure constricta, neque expedite se evacuante nascatur, qui in venam cavam per hanc, quam descripsimus, valvulam redire conatur.

In omnibus cæterum cadaveribus, quæ eo fine plurima incidi, valvulam *Eustachii* ita se habuisse reperi: ut non possim admittere, eam particulam ideo a quærente profectore non

d Comper l. c. f. 3. & Fig. Jac. Benign. Winslow. Huic fasciuli nostri IV. octavam. viro vox quidem reticulatæ
e *Eustachii* l. c. quantum excidit, non tamen perpetuum
 ex paucis vocibus colligitur, reticulum esse, minime igno-
Petrus Senac T. I. p. 228. ravit 1717. p. 214.
Barbault Splanchnolog. p. 227.

repertam fuisse, quod nulla adesset *f*, aut omnino in multis *g*, omnibusque denique adultis *h* hominibus desiderari. Neque adeo ex iis partibus est, quæ fetui propriæ, cum ætate evanescent: & dignus tanto viro candor fuit *Winslowi*, quando hanc sententiam, a se ipso *i* latam, ipse etiam antiquavit *h*. Maximam ex adulto homine depictam dedi *l*.

Utilitatem rectius forte alibi definiremus, liceat tamen exiguæ particulæ finem a fabrica non separare. Ergo omnino auriculæ dextræ parietem perficit, cavetque interposita, ne sanguis, quem semel auriculæ cavea recepit, in venam cavam inferiorem retroeat, quoties auricula constringitur, neve in ejus venæ sanguinem gravis incumbat. Recte clarissimi viri hæc ante me docuerunt *m*. Non crediderim *n* autem, eandem intercedere posse, ne sanguis venæ cavæ superioris contra cruorem per inferiorem venam cavam succedentem nitatur *o*. Quid in fetu præstet, alibi dicetur.

f Caspar Baubinus, cum ex *Eustachio* hanc valvulam descripsisset in *theatr. anat.* p. 227. negavit se eam reperire ibid. p. 205. tum *J. Henricus Croeser* l. c. p. 14. Nonnunquam eam defuisse alii scripserunt, ut Ill. *Winslowus* l. c. 1717. p. 216. *Henricus Albertus Nicolai* p. 53. *Eustachius & Isaacus Cattier*.

g *J. Baptista Bianchi* de *scrizione di due mostri* p. 113.

h *Flurant splachnolog.* T. II. p. 209. *Rouhault* *observ.* p. 21. *H. A. Nicolai* p. 53.

i *Mem. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1725. p. 26.

k Ibid.

l *Fascic.* IV. f. 8. *Conf. Morgagn.* l. c. n. 30.

m *Guiffart* in epistola, cujus voces repetit Ill. *Senac* T. II. p. 626. *J. Ben. Winslow* *Mem. de l'Acad. des scienc.* 1717. Ill. *Trem* l. c. p. 54.

J. Fridericus Crellius in *Progr. de valvula Eustachii.*

n Neque Ill. *Senac* T. I. p. 228.

o *Lancisius* l. c.

in eo sanguinem versus foramen ovale ducere, fibrasque musculares valvulam angustiore reddere dictum est, ut aditus ad aurem late scat.

Quare nuper ab Ill. *Lobsteinio* adnotatum est, foramen ovale etiam in adulto homine patere, quoties valvula deleta est, aut certe in reticulum resoluta; quando autem foramen ovale clausum est, valvula solet integrior superesse. Quo ipso confirmatur, eam ab impetu nitentis sanguinis rumpi.

§. XIV. *Sinus sinister.*

Sinistrum cordis atrium vulgo dicitur, quod superius, & posterius est, & pariter uti dextrum ex parte levi, & alia pectinata componitur, ut tamen hic omnino major pars levis sit, quæ vero cancellos habet, ea ejus aliqua quasi appendix dici possit.

Situs ejus est retro dextram aurem, & vasa majora, ut in corde antè spectato, unice exigua ejus particula adpareat, quæ peculiariter *auricula* dicitur, & ad sinistrum latus arteriæ pulmonalis supra cor se effert *q*, & ventriculo sinistro insidet. Nonnunquam tamen eam particulam vidi ante cor minime descendisse, sed mucrone suo conflexam, in foveam inter arteriam pulmonalem venamque sodalem se abdidisse. Mirum est, rei facilis nullam satis bonam iconem exstare: nam sinum certe sinistrum, le-

q *Ruyfch Thes. Anat.* IV. tab. 3. f. 2. F.

venire atrii partem *Lancisius* justo angustiores delineavit *r*, *Meryus* non satis quadratam *s*, *Petrus Senac* meliorem, sed a vicinis vasis remotam *t*.

Præcipua hujus atrii pars, quæ magis proprie sinus vocatur, ea interioris levis, & exterioris in universum cubo similis est, si auricula cancellata abesset. Ejus cubi facies sunt anterior, posterior, dextra quæ longior, sinistra & inferior, quæ ostium venosum. Facies posterior, vulgo notior, quadrangula *v*, lineis tamen inæqualibus circumscribitur. Linea inferior, maxima, cordi ipsi committitur parallela, & vallecule aliqua a ventriculo sinistro separata. Linea superior, brevior, arteriam pulmonis dextram attingit, eique aliqua cellulosa tela connectitur: eadem pericardium transversim sibi innatum habet, & aliquanto, quam vere est, longior videtur, quod ex ejus lateribus venæ pulmonales superiores exeant. Dextrum latus breve, respondet septo auricularum, & a vena pulmonali superiori sui lateris descendit: inter eam & dextram aurem levis sulcus est *x*. Sinistra, brevissima, inæqualis, adeo magnam partem sui emittit in edendam venam pulmonalem inferiorem sui lateris, ut mente potius quam oculo in rectam continuamque lineam perficiatur.

r i. c. tab. 2. f. 1. B.

s l. c. fig. 3. B. C. C. C.

C.

t T. II, A.

v *Senac* ibid.

x ibid. G. G. G. & in T.

9. & p. 207. *Ruyfch* l. c. inter F. & M. M.

Ex ejus lineæ parte inferiori cæca *appendix* exit, quæ peculiariter *auricula* dicitur, quoties a sinu distinguitur, sive a parte totius atrii levi. Hæc particula cancellata & pectinata, alternis fulcis crenatum marginem habet, totaque rubet, appendici dextræ auriculæ similis. Figura in universum ei triangula est, cujus latera in acutum mucronem coeunt: sed id triangulum alternis undis flexuosum, bis incurvatur y. Mucro antrorsum erigitur, & paulum deorsum. Vidi, qui alioquin brevior, & nonnunquam satis obtusus sit, aliquando in cylindrum perangustam, sed uncia longitudine, eductum fuisse. Ita nuper vidit F. A. *Weber* y*.

§. XV. *Venæ Pulmonales.*

Uti venæ cavæ ad dextrum sinum spectant, suumque sanguinem convehunt, ita quatuor venæ pulmonales in sinum sinistrum se aperiunt. Quatuor inquam, is enim numerus pene perpetuus est, dudumque a magnis viris & constitutus, ut mirari liceat, vulgari sermone venam pulmonalem dici, quasi aliquis communis earum venarum truncus esset, quæ a pulmone redeunt, præter ipsum sinistram si-

y Bonæ icones sunt, quas *Ruysebius* dedit, *Epist. Anat.* X. tab. XI. f. 1. 2. *Thes. Anat.* IV. tab. 3. f. 2.

y* *Obs. anat.* 4.

z *Eustachius* tab. 15. f. 5. tab. 27. f. 13. *F. Ruysebi* *Thes.*

Anat. IV. tab. 3. f. 1. *Guil. Comper* in *Philosoph. Transact.* n. 270. cum duab. icon. *Joh. Mery* l. c. c. c. c. c. *J. Jacobus Rau* apud *M. B. Valentini* l. c. p. 89.

num. Id fieri non negaverim, ut duæ venæ unius lateris in unum *a* brevissimum truncum prius confluant, quam ad sinum perveniant: uti vicissim aliquando quinque *b* diversi trunci sunt, quos sinus sinister recipit. Utrumque vidi.

Cæterum hæ venæ omnes in partem superiorem quadranguli sinus se aperiunt, non superiores solæ, sed etiam inferiores quæ majores sunt; infra eas sinus sinister absque vasis continuatur. Aliquantum inæqualiter ponuntur, ut duo trunci superiores, ab arteriis pulmonalibus occultati, una aliquanto sinisteriores sint: duæ inferiores venæ paulo magis dextræ: earumque, quæ dextra est, aliquanto elatior sit *c*.

§. XVI. *Fabrica Auriculæ sinistræ.*

Fabrica sinus sinistri, sive partis quadrangulæ & levis, constat duplici membrana tenera & levi, quarum exterior cum pericardio, per venas pulmonales adveniente, interior cum interiori cordis sinistri, venarumque, quas dixi, membrana continuatur. Inter eas membranas fibræ carneæ mediæ interponuntur, multorum stratorum, & adeo intricatæ, ut vix possint perfecte exponi. In universum tamen

a Cl. Læfseke in *Observ. lin* 1750. p. 167. T. II. *Dextra vena pulmonalis media Anat. Med.*

b Ill. Meckel in *Memoir. supra solitum morem aderat, de l'Acad. des scienc. de Ber-*

c Conf. Senac T. 9.

exteriores, sive superficiei propiores, fibræ transversæ sunt *d*, aut transversarum similes; interiorum *e* vero, sive propiorum cavæ sui sinus, aliæ adscendunt oblique, aliæ descendunt, & nonnullæ venarum pulmonalium originem circumdant *f*. Fortiores potius, quam in dextra aure sunt, & dudum *Vesalius* sinistram auriculam duriorē vocavit *g*.

In appendice, quæ peculiariter auricula vocatur, etiam musculosi semicirculi sunt, quorum alii longiores eminentes denticulos faciunt, breviores alii intermediis fulcis respondent. Hi musculi oriuntur ex ora ostii venosi sinistri, tum in plana cordis facie, tum superius, versus aortam. Ex iis oris breves lacerti in auriculam abeunt, quam describimus. Hi semicirculi auriculam arctant. Alius musculus major, ex simili origine in extremum apicem auriculæ porrigitur, eamque decurtat.

Aliam descriptionem vide apud *Portaliū* *g**. Cæterum interior cavea sinus sinistri, tota levis est, præter ostiola aliqua venosa, quæ cum venis dicuntur, & reticulatam sedem, aut certe scrobiculis & eminentibus trabeculis variam, quæ super vestigium foraminis ovalis est *h*, denique anuli ovalis foramen ovale ambeuntis

d Senac T. 9. f. 1. Tab. f. 1. ad C. tab. 10. f. 1. 10. f. 1. h. f. 2. B. & p. ad A.

208. *Comper myot. nov.* Tab. g l. c. p. 740.

36. f. 2.

g* l. c.

e Senac Tab. 9. f. 2. 3. & p. 208.

h Fascic. icon. anat. 4. Tab. 1. fig. 2.

f Idem p. 210. & tab. 9.

partem inferiorem, transitui suppositam; & musculum in fossam ovalem descendentem.

§. XVII. *Dextra auris capacior est.*

Denique totum atrium sinistrum, sive tota cavea, hinc a pulmonalibus venis terminata, inde ab ostio venoso sinistro, angustior est sive minus aquæ alteriusve humoris capit, quam dextri atrii cavea, uti olim *Vesalius* monuit *i*, inde & alii anatomici *k*. Rationem exquisitis numeris exprimere non facile est, cum vix accurate aurem replere & humoris, quem continet, pondus inire possis, quin aliquid de venarum pulmonalium, cavarumque ostio, aut de venoso cordis aditu se inmiscet. Reperi tamen quadraginta & duas drachmas in dextro atrio, cum in sinistro non supra triginta cum dimidia essent, & satis similem rationem proposuit *J. Dominicus Santorini l*, quam brevissimis numeris 5 & 7 exponas. Majorem rationem invenit *Ill. Mekelius*, quæ sit 16 ad 7. Aliquanto minus discrimen *Helvetius m* reperit, ut 24 drachmas dextrum atrium, & 21 sinistrum caperet, quam rationem exprimunt numeri 7 & 8. Addit *Cl. Rouhault*, eam rationem in tenero quidem fetu majorem, in adulto homine

i Dimidio minorem facit p. demie. p. m. 34.
740.

l l. c. p. 144.

k *Lower* c. 1. p. 14. *Steph.* *m* *Memoir. de l'Acad. Roy.*
Blancaard *Cartesiaansche aca-* *des scienc.* 1718. p. 283.

vero aliam esse, & numeris 4 & 5 exprimi
n. Causam hujus discriminis in historia respi-
 rationis dabimus, a qua pendet. In castore le-
 go *o*, apud Parisinos academicos, dextrum a-
 trium cordis potius sinistro minus esse. Ve-
 rum eam auriculæ dextræ angustiam magnus
 faccus venæ cavæ, sive receptaculum veno-
 sum subplet. In fetu auriculæ ventriculis ca-
 paciores sunt. Contra in adultis hominibus
*o**. Sic in lacerto apode auricula ventriculum
 magnitudine superat *o***.

S E C T I O III.

C O R D I S I P S I U S F A B R I C A.

§. I. *Cordis Membrana. Cellulosa Tela subjecta.*

PERGIMUS ad cor magis proprie dictum, si-
 ve ad ventriculos. Figuram, situmque non
 repetimus. Membrana, qua exterior ejus su-
 perficies tegitur, continuatur cum extima mem-
 brana aortæ, venarum cavarum, pulmonalium,
 arteriæ pulmonis, perque eas membranas cum
 pericardio, quo tamen multo tenerior est &

n Réponse à la critique de
 M. Winslow p. 4.
o Memoir. de l'Acad. Roy. trop. T. XIX.
 des scienc. 1704. p. 52.

*o** Portal l. c. p. 435.

*o*** Nov. Comm. Acad. Pe-

tenuior. Duas ejusmodi externas cordis membranas esse *p*, pluresve *q*, per artificia singularia prosectorum explicatur.

Sub eo extimo cordis velamento cellulosa tela est, in qua passim verus adeps *r* reponitur, nihil *s* ab aliarum partium humani corporis pinguitudine diversus. In similes omnino aliorum membranorum cavernulis cellulas deponitur, quas de inflatis arteriis exeuns aer pulchre distendit, & aqua *t*, & argentum vivum, aut ipsum demum tenerius sebum in *Ruyschii v* & *Kaauwii x* experimentis replet, quando pene nebulæ simile exhalavit, aut humor denique de sanguine *y* sudans. Non ideo per totum cor æquabili copia adeps distribuitur, sed vasa coronaria sequitur, ut alibi solet, perinde vero copiosior, uti eorum vasorum trunci majores sunt. Hinc crassissima stria adipis valleculam *z* replet, quæ universum cor ambit, & a dextra, sinistraque auricula separat, qua eadem magni trunci venarum, & arteriarum coronariarum continentur. Deinde, qua eorum vasorum majores fasciculi descendunt, per septi nempe ventriculorum sedem,

p *Jos. Lieutaud essays anatomiques* p. 232.

q Tres in cordibus congelatis separavit *P. Senac* l. c. p. 187.

r *Columbus de re anatom.* p. 176.

s Duriorem fecerat *Jasolinus* in proprio libello.

t *Vioussens* l. c. p. 33.

v *Epist. Probl. XVI. Thes. IV. u. 96. Thes. VI. sub. fin. Advers. anat. I. n. 6.*

x *Kaauw* n. 687. 689.

y *Ruysch Thes. IV. n. 96.*

z *Verheyen Anat. Tab. 21. f. 1. 2. Lancisius* p. 54. In summo corde pinguedo *Plinius* L. XI. p. 626. edit. *Harduini*.

tam in plana *a*, quam in convexa *b* facie, iterum linea adiposa venam mediam cordis venæque maximæ majores ramos comitatur. Originem etiam aortæ, & pulmonalis arteriæ plurimus adeps ambit; neque in dextra aure, sinistroque sinu, in obesitas *c* nullus est. Minores ramos, minores pariter & macilentiores pinguitudinis striæ sequuntur. Etiam istius adipis in parte perpetuo motu exercita, nonnunquam nimia copia colligitur *d*. Idem per inflammationem & suppurationem consumitur, ut in vulnere cordis *d**.

Minime enim rarum est, cor etiam in epidemicis malis inflammari & abscessibus extus erodi, quorum pus in pericardium effluit. Per alios morbos vix evanescit, & in phthisicis reperitur, quando non alibi pinguedo superest. Est etiam ubi præter morem auctus cor compressit, & in minorem molem redegit. Sed etiam osseam, & demum arenosam & lapideam materiem in has cellulas deponi mirum videri potest, rarum tamen non est. Ipse in juvene, post maxima pulsus vitia, albostophos passim ex cordis superficie effloruisse, & cum corde pericardium revinxisse vidi *e*. Plura exempla, ne sermo turbetur *f*, ad pedem paginæ recensui, quæ

a Fascic. IV. T. I. f. 8.

b Senac l. c. p. 187.

c Vieussens l. c. p. 23. 24.

d Lancisius p. 55. Breslauer Samlungen 1719. p. 361. 362.

*d** Richard p. 599.

e Opuscul Patholog. obs. 52.

f Ossium in corde exempla. In Maximiliano II. asthmatico ossea natura prope valvulas cordis cum hydropis pectoris A.

Thannmüller apud Welsch Cent.

IV. Cas. 35. In sinistro ven-

triculo cordis Urbani VIII.

Pontificis maximi, os literæ

T. figura Bartholinus hist.

45. Centur. II. In cor-

de multa ossa, sed minuta re-

perta, aliud vero permagnum,

quatuor uncias cum dimidia

longum, & unam latum,

ven-

numerossimis aliis augere possem; cartilagineæ, osseæ, lapideæ materiei, inter fibras & in superficie cordis effusæ.

ventriculi totius longitudine *Journal de Trevoux* 1728. Jun. Cor in octogenario late osseum factum, ut in superficie cordis reticulata ossa pene duarum unciarum pondere essent *Jul. Ofrai obs. de med. prat.* CXI. Osseus circulus ad mucronem cordis obsepiens fundum ventriculi sinistri, cum pericardio adhærente, in hydropico *Janus Plancus de monstris.* Os inter ventriculos cordis & pericardium adhærens *Chefelden Phil. Trans.* n. 337. Reperiuntur corda, quorum pars ossea est *Senac T. I.* p. 362. In Marefchalli Schombergii cadavere cordis ventriculus sinister osseus *Thuanus.* Os in ipso corde *Hist. de l'Acad. des sciences* 1726. Duo ossa follicite descripta, tum alia quasi testacea & cartilaginea in intimis cordis & in aorta pariter squamæ osseæ *Cruvel cord. vas. osteogen.* In corde hydropici os amplissimum coronæ forma *Journ. des savans* 1679. n. 21. Officulum hyoides ex corde quadragenarii *Pauli apud Bartholinum anat.* p. 394. Post palpitaciones ossea materies auriculam dextram intus obduxit *Memoir. avant.* 1699. T. II. p. 338. Anseris cor totum osse factum *le Meilleur Journ. de med.* 1770. Mars.

Lapides in corde. Post palpitaciones cordis tres calculi in ventriculo dextro *Zacutus in Prax. Medic. mirabili* L. I. *obs.* 141. In corde

juvenis lapis granorum quatuordecim pondere *Kerkring spicileg. obs.* 78. Lapis adnatus ramis coronariis majoribus, quæ dextrum ventriculum a sinistro dirimunt *Belinus de urinis & pulsibus* p. 609. Calculi in carne cordis, sub valvulis venæ pulmonalis, cum mira ejus visceris amplitudine *Kulmus in histor. monstr.* p. 43. Calculi in corde reperti, quorum alter duas uncias longus erat, unam latus *Boerhaave de calculo* p. 6. In hydropico calculi supra valvulas mitrales. & circa basin, etiam in sinum venosum eminentes *Corn. de Velse de ingress. intestin. obs.* 11. Infanti dimidium cor petrefactum *Senac T. II.* p. 430. Calculus biuncialis in corde, figura id viscus referens, ventriculos replens *Senac l. c.* p. 429. Calculus in corde durus carni adnatus *Blas L. VI.* *obs.* 13. Calculi duo inter utrumque ventriculum *Phil. Trans.* n. 5. In ventriculo cordis sinistro concrementum lapideum conglomeratum *Meibom de vasis palp.* Lapis inhærens ad foramen ovale & mortem subitam faciens *Maurocordat de pulm.* p. 88. 89. Calculus in corde humano inque ora venosa, qua valvulæ adhærent, cylindricus, inæqualis, arenosus, carne cordis cinctus, fibrisque sinistri ventriculi *III. Meckel Mem. de l'Acad. de Berlin T. XU.* p. 52.

§. II. *Ventriculus dexter, sive anterior.*

Ipsū cor in variis hominibus mole diversum, a claro viro ad decem unciarum pondus æstimatum *g*, ab alio ad 13. nonnunquam etiam 24. & 28. unciarum pondus attingit, & in *Gustavo Adolpho* unciarum 26. Idem media linea dividitur, tum in plano inferiori, tum in facie convexa, quæ septo intus latenti respondet. Ante eam lineam *Ventriculus dexter* est, quem melius certe *anteriorem* *Jac. Benignus Winslow* appellat *h*.

Figura ei, quæ parti quartæ coni est, ut alia pars ventriculi plana, & coni per apicem bisecti anterior medietas sit, atque septo transverso incumbat; pars alia magis convexa, cumque priori in margine acuto cordis conjuncta, superiori loco & una anteriori ponatur, & ventriculi sinistri declivi superficiei continuetur, sitque in facie cordis convexa anterior & humilior.

In universum altero ventriculo, posteriori, & superiori, latior est, sed aliquanto brevior *i*: ut tamen in fetu, & sæpe in infante, aliquando etiam in juniore homine, æque longus sit *k*, & denique longior, ut certe in puero vidi *l*.

g Tabor Exerc. Med. p. 95. Morgagnus Epist. Anat. XV.

h Exposit. anat. l. c. n. 42. n. 2.

i Senac T. l. p. 192. R. *k* Harvei. l. c. p. 153.

Vieußens de remot. & pro-

xim. princip. p. 184. J. B.

Morgagni l. c. n. 60.

l Et olim Vesalius L. VI. C. XI.

Ad mucronem omnino pertingit, uti ostendimus.

In fetu uterque ventriculus æquali est crassitie. In adulto homine multo, quam posterior ventriculus, & facilius dilatatur & debilius est, & fere triplo; ita tamen, ut prope basin parum ei cedat fibrarum numero & carnis crassitie, inde vero versus apicem diameter carnis magis diminuatur, quam in sinistro ventriculo fit. Soleo ad mediam fere sedem venæ mediæ, in facie plana, adeo tenuem particulam reperire, ut pene nihil præter adipem, inter externam membranam & caveam cordis interponatur. Quare eo fere loco cor dissilire solet, quando cera repletum crepat. Et ea etiam in sede, in augustissimo olim principe dissiluit. Cæterum pariter musculosus, neque minus irritabilis est dexter ventriculus, quam quidem posterior. Serius vero nascitur, & manifesto sinistro ventriculo, jam in mucronem producto, rotundi & brevis tuberculi modo adhæret, in pullo, qui ovo incubato continetur.

Interius, ut ipsum nomen significat, cavus est, neque enim mirificas aliquas historias moramur, in quibus cor caveis destitutum fuisse legimur: neque *Rolfinkii* testimonium, qui dextrum ventriculum desideratum fuisse scripsit *m*, cum ejus lateris auris solito amplior esset, aut *Riolani n*, qui cor absque ventriculis, vasa ta-

tamen amplissima fuisse, sibi excidere passus est.

Ea cavea in universum quidem ejusdem figuræ est quæ ventriculi, & pariter conice a basi ad mucronem decrescit, sectionem tamen lunatam habet, qualem pleræque icones exprimunt o.

§. III. *Amplior sinistro.*

Omnino in adulto homine hæc anterior cordis cavea posteriori amplior est. Primæ fere antiquitati id notum fuit, cum auctor *Hippocratici* libri, qui ex *Erasistrati* discipulis fuisse videtur p, omnino ventriculum dextrum majorem esse scripserit, etsi ad mucronem non pertingat. Plurimi scriptores eandem sententiam repetierunt q, fuitque inter eos olim noster avunculus *Georgius Wolfgang Wedel* r, qui dimidio ampliorem fecit.

Primus inter recentiores medicos *Lowerus* s parem utrique ventriculo capacitatem reddidit. Eum, ut in plerisque, plurimi ab eo tempore secuti sunt, & rationem addidit sententiæ *Bartholomæus de Moor* t, tantum nempe latitudini ventriculi anterioris accedere, quantum de-

o *Vesalii* L. IV. f. XI. *Bartholini* Anat. p. 397. *Amati* *Bourdon* T. IV. f. 18.

p *De corde.*

q *Johannes Riolanus* l. c. p. 567. *Honoratus Fabri* de homine p. 122. *Isbrand v. Dic-*

merbroeck Anat. p. 279. *Stethanus* *Blancaard* *Cartes.* Acad. p. 34. *Vieussens* du cœur p. III.

r *Physiolog. reform.* p. 107.

s l. c. p. 34. 35.

t *De instaurat. medic.* p. 67.

fit longitudini. Neque Vir Cl. inter nuperri-
mos scriptores absque adseclis est v. Non de-
fuerunt tamen inter physiologos, qui experi-
mentis veterum opinioni subvenirent. Et pri-
mus *Johannes Claudius Adrianus Helvetius* æ
utriusque ventriculi mensuras per pondera in-
fusæ aquæ definivit: in priori exemplo fini-
ster thalamus quindecim aquæ drachmas cum
dimidia, dexter vero sedecim cum semisse recepit,
quæ ratio est 31. ad 33. In altero sinister
viginti drachmas, dexter viginti & quatuor ad-
misit, quæ ratio est 5. ad 6.

Henricus Albertus Nicolai y eandem ratio-
nem ad numeros drachmarum 18. & 20. redu-
xit: Cl. *Lieberkühnius* z valde simplicem ratio-
nem reperit, 10 $\frac{3}{4}$. ad 7 $\frac{1}{2}$. quæ est 2. ad 3. Cl.
Browne Langrish a in bove dextrum ventricu-
lum unciarum cubicarum 5. cum semisse capa-
citatem habere scripsit, sinistrum paulo minus
quam unciarum quinque, quæ ratio est 10. ad
11. Ego denique in fetu quidem discrimen
non magnum reperi: in adulto vero homine
valde insigne, ut omnino aliquando viginti
quatuor drachmas dexter thalamus reciperet,
sinister parum super octo: quæ ita repeto, ut

v Æquales nempe ventri- æquales facit. Æquales Saba-
culos facit *Hermannus Boer-* tier II. p. 159.
haave Prælect. ad n. 185. G. x In *Memoir de l'Acad.*
Wood l. c. *Joh. Tabor* p. Roy. 1718.
103. 105. qui utrique ventri- y l. c. n. 51.
culo tres uncias contineri z Apud G. *Ehrh. Hamber-*
ponit Cl. *Lillie de cord. pal-* ger in *physiolog.* p. 708.
pitatione p. 2. Idem & aures a *Croonian lecture* p. 63.

memor sim, rem summe difficilem esse, exquisitive utrumvis ventriculum replere, ut nihil alieni ponderi accedat, nihilque desit. In senibus magnum discrimen esse *Portalius a**, ut in ventriculo dextro septem, in sinistro quinque unciae liquoris contineantur. Huic ipsi senio eam enormem cordis latitudinem tribuus. Etiam in equo sinister ventriculus angustior est *b*.

Iterum *J. Dominicus Santorinus c* *Loweri* sententiam sua auctoritate tuetur, & *Petrus Antonius Michelottus* minorem, quæ in cadavere adparuit, ventriculi sinistri capacitatem a robore majori sinistrae auriculæ compensari persuadetur, quæ in vivo homine sui lateris ventriculum fortius dilatet. Deinde *Josephus Lieutaud d* in experimentis suis utrumque ventriculum æque capacem invenit; aliique nuperi, mira *e* distinctione usi, utique ventriculum dextrum ampliorem videri, neque tamen vere ampliorem esse, dilatabilem vero magis & a sanguine de vena pulmonali redeunte fortius, distentum latiore videri. Poterant meminisse *Cl. viri*, in vivo homine, de quo negant, eam ipsam causam ventriculum dextrum perinde latiore reddere.

His tamen omnibus comparatis, omnino in

*a** *Portal l. c. p. 495.*

b *Bourgelat hippiatricque T. V. p. 15. 16. & in disp. II. P. z. p. 407.*

c *l. c. p. 144.*

d *Essays anatomiques p. 230.*

e *J. Nic. Weiss Progr. Anat. de dextro cordis ventriculo post mortem ampliore. Nempe in vivo homine negat differre.*

S. III. VENTRICULUS DEXTER AMPLIOR. 135

sententiam antiquissimam transeo cum Ill. viris *Jacobo Benigno Winslow f*, & *Senaco g*, & dextrum ventriculum in adulto homine majorem esse confirmo, cum & pleraque experimenta eo tendant, & auris dextra major quam sinistra sit, & demum arteria pulmonalis sodalem venam diametro & numero ramorum superet, ut omnino omnia receptacula dextri lateris analogis sinistri lateris caveis ampliora sint, quibus respondent. Causam, quare natura dextra cava capaciora fecerit, alibi repetam. Hic interim moneo, ventriculum dextrum ferioris temporis partem videri, ut aliquamdiu cor embryonis unico ventriculo constet, qui nempe aortam educit arteriam: deinde ad tuberculi similitudinem de unico sinistro ventriculo dexter incipit emergere, & aliquamdiu, ad quintum mensem, minor est quam sinister, minor etiam in phoca, cujus foramen ovale apertum, & fabrica eadem est quæ fetui. In maturo infante eadem utriusque ventriculi est capacitas. Deinde paulatim vincit dexter, & eo majori fere ratione, quo ætas est provector. Casu utique hæc ratio turbari potest. Cum aorta arteria ossea esset, & ventriculus sinister malignius se inaniret, idem dextro amplior fuit *g*^{*}.

§. IV. *Membrana interna. Reticulum musculosum.*

Eæ, de quarum mensuris nunc diximus,

f l. c. n. 53.

g l. c. p. 191. 346. 347.

g^{*} Apud *Mekelium*.

cordis cavæ five ventriculi tenera membrana intus vestiuntur, quæ cum intimo velamento venarum cavarum dextræque auris continuatur, & ad aliquam ab exitu arteriæ pulmonæ (aut aortæ) distantiam melius adparet, quod ibi ventriculus levis sit *k*, in reticulata vero parte ægrius ostenditur, & ibi tamen conspicua *i*. Inter hanc membranam, & carneas cordis fibras, cellulosa tela brevissima intercedit *k*.

Sed longe major pars cordis & in homine, & in quadrupedibus, & in avibus demum, intus tota aspera est, & musculosis, teretibus lacertis variæ longitudinis & crassitie implicatur; eos lacertos irretitos intervalla, variæ pariter magnitudinis, separant: crassiores vero in dextro ventriculo tori sunt, in sinistro minores & numerosiores *l*, ut ea semper, quam dixi, levis sedes excipiat. In utroque ventriculo icones dederunt Cl. viri, quos cito *m*. Alicubi oppositas sedes cordis trabes transversæ conjungunt *n*. In velocibus animalibus plurimos in corde lacertos esse lego *o*: in avibus scriptores dissentiunt. Nam in struthiocamelo cor intus totum leve esse gravis auctor est *Valisnerius p*,

h Fantonus l. c. p. 308. mot. & proxim. princip. tab. Vieussens du cœur tab. 12. 6. du cœur tab. 11. 12. Senac &c.

i Vieussens p. 101.

k Senac p. 188.

l Vieussens l. c. p. 111.

Fanton p. 290.

m Comper myot. nov. tab.

38. f. 1. tab. 39. f. 1. tab.

40. f. 2. R. Vieussens de re-

n Comper tab. 39. f. 1. & tab. 40. f. 2. Bidloo T. 22. f. 7.

o In cervo & lepore Valisneri oper. omn. T. I. p.

248.

p l. c.

Contra dextrum ventriculum levem esse, finistrum lacertos habere, alii de universis avibus *q*, alii de majoribus volucris *r*, alii de peculiari aliqua specie adfirmant *s*. Sed ego quidem in iis, quas equidem non plurimas dissecui, avibus in utroque ventriculo lacertos reperi, & nuper in corvo.

Inter eos lacertos insigniores sunt, qui ad valvulas venosas pertinent, olim J. Berengario Carpenfi *t* & Vesalio *v* minime indicti. Sed cordis fabricam intelligere difficile fuerit, nisi anulum membranaceum ostii venosi dextri descripserimus.

§. V. Ostium venosum. Tendo Cordis venosus.

In eam oram, qua auricula dextra cum corde committitur, firma, pene callosa, subcærulea cellulosa stria nudam auris membranam cum nuda membrana ventriculi conjungit, eodem loco tendinem Lowerus *x*, æque ac alii clari viri *y* descripserunt, qui ostium venosum dextrum ambeat, & a quo satis celebres physiologi musculofas fibras cordis deduxerunt.

q Lower p. 61. Morgagn. Epist. Anat. XV. n. 60. Fan-
ton p. 290.

r Harvei p. 156.

s Ut de falcone Muraltus
vademec. anat. p. 340.

t In Mundinum p. CCCXLVIII.
Vocat musculofas, quibus val-
vularum tendines illigantur.

v Carnei cordis processus p.
734.

x l. c. p. 15. 16.

y Raym. Vieussens de remot.
& proxim. princip. p. 82.
Josephus Lieutaud l. c. p.
229. Petrus Senac tr. du cœur
tab. 14. h. h. h. tab. 15. c.
c. tab. 13. d. d. d. tab. 12.
13.

Carneas eodem loco fibras sphincteris similes *Lancisius* posuit *x*, & tendines fibris carneis ex ventriculo & aure committis componi scripsit *a*. Eum sphincterem *Waltherus b* in systole cordis ostium auriculæ constringere docuit. Denique Ill. *Senacus* veram tendineam substantiam, certe in senum cadaveribus *c*, reperiri confirmavit. Contra cautissimus anatomicus, *J. Baptista Morgagnus d*, etiam in juvenco ægre tendineam fabricam admisit: omnino vero rejecit, qui plurimum in secando se exercuit, *J. Fridericus Cassebohm e*. Ego vero lineam reperi, nullum vestigium muscoli, tendinisve hic reperi.

Circulum quem dixi, callosum, adeps, cum externa cordis membrana obducit. Continet idem ostium venosum dextrum, ad perpendiculum ita positum, ut major axis id perpendiculum sequatur, minor transversus sit. Ita, in cadavere se habet, in vivo autem homine, maxime quando a sanguine cor subeunte distenditur, non dubium est, quin circulare sit.

§. VI. *Anulus valvulosus.*

Ex eo nunc ostio venoso, qua parte cum aure committitur, membrana interna auriculæ

x l. c. p. 48. §1. &c.

a ibid. p. §1.

b l. c. p. VIII.

c l. c. p. 211.

d *Advers.* V. p. 21.

e Ei enim profectori accepta refero, quæ habet *Car. Phil. Glass.* l. c. p. 27.

dextræ, undique in caveam ventriculi anterioris versus cordis mucronem producitur. Non ideo ea membrana simplex est, cum ipsi lamina de membrana interna dextri ventriculi nata, undique similis & parallela, per cellulofam telam adglutinetur, ut omnino duæ hic laminæ sint, quas aër inflatus separare potest. Hæ duæ laminæ ex toto ostii venosi ambitu ita producuntur, ut anulus undique continuus, ex ea sede sinistrorsum prodeat, qualem anulum rudis olim, non tamen inutilis, figura *Jacobi Berengarii f*, deinde ornatiores aliæ, *Eustachii g*, *Cowperi h*, *Vieussenii i* & *Petri Senac h* recte exprimunt. Unicam etiam membranam esse, quæ in ostium venosum producatur, dudum *Carolus Stephanus l* & diserte *Vesalius* monuit *m*, ejusque sequaces *n*, tum *Raymundus Vieussens o*: ego vero, ut voces minus proprias nuperrimi profectores mutarent, & ipse monui *p*, & paulo post *Josephus Lieutaud q*, qui circularis valvulæ nomen ad na-

-
- | | |
|---|---|
| <i>f</i> In <i>Isagoge Anatomica</i> . | guram <i>Guilielmi Stukeley</i> l. c. |
| <i>g</i> Tab. 16. f. 3. | <i>l</i> <i>Anat.</i> p. 366. |
| <i>h</i> <i>Myotom nov. tab.</i> 38. f. | <i>m</i> L. VI. c. 13. p. 737. |
| 1. 2. tab. 39. f. 1. 2. quæ nitidissimæ sunt. | 738. |
| <i>i</i> <i>De remot & proxim. princip.</i> Tab. 6. & <i>du cœur</i> tab. | <i>n</i> <i>J. Valverdu</i> L. IV. c. |
| 10. f. 1. 2. | 9. p. 231. |
| <i>k</i> Tab. 14. & nitidius Tab. | <i>o</i> l. c. p. 98. 102. |
| 12. A. A. & Tab. 11. Adde nunc icones <i>Vidi Vidii</i> tab. | <i>p</i> In disput. de motu sanguinis per cor anno 1737. edita. |
| 75. f. 11. & in elephanto fig. | <i>q</i> l. c. p. 233. <i>physiologie</i> p. 68. |

turam finxit, & *Petrus Senac r*, tum *Eustachii* nuperus interpret *s*.

Sed ejus anuli finis, qui in ventriculi caveam fluitat, non undique origini parallelus, neque circularis ora est, qua terminatur. Latior *t* nonnullis locis, alibi angustior *v* anulus est, atque ita aliqua trium distinctarum valvularum remota similitudo nascitur; remota inquam, cum tres eæ, quas distinguere possis, longiores anuli membranacei productiones, & inæquali longitudine sint, & latitudine diversa, & incerto numero, & denique, si omnino aliquam figuram definire placet, trapezium potius referant, cujus latus maximum anuli ab ostio venoso origo efficit, latus parallelum margo fluitans & mucroni cordi propior, latera convergentia eædem lineæ constituunt, quibus eæ productiones sibi mutuo obvertuntur.

Ex levi tamen similitudine trium sibi similibus & æqualium particularum dudum factum est, ut & tres valvulas anatomici numeraverint, & a mucronibus *tricuspidēs* sive *triglochini* *x* vocaverint. Eas enim diligenter *Erasistratus*, obiter vero *Herophilus* descripsit, *Galeno* auctore *y*, neque earum tendineæ fibræ

r l. c. p. 210. Addit vir *stach.* p. 145.
 Ill. jam anno 1728. similia *t* Vide in *Cowperi* Tab. 28.
 se docuisse. Verum earum f. 2. ad *e*.
 scholarum nulla innotuit, & *v* Ibid. ad *a. c.*
 in editione anni 1735. libri, *x* *Glochines* anguli: *tetra-*
 qui *Essays de Physique* audit, *glochis* quadrangularis *Suidas*
 tres adhuc valvulæ numerantur p. 453. *T. I. p. 486. Edit Kusteri.*
y De *Hippocrat. & Platonis* placitis L. I.
s *Georgius Martine* in *Eu-*

Aristoteli ignotæ fuerunt, cui hæctenus imposuerunt, ut nervos a corde oriri & non aliam ob causam *a* sibi persuaserit. Quare, cum eædem valvulæ in libro *de corde* descriptæ existent, qui inter *Hippocraticos* legitur, manifestum est, ejus libelli auctorem ex *Erasistrati* sequacibus fuisse. Si enim vere *Hippocratis* esset, nunquam certe *Galenus* admisisset, ut ob has valvulas, de quibus nunc sermo est, *Erasistratum* potius, quam *Hippocratem* laudaret.

Qui liberi a me vocantur, producti fines anuli venosi, non ideo non propriis vinculis ad cordis carnes nectuntur. Ex cordis enim sede, quæ mucroni propior est, surgunt musculi veri, cylindrici, aut certe in cylindros contracti, neque a papillæ *b* muliebris figura alieni, neque nomine indigni *papillarum*, quo passim appellantur. Eorum moles inæqualis est; & simplices alii sunt, bifidi alii, & trifidi, & ramosi, & nonnunquam trabe una alterave in cordis carnem inmissa confirmantur.

Eorum musculorum obtusus, & ostio venoso propior, apex emittit filamenta tenacissima, alba, cum tendineo splendore, ramosa, decussata *c*, quæ confertim ex summo quoque musculo exeunt, inde ad flabelli modum divergunt, & ultimis finibus suis se in faciem externam, cordis ambitum respicientem, anuli

z *Histor. anim.* L. I. c. 17. in lat. fin.

a *Galenus* *ibid.*

c *Ibid.* f. 1. 2. 3. & tab.

b *Comper* tab. 39. f. 1. 2. 38. f. 2.

venosi inmittunt, ut primi breviores, & magis conspicui, in oram ultimam se inferant. Alii in convexitatem prope eam oram, alii sensim longiores in partem anuli magis & magis latiore, ostioque auriculæ propiorem *d* ejusque faciem, quæ versus parietes cordis obvertitur, triangularibus & dilatatis finibus innascuntur. Quælibet enim fibra tendinea ab ea sede, qua primum anulum valvulosum adtingit, dilatata & palmata *e* se in eum anulum infigit, minime ab eo separabilis. Addit Vir Ill. *f* incedere inter utramque membranam, quæ in valvulam componuntur. Verum ab iis membranis vix credo distingui posse. Ex uno musculo fibræ a decem, ad triginta usque prodeunt.

Cæterum in anulo valvuloso, ejusque productis finibus, minime quidem musculosas fibras reperi *g*, sed utique minime rarum est, inter has tendinearum fibrarum adhæsiones rubra, carnis similia, & callosa corpuscula subrotunda intercedere, quæ cartilaginis naturam habere, roboris causa valvulis adpendi, *Thomas Bartholinus h* auctor est. In fetu ejusmodi carunculas non vidi, ut pro aliquo tritus effectum habeam, quem spurii illis ossibus se-

d Ibid. tab. 39. f. 2. *Senac*
tab. 11. b. b. *Winslow* in
Memoir. de l'Acad. des scienc.
1711. tab. 5.

e *Comper* tab. 38. f. 2. tab.
39. f. 2. *Senac* l. 1. c.

f *Senac* T. II. p. 638.

g Habet *Idem* Vir. Cel. T.
I. p. 213.

h *Hist. Anat.* 53. *Centuræ*

I. *Anat. renov.* p. 406.

famoideis compares, quibus vetulorum animalium tendines non raro instruntur. Totas etiam valvulas callofas fuisse, non valde rarum est *i*.

Verum & aliud vitium vulgare satis reperies. Materies nempe arenosa, ex glebulis congesta, inter duas membranas anuli valvulosi, aut productorum etiam finium effunditur. Id sæpe vidi, ut hæ valvulæ totæ crassæ rigerent, neque a suis musculis regi, aut a sanguine corde expresso inpelli possent. Duræ, per fila ossea unitæ, parietibus cordis adplicatæ Ill. *Senaco k* visæ sunt: & ad alia exempla remitto *l*.

§. VII. *Valvula sigillatim.*

Multum laboris inpendi, ut definirem, quot sint veriores producti fines hujus valvulæ, quæque sede circumscribatur, & quam universi circuli portionem quisque occupet. Ecce quæ ex numerosis experimentis collegisse datum est.

Præcipua *Valvula*, sive *productio anuli venosi* constanter satis *anterior m* est & *superior*, & ab arteriæ pulmonalis ostio ad marginem cordis acutum descendit, & eadem pene dimidiam partem anuli valvulosi sola efficit, longiusque versus mucronem producit. Eam Ill.

i Themel obererzgeb. Samtæ in apoplectico Nebel de
lung. T. II. p. 76. coagulo bilis p. 5. &c.

k T. II. p. 433. *m* Prima in diff. de motu

l Granulis tophaceis obduc- sang. per cor, n. 3.

Senac n expreffit, & alter vir Ill. *Chriftophorus Jacobus Trew* o. Eadem aditum in arteriam pulmonalem quantum quidem poteft protegit, quæ arteria finifterior fuperior & pofterior ex anteriori ventriculo procedit; totum vero oftium claudere nequit, cujus amplitudini non refpondeat. Hinc factum eft, ut nuperrime *Joſephus Lieutaud* o* hanc valvulam dixerit *cloifon valvulaire*, & ventriculum dextrum in duas caveas, auricularem & arterioſam, dividere ſcripſerit. Vidi bipartitam fuiſſe, & discrimini duarum partium muſculum maximum ſe inmiſiſſe, adque utramque ſuos emiſiſſe tendines. Quæ pars ventriculi ad arteriam ducit, eadem levior eſt, & minus elatis muſculis carnoſis diſtinguitur.

In hanc, ſi brevitatis gratia impropriad vocem excuſare licet, valvulam, aut unus muſculus, ſed grandis, & ſæpe biceps, ſe inmittit, aut duo *p*, vel æque magni, vel inæquales; eſt etiam ubi tres denique, & quatuor omnino, muſculos ſe in unam hanc valvulam inferuiſſe viderim. Sed etiam aliarum valvularum muſculi huic tendinum ſuorum partem inmittunt *q*.

Sub

n l. c. Tom. II. p. 639.
tab. XI. b. b. b.

o *De differ. inter. nat. & non nat.* fig. 45.

o* *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1752. p. 321. 322.

p Duos habet *Senac* l. c. F. G.

q Huc refero verba ejusdem viri Ill. *les deux bords*

de chaque pilier p. 214.

Sub hac valvula, ad acutum cordis marginem, anulus venosus perangustus, vix lineam latus est, quam quidem sedem pro intervallo duarum valvularum habeas.

Valvula *inferior anterior* five *marginis acuti*, sæpe angustissima, cæterum satis longa, & nonnunquam priori pene æqualis, ponitur partim in plano superiori, & partim in eo, quod septo transverso insidet, versus mucronem vero minus, quam prima, protenditur. In eam plures plerumque muscoli, sed minores se inmittunt, ad quatuor usque, quorum qui primæ valvulæ propior est, idem in eam aliquos etiam tendines infigit. Vidi tamen etiam huic valvulæ unicum, sed magnum musculum fuisse, aut cum comite altero, aut duos minores. Alias absque musculo tendinei funiculi ex cordis parietibus in hanc valvulam abeunt.

Tertia valvula *posterior* five *septi cordis*, potius aliquanto priori latior, a prioris termino incipit, qua septum cordis a parietibus ejus visceris primum discedit. Inde secundum id septum ad arteriæ pulmonalis ostium pene ad perpendiculum adscendit. Etiam hujus valvulæ non rarissime nullus musculus est, & numerosi tendines absque conspicua papilla carnea ex septo cordis nati inmittuntur. Alias tamen & ipsa vel unum musculum cum secunda valvula communem habuit, vel majorem, cum altero minori, ut eorum iterum priorem cum valvula secunda partiretur, alterum proprium retineret. Vidi demum hanc valvulam

omnino defuisse, ut duas, pro tribus numerare necesse foret.

Aliorum scriptorum descriptiones varia, a meis aliena habent, procul dubio ex peculiari fabrica nata, quæ Cl. viris occurrerit *r*. Nam & mihi tribus plures latiores valvulosas productiones vidisse contigit, ut eo facilius fidem habeam Viro Ill. *Nicolao Rosen s*, & R. J. *Crescentio Garengeot t*, qui dextri ostii venosi valvulas sex numerant, aut J. *Benigno Winslow v*, qui minores valvulas majoribus interponi scribit. Non ideo penitus cum Ill. *Archiatorum comite* consensero, qui re accurate examinata quinque *x* valvulas reperiri scripsit, neque cum Ill. *Lieutaud*, qui nuper valvulosum anulum omnino in tres partes dividi posse negavit *x**. Neque musculos papillares ejusdem dextri ostii accurate quinos *y* numeravero, ut *Caspar Bartholinus Thomæ F.* aut quatuor *z*, quorum duo in septo cordis sint, e regione duo, ut *Gavetus*. Natura enim hic in numero & in magnitudine plurimum sibi permittit, neque intra numeros 2 & 3 *a* musculorum numerum coercuerim, neque intra 4 *b*. Octo certe & novem depinxit *Cowperus c*, a

r Tendons qui sortent de quelques colonnes dispersées sur les parois T. I. p. 214. T. II. p. 683.

s In compendio anatomico suecico edito p. 295.

t Splanchnologie T. II. p. 387.

v l. c. n. 60.

x l. c. p. 213.

*x** l. c. p. 320.

y Specim. anat. p. 66.

z Nov. febr. Idea p. 4.

segg.

a Vieussens l. c. p. 99.

b Senac l. c. p. 200.

c Tab. 38. f. 2.

quo viro aliquæ mearum observationum me non sinunt alienum esse.

In animalibus quadrupedibus, quæ ego quidem incidi, eadem fere, quæ in homine, fabrica est. In avibus sinistri venosi ostii valvulæ perinde duæ sunt, sed in dextro unica, in semicirculum flexa, in acumen extenuata, carnea valvula, musculo similis prætenditur, quæ integrum cum septo cordis circulum perficit, neque tendinearum fibrarum apparatu instruitur. Ita de avibus in universum princeps historiæ cordis auctor scripsit *d*, & *Claudius Perrault e*, qui plurima animalia dissecuit, aut a *Duverneyo* incisa delineavit. Hæc est valvula circularis carnea dextri ventriculi, in cygno *Bartholino f* dicta, in struthiocamelo *Valisnerio g*. In haliæto *h*, in ardea stellari *h** alii descripserunt, ego in corvo, cornice, & gallina vidi. In piscibus observationes proprias non habeo, tres *i* faciunt aliqui, insignes viri, alii duas *k*. In *Xiphia* valvulas arteriosas similes vidit *Cl. Kölpin k**. In crocodilo tres fuisse lego *l*.

d l. c. p. 60. *Highmor dis-*
quisit. anat. p. 143.

e *Essays de Physique* T. III.
p. 261.

f In *anatomie cygni* p. 41.
& *historia* 79. *Centur.* II.

g *Oper. omn.* T. I. p. 248.
Notomia d'un struzzo.

h *Borrich hermet. Aeg. sap.*
p. 267.

*h** *Amstelodamenses anato-*

mici in Colleg. Privat. obs.
p. 24.

i *Janus Plancus in Com-*
ment. Acad. Inst. Bonon. T.
II. P. II. p. 301. in mola aliis-
que piscibus.

k *Perrault* l. c. p. 260. 261.
Hill. review. p. 113. & in
galeo *Academici Parisini.*

*k** l. c.

l *Jesuitæ in observ. de ma-*
them. & de physique p. 28-

§. VIII. *Ostium arteriosum. Tendo Cordis arteriosus.*

Diximus venosum ostium ventriculi anterioris, superest alterum, quod in *pulmonalem arteriam* ducit. Ponitur in ejus ventriculi fine supremo & anteriori, posterius & inferius, quam pars longissima valvulæ venosæ, & ejus ope ab ostio venoso separatur; inde nomen *caveæ arteriosæ* Cl. *Lientaud*. Ut accurate hæc describam, arteria pulm. se in plicam cordis inmittit, & ad inferiora adeo descendit, ut ab aliqua parte cordis altius adscendente, tamquam ab anulo, ambeatur, & cordis fibræ transversæ, secundum partem arteriæ intra cor receptam prætervehantur. Conjunctio vero arteriæ cum corde proxima est ejusmodi. Caro cordis in circuli perfecti formam terminatur, & fibræ transversæ cordis partim inter valvulas arteriosas per lineæ longitudinem producuntur, & aliquanto plus, partim in partem arteriæ, quæ finem valvulosum perficit, pariter sursum pergunt, fere per sesquilineam, & accurate transversæ cum alba pariter membrana arteriæ connecuntur, cellulosæ brevis telæ ope, ut nulla *m* cordis fibra in arteriam continuetur. Supra hanc lineam jam alba, & arteriosa natura sola superest. Tendo vero vulgo dictus *arteriosus cordis*, est alba linea nondum cor finiens, ex arcta adhæensione membra-

l^x *Lientaud* l. c. p. 321.

m Ut quidem *Lancisus* descripsit p. 51, edit. 1728.

næ internæ cordis cum fibris carneis nata, in quam lineam aliquæ striæ ex ipso ventriculo adscendunt, & aliquam imaginem tendinis repræsentant, verus enim tendo nullus adest. Splendidi quid subesse nonnunquam non repugno.

§. IX. *Valvula Arteriae pulmonalis.*

In his nunc cordis cum arteria confiniis, inferius tamen & propius cordis mucronem, quando utraque cavea communi sectione finditur, adparet alba undulata linea *n*, ab ipsis valvulis non separata, quæ earum radices sequitur, easque generat. Ab ea linea exeunt in arteriam *tres valvulae*, venosarum, quæ per cavam venam ejusque ramos sparsæ dudum a nobis descriptæ sunt, in universum similes, multo tamen robustiores, quas hinc cordis continuata membrana intima, inde intima pariter arteriæ membrana efficit. Ex membranæ in ipsa valvulæ acie sibi occurrunt & continuantur. Numerus trium valvularum pene perpetuo obtinet, duas tamen aliquando Cl. vir J. Zacharias Petsche o vidit, & duas in urso fuisse lego *p*. Quomodo vero pro unica & orbiculari numerari possint, ego quidem non penitus intelligo. Sigmoides a figura, & semilu-

n Senac tab. 13, f. 1. *b. b.* Tomo VI. recusa est, n. 47.
b. & tab. 15. *a. a. a.* 48.

o In dissertatione, quæ in *p* Comm. Lit. Nor. 1734.
 collectionis nostræ anatomicæ

nares dicunt, priori, tamen nomine eas ab aorticis valvulis mavult distinguere J. *Baptista Morgagnus* *r.* Vetustissimis temporibus innotuerunt, & *Erasistrato* *s.*, & auctori libri *de corde* *t.*, qui inter *Hippocraticos* existat.

Situs has valvulas distinguit. Anterior est, posterior, & superior. Omnino vero in ea sede arteriæ ponuntur, quæ carnibus cordis circumpositis continetur.

Fabricam est ut tradamus. Ima ora, qua cordi committuntur, & qua sinus cæcus valvulæ clauditur, curvatur in arcum circuli *v.*, semicirculo fere minorem, neque enim eam oram acutum angulum effecisse vidi, uti quidem *Vidius* pinxit *x.*, & *Garengeotius* descripsit *y.* Si per eos arcus trium valvularum lineam rectam duxeris, ea quidem circulum in plerisque cadaveribus efficiet, erunt tamen, in quibus figura undulata nascetur, quod aliqua earum valvularum propius mucronem cordis prodeat, alia propius aortam. Ita videtur olim innuisse *Guilielmus Cowper* *z.*

Inde ora valvulæ in arteriam protensæ, cum cordis quidem membrana continuatur in linea, quæ directioni arteriæ parallela est, & obvertitur simili in utraque sodali valvula li-

r In *Epist. anat.* sæpe cit.

s Apud *Galenum de Hipp.* *Cowper* in omnibus iconib.

& *Platonis decretis* L. VI.

c. 6.

t n. 3. Semisectio circulo comparat.

v *Vieussens* tab. XI. f. 1.

Senac tab. 15.

x Tab. 75. fig. 10.

y l. c. p. 145.

z Tab. 38. f. 1.

neæ, donec supremi vertex duarum valvularum, supra suum sinum elati, ex membrana arteriæ quodam quasi callo emineant, quem *Lancisius* cum clitoride comparat *a*.

Reliqua valvulæ latitudo, inter duos, quos descripsi, fines media, adscendit & ipsa, & figuram parabolæ fere induit. Sed eadem ab arteriæ pariete magis recedit magisque, ut angulum cum eo primum intercipiat, & denique, uti in valvulis venosis diximus, sinum cæcum, parabolici coni similem. Is vero arteriæ paries, qui cum valvula sinum perficit, sive a sanguinis vi, sive ab ipso naturæ instituto *b*, sensim extrorsum urgetur, & convexus fit, donec cylindrica arteria in tria convexa tubera extrorsum promineat, quos *Antonius Maria Valsalva Sinus c* vocavit, doctissime vero & in animalibus & in homine persecutus est fidus amiffi amici heres *Morgagnus d*. In aorta tamen, quam in pulmonali arteria, ii sinus manifestiores sunt.

§. X. *Fibræ. Noduli.*

Denique fluitans ora valvulæ, quæ sinum valvulamque suprema terminat, lunulæ figuram refert, inter duas illas callosas valvulæ cum arteriæ pariete conjunctiones intercepta. Is margo quam reliqua valvula durior esse solet,

a l. c. p. 52.

b Nam in *Epistola XV. 2. f. 1.*
Morgagnus etiam in tenerioribus reperiri auctor est n. 3.

c In *dissert. posthuma I. tab.*

d *Idem* *ibid.*

uti dudum *Arantius e*, advertit, deinde alii clari viri *f*, & ita ornavit *Guernerus Rolfinck g*, ut in senibus cartilaginis naturam induere scripserit. In aortæ certe valvulis post febrem ardentem cartilagineum marginem vidit *Damianus Sinopeus h*, cum in arteria pulmonali non perinde degenerasset.

Verum non raro in arteriæ pulmoneæ valvulis ejusmodi noduli reperiuntur, quales paulo post in aortæ valvulis describemus. Id si locum habuerit, tunc quidem is nodulus aliquantum supra oram liberam valvulæ eminet, eamque oram in duas lunulas dividit, quarum utramque hic valvulæ ab arteriæ pariete origo, inde nodulus terminat *i*. Ejusmodi icones dudum *Vidus Vidius k*, accuratius vero, ex aorta, *Morgagnus l* edidit.

Nihil ultra in junioribus corporibus adparet. In adulto vero homine, eo magis, quo majori robore polluerit, fibræ splendidæ & tenaces in valvulis, etiam pulmonalis arteriæ, conspiciuntur. In universum satis transversae sunt *m*, & magis quidem transversae in hoc arterioso trunco *n*, quam in aorta. Oriuntur ab

e *Observat. anat.* 33.

f *Fantonus l. c.* p. 299.

g In *diff. de corde* p. 28.

h *l. c.* p. 42.

i *Conf. Winslow n.* 67.

k *Tab.* 75. f. 10.

l *Advers. Anat.* III. tab. 4. f. 3-

m Meras transversas *Verheyenius* depinxit *Anat. L. I.*

Tab. 20. f. 4. & *Comperus tab.* 38. f. 5. & III. *Senacius tab.* 13. p. 218. ex elephanto vero *J. Stukeley l. c. tab.* 3. f. 1. 2. modice lunam referentes.

n *Morgagnus epist. anat.* XV. n. 48. *advers. anat.* V. p. 36. Perpetuæ sunt.

ea linea, qua utrumque valvulae latus in arteriae parietem innascitur *o*, indeque paulum descendunt, & magis minusve inter se parallelæ in valvulae latitudinem se disjiciunt, & nonnunquam in oppositum finem continuantur. Inter eas porro aliquæ magis descendunt, & ab origine sua superius posita profundius propiusque finem cæcum valvulae terminantur. Aliæ arcu facto in nodulum desinunt *p*, quem promisi me descripturum.

Alii clari viri *q* ita hæc ornarunt, ut fibras istas in duos musculos constituerint, quorum alter transversus valvulam in rectitudinem decurtet, & sinum ejus stringat & evacuet: alter ab ima valvulae radice ortus, inque nodulum insertus, valvulae sinum dilatet *r*, & *Morgagni* *s* auctoritatem pro his ipsis fibris citare solent. Ita aliquando se habuisse, ego quidem minime repugno, mihi tamen hæc fabricæ compositæ pulchritudo nunquam occurrit, neque eam *Portalius* recipit *s**. Etiam minus eas fibras admitterim, quæ ex cordis ventriculis ortæ, in eas valvulas inferi dictæ sunt *t*.

Harum porro valvularum ea mensura est, ut in aqua fluitantes, & sibi permissæ, totum

o Fantonus l. c. p. 300. *I. n. 8. Adductores dixit.*
p Morgagnus advers. anat. *r Lacerti triangulares ab-*
I. tab. 4. f. 3. Glass l. c. ductores Ejusdem ibid. p. 112.
p. 40. ex Cassenbohmis, Senac s Epist. Anat. XV. n. 17.
I. c. Non perpetuas esse Bian- *18.*
chus monuit ad Mangeti thea- *s* l. c. p. 427.*
trum anatomicum p. 218. *t Lancisio dictæ p. 52. tab.*
q Bass obs. anat. chir. Dec. 4. f. 4.

ostium arteriæ claudant. Melius autem claudunt, quo magis sinus earum expanduntur: tunc enim, ut facile visu est, oræ liberæ valvularum ad se accedunt invicem, & eo majorem partem luminis arteriosi occupant, quo magis a parietibus arteriæ recedunt, totumque demum arteriæ tubum etiam prius claudunt *v*, quam perfecte ad angulos laterum rectos explicentur. Sive flatu arteriam *x* repleas, sive cera, quam ex ramo arteriæ pulmonæ versus cor repellas, perinde succedit experimentum. In ea actione fibras diducentes laborare, valvulasque expandere Cl. viri *y* scripserunt, quas quidem voces ita admitto, ut fibras, quæ de albo genere, neque irritabiles sint, constringi non persuadear, robore vero suo resistere credam, ne valvulæ ponderi repulsi liquoris cedant.

Cum tamen fieri posset, ut magna vi ab obstructis pulmonibus sanguis versus cor redundet, fit omnino, & frequenter certe, ut inter has robustiores nitentesque fibras, aliqua pars valvulæ cedat, divellatur *z*, rimisque porro ea ostiola pateant, in reticuli modum, cujusmodi etiam figuræ existant *a*. Major morbus est, quando in duarum laminarum, qui-

v Ejusmodi figuræ sunt *Cowperi tab. 40. f. 3. 5.* in aorta quidem. trifolio comparavit *Nicolaus Habicot semaine anat. Journ. IV. lec. 8.*

x *Rouhault reponse p. 64. 65.*

y *Morgagni Advers. Anat. V. p. 36.*

z *Idem vir. Ill. ibid. p. 31. 32. Epist. XV. n. 19.*

a *Cowper tab. 38. f. 3. 4. Bass l. c. p. 114. & in icon. Senac in tab. 15.*

bus valvulæ constant, intervallum materies callosa, ossea, lapidea deponitur. Frequentiora vero in aorta exempla sunt, uti majori vi sanguinem ab aorta retrocedere probabile fit.

§. XII. *Alter Ventriculus. Quibus Animalibus nullus sit.*

Dextrum ventriculum descripsimus. Is unus est in animalibus frigidi sanguinis, nullo, quod mihi notum sit, excepto, quadrupedibus nempe oviparis *b*, serpentum genere, & piscibus pulmone destitutis *c*, & vermibus *d*. His omnibus animalibus, siquidem a natura pulmonem acceperunt, tamen adeo exiguum ad id viscus arteriam mittunt, ut non major sit, quam pulmonis portio requirat. Ita reperio in rana, cui sanguis friget, inque piscibus. In eam arteriam idem, qui in reliquos ramos aortæ, cordis ventriculus sanguinem expellere potest. Contra, quibus animalibus sanguis calet, iis ad pulmonem arteria aortæ fere æqualis mittitur; iis suus proprius ventriculus datus est, qui tantam molem sanguinis legitimo robore propellat. Uti enim pulmonis arteria aortæ æqualis est; ita perinde etiam proprio videtur

b In ranis *Jacobæus* p. 16. *hist.* 16. in torpedine *Grevv*

c In galeo pisce *Academici Musæum* p. 39.
Parisini Memoir. pour servir à l'histoire des animaux: in *d* In mytulo *Mery. Mem. de l'Acad. Roy. des scienc.*
xiphia Bartholin Centur. 11. 1710. p. 421. in cochlea *Lister de cochl.* p. 25.

corde eguisse. Quare his animalibus omnibus, siue quadrupeda fuerint, siue aves, siue pisces calidi sanguinis *e*, duæ in corde cavæ sunt, quas dudum cum ventriculo *f* *Celsus* comparavit.

Non ignoramus, *Aristotelem* magnis animalibus tres in corde manifestos ventriculos tribuisse, mediocribus bestiis duos, cum tertio obscuro, minimis unicum cum duobus obscuris sinibus *g*: & alibi apud eum clarissimum scriptorem legi, dextrum ventriculum maximum, sinistrum minimum, medium etiam mole mediocrem esse *h*: ex amplissimo vero ventriculo venam majorem, ex medio sinu aortam prodire *i*. Verum aut subtilis aliquis ordinis amor magno viro inposuit, aut loca ab *Apellicone* interpolata sunt, quæ *C. Hofmanni* est excusatio *k*.

Qui vero *Aristotelem* defenderunt, tresque cordis ventriculos esse adfirmarunt, ut *Achillinus l*, *Fortunius Licetus m* & *Nicolaus Massa n*, ii certe nimium sectæ dederunt. In ipso enim elephanto nuperi *o* profectores non ultra duos

e Ed. *Tyson* in *anatome phocænae* p. 30. *Collins* l. c. componi.
p. 776. tab. 44. &c.

f L. V. c. 1.

g *Hist. anim.* L. III. c. 3.
& ex eo *Plinius* L. XI. p. 625. edit. *Harduini*.

h L. I. c. 17.

i L. III. c. 3.

k *Apologia Galeni* p. 109.

l P. IX. Fatetur medium

ventriculum ex multis cavæis
m Apud *Bartholinum* Cent.
I. epist. 38.

n *Isag. anat.* p. 56. Tertium ventriculum in summo septo quærit.

o *Parisini* in *Memoir. pour servir à l'histoire des animaux.* Tom. III. Part. III. p. 135.
All. Moulins anat. of an Elephant burnt at Dublin.

ventriculos reppererunt. Rarissimo exemplo *Kerkringius* in homine tres ventriculos vidit *p*, quorum duo dextri lateris fuerunt, & rarissimo pariter *Parisini q* illi anatomici, duos ventriculos arteriosos, venosum tertium in fetu reppererunt.

In piscibus tres ventriculos describit *Cæsalpinus r*, sed is utique unicum ventriculum cum bulbo arterioso, & auricula intelligit. In testudine tres ventriculos alii *Parisini* *Academici s* numerant, & omnino quatuor *Johannes Meryus t*. Verum manifestum est, sermonem esse de unico ventriculo, septis imperfectis ita diviso *v*, ut tamen undique una cavea ex communicantibus foveis componatur. Ejusmodi crediderim tres ventriculos esse in corde crocodili *x*, quos alii Galli citarunt. Denique neque in cæcilia *y*, vipera *z*, serpente & lacerta *a* duos ventriculos cordis esse permittit

p *Observ.* 69.

q *Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1699. p. 37.

r *Quæst. Peripatet.* p. 119. a. 119. b.

s *Memoir. pour servir à l'histoire des animaux & Meryus* in *Memoir. de l'Acad. Roy. des Scienc.* 1692. 1703. in testudine marina.

t *Idem Reflexions sur le cœur de la tortue J. de Trevonx* 1713. & *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1703. in terrestri testudine.

v Testes cito viros *Clariss. J. B. Caldesi notom. delle tar- tarughe* p. 60. *Jacobæum* de

ranis p. 105. *Josephum* du *Verney Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1699. *Bussiére Phil. Transact.* n. 328. *Stobæum Act. Lit. Suec.* 1730. *Griffith Hughes natur. histor. of Barbados* p. 309. *Gautier observ. de Physiq.* Tom. III. p. 426. Duos iste ventriculos facit, ostio conjunctos, in quo valvula est.

x *Duverney Mem. de Mathem. & de Physiq.* p. 32.

y *Muralt Vademecum anat.* p. 33.

z *Idem ibid.* p. 534.

a *Willis de anim. brutor.* p. 28. 29.

analogia naturæ, quæ simillimis animalibus, ranæ, & lacertæ, unicum dedit, neque finit ita se habere arteriæ pulmonalis exiguitas, & ex aorta certa origo.

Nescio an forte *Aristoteli* occurrerit aliquid simile ejus, quod nuper *Donaldus Monro* vidit, sinus nempe ad apicem cordis adscendebat polypis plenus, in sinistrum ventriculum apertus *a**.

§. XIII. *Septum cordis.*

Si duo ventriculi in uno corde sunt, superest ut *septo* discernantur. Carneum id totum est, & crassum a basi oritur, sensimque extenuatum in apice terminatur. In eo non difficile est, vel ex colore, dextri ventriculi carnem, & sinistri, & mistam ex utroque distinguere. Non ergo totum ad sinistrum ventriculum pertinet *b*. Eminent in ventriculum dextrum, ejusque caveam angustat, ut pro circulari lunata sit *c*. Totum reticulatum est, utrinque, ut inter intricatos lacertos foveæ sint, quæ & ipsæ minorum fibrarum rete prætextum habent, tanto tenuiores, quo profundiores sunt, ut non inepte ab antiquis anatomicis *d* conicæ dictæ sint.

*a** *Prælect.* p. 107.

b Uti docuit Cl. *Bussiere* lettre à *Mery* p. 16. *Lieutaud* l. c. p. 215.

c p. 132.

d *Galenus de facultat. natur.* L. III. c. 15. *Jac. Be- rengarius* in *Mundinum* p. CCCL.

Hæ foveæ sunt, quibus abusa vetustas viam sanguini e dextro ventriculo in sinistrum patere persuasa, eo minus intellexit, per pulmonem primum id omne circumduci, quod dexter ventriculus expulit. Dudum tamen ii viri, qui naturam crebrius consulebant, cæcosque reperiebant anfractus, quicunque inter reticulatos lacertos cordis intercipiuntur, senserunt, parum in ea opinione esse firmitatis. In homine adeo ægre poros septi apparere falsus est *Jacobus Berengarius e*, & omnino a se reperiri posse negavit *Vesalius f*. Sed parum iisdem etiam *Arantius g* tribuit, eaque via sanguinem uti penitus rejecit, *Fallopium* olim discipulus *Pigafetta h*. Retinebat autem meliora sensuros antiquitatis veneratio, ut etiam stylo vias per cordis septum aperirent *Adrianus Falcoburgius i* & *Otho Heurnius k*.

Sed etiam post revelatum sanguinis circuitum per experimenta *Payani k** eos poros confirmatum ivit *P. Gassendus l*: *Bartholinus* vero in porcis & falconibus patentes *m* descripsit. Semel sibi non sine valvulis visum foramen renovavit *D. de Marchettis n*, nuperiorque *Lan-*

e Ibid. p. CCCXLI.

f L. VI. c. 15.

g Obs. 38.

h In epistola *Monavii*, quæ exstat inter *Cratonianas* a *Schulzio* editas, edit. in 8. T. V. p. 344.

i Apud *Ishr.* v *Diemerbroeck* p. 278.

k Apud *Riolanum anthro-*
pogr. p. 235.

*k** *Ep. de septo cordis* p. 262.

l *Conf. hist. anat.* 67. *Centur. II. Anat. renov.* p. 387. 400. *Vindic. anat.* p. 77. Non perpetua esse fatetur.

m *Compend. anat.* p. 80.

n In *Zodiac. Med. Gall.* T. I. p. 134.

douillette o, ut alios præteream non propriis usos experimentis.

Contra *Caspar* quidem *Hofmannus* p præterito seculo primus, adducto suo experimento, eosdem poros refutavit, majorque paulo post testis eliminavit, *Guilielmus Harvey* q, quem plurimi, crebris brutorum animalium incisionibus exerciti r viri secuti sunt. Sed ne in elephanti quidem corde pori per septum patent s.

Ego nihil unquam simile vidi, etsi facile intelligo, & stylo promte satis vim molli carni inferri, & fieri posse, ut ab ipsa sanguinis aliquando in vivo animale nitentis violentia viæ aperiantur, uti alias venæ, auriculæ, ventriculi cordis, arteriarum magni trunci rumpuntur. Certe in nonnullis, paucis tamen, hominum cadaveribus verissimus anatomicus *J. Baptista Morgagnus* t unum alterumve in septo sub arteriæ pulmonali origine foramen reperit, quod ad sinistrum ventriculum duceret.

§. XV.

o *Rolfinkium* in *diff. anat.* p. 1132. de corde p. 97. *Riolanum* in *Slegelium* p. 265. &c.

p *De thorace* p. 94. *Instit. Med.* p. 120.

q *Proëm.* p. 18.

r *J. Walæus* in celebri ad *Bartholinum* epist. I. p. 388.

J. Pecquet *diff. anat.* p. 34. *N. Highmor* *disquisit. anat.* p. 140. *Conrad. Victor Schneider* in *disp. de corde* p. 39.

Adde *Vop. Fort. Plempium* *fundam. medic.* p. 113. *Laurenbergium* &c.

s *Allen Mullen* l. c.

t *Epist. Anat.* XV. n. 62.

§. XIV. *Ventriculus sinister.*

Primigenius iste solus cor constituit, cum minimo dextro, quamdiu pulmo nondum evolutus exiguum sanguinem admittit. Idem *Ventriculus* cordis sinister rectius *posterior* vocatus, & nuper *secundus* minus commode, qui primus existat *t**. Idem fere cum dextro descriptus est, nam pleraque in utroque conveniunt. In adulto homine longior esse solet *v*, & angustior *x*, & accuratius conum obtusum, ovique similem refert, & pro sectione circulum habet *y*; idemque carne triplo crassiori continetur, si a fetu recesseris. Reticulum tenerius, quam in dextro ventriculo est, sedes sub aortæ origine perinde levis *z*. Trabes hic non raræ sunt, quæ oppositos cordis parietes conjungunt *a*. Musculi papillares valvulas retinentes tres quatuorve.

§. XV. *Ejus Ostium venosum & Valvula mitrales.*

Venosum ostium lævi ventriculi in cadavere perinde ovale, cæterum horizonti parallelum est *b*, & aliquanto dextro minus. In eo similis alba

*t** Lieutaud 1. c. p. 313.

v p. 326.

x p. 327. 328.

y Vesal L. VI. f. 11. Bartholin p. 297.

z Senac tab. XI.

a Bidloo T. 22. f. 7. Comper tab. 39. f. 1. Vioussens de

remot. & proxim. princip. tab. 6.

b Eustach. tab. 16. f. 6. Lower 5. f. 1. Bidloo tab. 22. f. 7. Comper tab. 39. f. 1. 2. 3. Tab. 40. f. 1. Vioussens du cœur tab. 10. f. 2.

linea sinistrum finum cum ventriculo conjungit, quæ nonnunquam osseam naturam induit *c.* Sed etiam similis ex ea sede anulus membranaceus *d*, in ventriculum ejus lateris producitur, fortior *e* tamen in universum, & crassior, quam in dextro ostio venoso. Idem vero anulus in duas potius, quam in tres productiones dividi potest, quas post *Vesalium f*, *mitrales valvulas* vocare solent, quæ aliquanto evidentius, quam triglochines illæ, ab ipsa natura separatæ sunt. *Superior g* enim altera productio perpetuo major est, & in nuper nato puero omnino quatuor lineas lata. Ea ex aorta nascente inter valvulam posteriorem & dextram parte aliqua prodit, & aortæ ostio ita obvertitur, ut id omnino totum occludere possit *h*, quando expansa erigitur. Ita denuo secundum voces *Cl. Lieutaud* ventriculi, de quo agitur, caveam arteriosam ab auriculari dividit. Altera *inferior i*, minor, obtuso margini adsi-

c Anulus durus, cylindricus, cinctus carne ventriculi sinistri, in aqua forti solubilis *Ill. Meckel l. c. p. 107. 108.* In fenestra sub valvulis mitralibus os uncia longius, & in vetula os dimidii anuli simile, cui eæ valvulæ adhærebant *Morgagni Advers. anat. V. p. 20.* Vena pulmonalis adnascente cartilagine pene clausa *Mayow op. p. 375.* An idem est tendo ad basin cordis, quem sæpe offuscere dicit *Josephus Duver-*

ney J. des Savans 1689. n. 19.

d Eustach. tab. 16. f. 6. Lomer tab. 5. f. 1. Bidloo tab. 22. f. 7. Cowper tab. 39. f. 1. 2. 3. tab. 40. f. 1.

e Vesal. p. 738.

f Ibid.

g Senac tab. 11. Lieutaud essays anatom. p. 233. tab. 4. f. 2. physiolog. p. 68. Cheselden l. c. p. 180.

h Cowper tab. 39. f. 3.

i Senac tab. 12.

det. Non ita recte pro quatuor valvulis numeraveris *k*. Inter has valvulas anulus membranaceus omnino continuatur, & lineæ latitudinem conservat *l*, aut aliquanto plus. In quadrupedibus satis similis fabrica est, ut omnino mirarer, si in volante sciuro desiderarentur *m*. Sed etiam in avibus reperiuntur *n*, tendines numerosi ex musculis papillaribus orti plurimum ordinum, & sibi incumbunt imbricati, & in triangula expansi.

Hæ sinistri ostii valvulæ frequentius rotundis, carneisque quasi nodulis interstinguuntur, calloforum gangliorum similibus. Sed longe etiam hic, quam in dextro ostio, frequentius, callosa *o*, ossea, aut lapidea materies inter duas laminas effunditur, quibus hic anulus constat. Et valvulæ quidem totæ callosæ fiunt, ut ipsa membranæ natura simul in duriores, carneam, tumidamque mutetur. Deinde officula varia in laminarum intervallo reperiuntur. Circulus membranaceus sinister osseus & angustior, in homine subito extincto visus est *q*. Valvula mitralis sacci similis, officulis distincta *r*. Valvulæ venosæ sinistræ pene coalitæ, cum ossibus præter naturam natis, *s*. Valvula

k Garengeot l. c. Rosen l. c.
l Comper tab. 39. f. 3. prope 6.

m Duvernoi Comment. Acad. Petrop. T. V. p. 233.

n Lower p. 41.

o Opuscul. patholog. p. 133.

q Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1701. p. 25. 26.

r Hist. de l'Acad. Roy. des Scienc. 1729. p. 14.

s Ibid. 1735. p. 19.

mitralis ossea in fene *t*. Sed infinita exempla reperias.

Demum sabuli granula distincta & coacervata in eadem sede nimis frequenter vidi *v*, vel tecta membranacea anuli natura, aut perforato eo velamento nuda. In hydrope thoracis lapidea natura in mitralibus valvulis *x*. Lapis in altera valvula venosa sinistra, hinc miri dolores & pulsus interceptus *y*. Sabulum in saccum valvulæ effusum *z*. Sed etiam hæc exempla nimis abunde occurrunt *a*. Cartilagineas cum polypo vidit Cl. *Loeber a**.

Musculi cordis sinistri papillares, eorumque tendines, iterum in universum similes eorum sunt, quos in dextro ostio venoso descripsimus. Majores tamen, & pauciores reperire soleo, frequentius bicolles & tricolles *b*. Satis frequenter cuique valvulæ suus musculus est *c*; aliquando tamen earum altera alterum minorem habet *d*, ut tres in universum sint. Vidi tamen plures fuisse, tres in superiori valvula, pro inferiori duos. Quare non renue-

t Comm. Litt. Noric. 1744. 4. 6. *Philos. Transact.* n. 297. p. 22.

*a** De cordis fabrica edit.

v Conf. Opusc. Pathol. 1767. 4.

obs. 52. p. 135.

b Senac tab. II. 12.

x *Philos. Transact.* n. 336.

c Duos pingunt Comper tab.

y Bellini de urinis & pulsibus p. 610. 611.

39. f. 1. 2. *Eustachius* tab.

z *Nebel* de coagulo bilis p.

16. f. 6. *Vesalius* L. VI. f.

6. *Vieußsens* tr. du cœur p.

9. Duos facit *Lieutaud* l. c.

16. tab. 13. f. 2. *Philos.*

p. 39.

Transact. n. 339.

d Tres habet *Vieußsens* l. c.

a Comper l. c. tab. 40. f.

p. 102.

rim quatuor *e* aliquando ejusmodi musculos vi-
fos esse, aut sex demum, septemve *f*. Trabes
in oppositam cordis carnem frequenter inmit-
tunt. Tendines perinde alios in oram suæ
valvulæ conspicuos infigunt, alios minus evi-
dentes, in mediam, & superiorem sedem anu-
li mittunt, qua parietes cordis occultior respi-
cit. Ejusmodi tendines ad quadraginta in eo-
dem musculo numeravi.

In ipsis musculis & tendinibus squamas os-
seas passim reperi. Aliquæ fibræ tendinosæ ve-
nosarum valvularum sinistrarum petrefactæ fue-
runt in corde, ab Ill. *Mekelio* descripto *g*.

§. XVI. *Ostium aorticum, ejusque valvula.*

Uti de dextra cordis cavea pulmonalis ar-
teria, ita de sinistra aorta prodit, cujus ostium
omnia similia habet, albam, undulatam, val-
vularumque origini subjectam lineam *b*, tendi-
nem *i*, ut vocatur cordis, & carnem ejus vis-
ceris nascenti aortæ circumpositam. Unice ro-
bustiora omnia, & aliquanto dexterior, atque
una posterior sedes est, ex qua aorta prodit.
Sed etiam *valvula k*, in eo ostio arterioso nu-
mero, & fabrica similes reperiuntur, quas *se-*

e Idem ibid. tab. 13. f. 2.

Gavet l. c. p. 14.

f *Garengot* l. c. *Theodulus*
Kemper in diss. de valvulis
p. 23. Multi in elephanto
sunt *Stukeley* l. c. tab. 4.

g l. c. p. 107.

b *Senac* tab. 13. b. b. b.

Conf. p. 336, n. 2.

i ib. n. 8.

k *Eustach.* T. XVI. f. 5.

Senac tab. 13. *Morgagni* ad-
vers. anat. I. tab. 4.

milunarium nomine aliqui Cl. Viri distinguunt *l*. Tres sunt, adeo frequenter, ut alii numeri pro nullis haberi possint.

Situs aliquantum differt, duæ enim superiori loco ponuntur, altera anterior, posterior altera; tertia inferior est. Earum eæ, quæ superiori loco ponuntur, sodales habent arterias coronarias, inferior nullum aortæ ramum vicinum habet. In universum majores sunt, uti arteriæ ostium majus *m* est, & robustiores, fibrasque, quas descripsimus, manifestiores nactæ sunt, & ima ora, qua ex aortæ pariete nascuntur, durior est & solidior, & aggeris nomine *n* magis, quam in arteria pulmonali, distinguimeretur, quæ quidem mihi unice callosior, & albida pars arteriæ videtur, fibras autem musculosas aut parallelas, aut tranversas, a claris viris habere dicitur *o*, quæ in arteria pulmonali perobscuræ sint. Hi aggeres omnino rotundi, neque acuminati sunt. Id discriminis vero habent, quod ad valvularum finem liberum, magis tamen in adultis & vetulis corporibus, alba & callosa linea conspiciatur *p*, quæ continuatur cum albis pariter callis, qui sunt in duarum valvularum conjunctionibus, & a confrictione valvularum contra arteriam nasci videntur.

l Morgagn. Epist. anat. XV. n. 3. *b. b.* Bourlets vocat Senac p. 217.

m Vesalius p. 739.

n Valsalva l. c. p. 129.

tab. 2. f. 3. f. f. f. Morgagnus advers. I. tab. 4. f. 3.

o Morgagni Epist. Anat. XV. n. 4.

p Opuscul. Patholog. obs. 51.

§. XVII. *Noduli. Sinus.*

Pene perpetua *q* etiam in adulto homine corpuscula sunt, quæ *Arantii globuli* ab inventore vocari solent: calli nempe rubelli, duriusculi, gangliorum similes, fere ovati, aut ex subtiliori contemplatione triquetri, ut duo triave latera sursum coeant *r*. Ponuntur in media sede oræ valvularum liberæ, paulo tamen inferius nascuntur, quam ora est, eamque in duas lunulas dividunt. Non a tritu & constrictione nascuntur, aut ad morbos pertinent *s*, ut quidem absque anatome probabile videretur, nam in modo nato puero sæpe reperi. Etsi frequentissime adsunt, non tamen absque exemplo fuerit, uni alterive valvulæ *t* suum nodulum defuisse: nimius tamen fuit Vir. Cel. qui sæpius deesse scripsit *v*.

Primus horum nodulorum mentionem fecit *Julius Caesar Arantius x*: inde *J. Rod. Salzmannus y* parvas cartilagineas in valvulis sigmoides. Carnes vocavit *Theodulus Kemper z* fibrasque insertas descripsit, Sed accuratius in ea historia versatus est Vir Cl. *J. Baptista Mor-*

q Etiam in equo Bourgelat hippiatrice T. II. P. II. p. 443.

r Morgagni Advers. V. p. 33. Bloemestein de humorum per vasa sanguinea motu.

s Essays of a Society at Edinburgh. T. II. p. 312.

t Morgagni Advers. Anat. V. p. 31. advers. I. p. 22.

v J. B. Bianchi in Mangeti theatr. anat. p. 218.

x Observ. anat. 34. p. 95.

y Observ. anat. p. 54.

z l. c. p. 21.

gagnus a, post quem vulgo innotuerunt *b*. Hi noduli eum orbiculum perficiunt, quem valvulæ conjunctæ componunt, ut omniino, quoties valvulæ explicatæ sunt, tres noduli se adtingant *c*, axinque teneant arteriæ, & robore suo, quo valvulas superant, ei parti fluenti sanguini resistent, cujus maximum momentum est, quæ nempe axin tenet.

Cum major arteriæ aortæ duritas, & diameter, sanguinis a corde expulsi, aut ab aorta repulsi, majus utique momentum sit, quam in arteriæ pulmonalis ostio, hinc utique valvulæ istæ frequentius callis, ossibus, & effusis glebis sabulosis vitiantur. In sene cartilagineas, & globulos osseos vidit *Julianus Offrai d*. Duæ valvulæ semilunares in sene osseæ *e*. Eædem cartilagineæ post palpitationem cordis *f* & in senio decrepito *g*. Partim callosæ & partim petrosæ cum aortæ aneurysmate *h*. In aliqua valvularum aorticarum squama ossea, tum scrupi arenosi inter utramque laminam effusi *i*. Valvulæ semilunares scirrhosæ & cartilaginossæ *k*. Valvulæ eædem osseæ *l*, & coalitæ, ut nul-

a In *Advers. Anat.* I. tab. 4. f. 3. & in *Advers.* V. p. 31. seqq. quibus *Biancho* respondet.

b *Bass* l. c. *Senac* tab. 13. &c.

c *Morgagn.* *Anat.* V. p. 36. *Fantomus* l. c. p. 299.

d *Obs. de pratique* n. CXI.

e *Rosen* *compend. anat.* p. 37. 295.

f *Ad Brendel obs. anat.* 5. Dec. III.

g *Breslauer Versuch.* XXIV.

h *Opuscul. Patholog. obs.*

18.

i *Ibid. obs.* 51. 52.

k *Lancisius* l. c. ed. 4. p. 300.

l *Ruyssch Cent. obs. anat. Chir.* n. 69.

la sanguini viam pateret *m*. Frequens etiam est, valvulas aortæ calce tegi *n*. Exesæ valvulæ & lapideæ in phthifico o. Pulchram hujus vitii iconem dedit *Comperus p*, ut alios omit- tam. Neque rarum est coalescere, ut ostium perangustum ex corde pateat. Post orthopno- cem aut asphyxiam valvulæ ossæ & lapideæ ostium aortæ pene clausere *p**.

Etiam *sinus* in aorta, quam in arteria pul- monali, manifestiores sunt *q*, & fere in om- nibus quadrupedibus reperti *r*: ut tamen om- nino a sanguinis in eam sedem nitentis impe- tu, aortæ parietes extrorsum urgente nasci vi- deantur: in fetu enim & in recens nato ho- mine nulli sunt *s*. In puero novenni maxi- mos vidi & tumidissimos. Hactenus tamen im- petum sanguinis frangere possunt *t*. Uti in dextro latere, ita etiam hic superior eorum si- nuum pars in aortâ, inferior autem, fere di- midia, in corde est *u*. Alibi vero rectius di- centur.

§. XVIII. *Qs Cordis.*

Circa eandem sedem, orientem nempe de

m *Act. Medic. Berol.* T. I. vol. 9. p. 57.

n *Cheselden* 1. c. p. 182. *Phil. Trans.* n. 337.

o *Hagstroem de gener. cal- culor.* p. 6.

p 1. c. tab. 40. f. 4.

*p** *Lieutaud sepulchr.* II. p. 40. 44. & 45.

q *Valsalv.* in *diff.* I. p. 219. tab. 2. f. 1. 2. 3. *Mor.*

gagn. in *Epist.* XV.

r *Ibid.* n. 3.

s Non diffitetur III. *Mor- gagnus* 1. c. n. 5.

t n. 6.

u *Idem* *ibid.*

corde aortam, celebre illud os est, in magnis animalibus frequens, cujus loco in minoribus bestiis cartilaginem esse *Galenus* refert *x*. In elephanto maximum os vidit *Idem y*, sed omnino nullum nuper vir *Ill. P. Camper y**. In boum arteriosis ostiis cartilaginem reperit *J. Philippus Ingrassias z*, cum in nonnullis bobus *Aristoteles* dudum os reperiri monuisset *a*. In corde etiam bubulo, & aortæ principio versus venam cavam, idem os *Plempius* invenit *b*. Et in eo animale ab ipsa natura pendere videtur, non a morbo, cum in vituli corde amici Amstelodamenses jam officulum cum medulla repererint *b**. Duo facit, neque satis locum definit *Cl. Daubenton c*, & unice alterum retro auriculam dextram, alterum pone sinistram, sub sigmoide valvula ponit in cervo *d*. In eo animale celebrius, dudum in medicinam receptum fuit, jam *Plinio* teste *e*, etiam a *Vesalio* visum *f*, & a *Roberto Plot g*. In Alce, de

x *Administr. Anat. L. VII. c. 10. de util. part. L. VI. c. 19.*

y *Administr. l. c.*

*y** *In letter oeffening.*

z Semel os, alias cartilaginem de ossibus p. 273.

a *Hist. Animal. L. II. c. 15. & Plinius L. XI. p. 626.*

b *Fundament. medic. p. 115. Dudum Hildanus monuit de Gangrana. p. 784. deinde Michael Bernh. Valentinus Pandect. Med. Legal. T. I. p. 694. & Cartheuserus mat. med. p. 182. bubula esse, quæ pro*

cervinis veneunt, cordis officula.

*b** *Colleg. priv. Amstel. II.*

c *De bove hist. naturelle*

T. IV. p. 530.

d *Ibid. T. VI. p. 119. 142. cum ic. tab. 15. f. 4. 5.*

e *Laudat ad partum L. 28.*

n. 77. Conf. Jac. Dalechampii ad eum locum notas. Habet inter nuperrimos J. C. Rieger L. II. p. 732.

f *Cartilagineum in ostiis arteriosis L. VI. c. 20.*

g *Natur. history of Staffordshire p. 65. Conf. Döbel Jäger practica p. 14.*

cervi genere perinde repertum est. In equo, & magis proprie in tendineo arteriarum circulo, reperit Cl. *Bourgelat* *h*, & in principio magnarum arteriarum in vetulis vervecibus *Johannes de Valverde* *i*. Sed etiam homini frequenter in principio arteriæ pulmonalis, & aortæ, callus, cartilago *k*, os, aut lapideum concretum reperitur. In vetula, ad radicem magnarum arteriarum cordis, durities cartilaginea, & ossea, *Rolfinkio* dicta est *l*. In principio aortæ hectici hominis os vastissimum, friabile, cordis forma *m*. Post multas palpitaciones aorta per quatuor digitos ossea *n*. Principium ejus arteriæ frequenter ossescere monuit *Riolanus* *o* & *G. Harvey* *p* & *Guilielmus Cheselden* *q* & de senibus v. Cl. *Fischerus* *r*, & numerosa exempla alibi reperio *s*: sæpe cum per-ampla corde *t*.

Verum id os morbosum est, neque debue-

h *Hippiatrique* T. II. Part. 2. p. 433.

i *Anat.* L. I. c. 17.

k *Columb.* p. 180. in homine. Tendines arteriarum cordis frequenter cartilaginei in senibus *Lancis.* p. 41. & la *Mettrie* *Comment.* T. II. p. 295.

l *De corde* p. 28.

m *Bartholin hist.* 50. Cent. I.

n *Beck* in *disp. de palpit. cordis*, recusa in *Tom.* II. *Collectionis meæ practicæ.*

o *Vigefies* se vidisse *Riolanus* in *C. Bauh.* p. 705.

p *Exerc.* li. p. 219.

q l. c. p. 182.

r *De senio* p. 76.

s *Hist. de l'Acad. des scienc.* 1735. p. 20. 21. *Blasius obs.* 5. Part. 6. *Rhod. observ.* 63. L. III. *Commerc. lit. Noric.* 1744. hebdom. 3. *Vylhoorn* ad *Heisterum* p. 67. *Bellin de org. gust.* p. 135. *Hofman de structur. cran.* n. 17. In cane *J. Ad. Kulmus* de tendine rupto.

t In *hist. de l'Acad.* l. c. & *Bartholini observatione*, & *Fischeri.*

runt aut ante *Galenum* veteres *v*, hoc os inter partes legitimas corporis humani referre, aut nuperiores arabes *x*. Omnino enim & frictione nascitur, & in juniore cervo *y* inque juniore *y** elephanto *Moulini*, & in ovis *z* molle, per ætatem induratur. Recte adeo a Cl. viris *Vesalio a* & *Ingrassia b* de catalogo ossium corporis humani deletum est. Etiam in pulmonali tamen arteria callosam sedem supra quamlibet valvulam, jamjam in ossis naturam transituram, reperi *c*, eandemque induratum & tartaro obductam vidit *Phil. Jac. Sachsus d*, & in ea ossiculum in giganteo homine *J. M. Hoffmannus e*.

§. XIX. Cordis Fibra.

Diximus eas cordis partes, quæ ex aliis sui dissimilibus componuntur, organicas veteres dixerunt. Superfunt eæ, quæ aut simpliciores sunt, aut omnino in dissimiles dissolvi non possunt. A *fibris* autem initium facere oportet, quæ præcipuam cordis partem constituunt. Musculosæ sunt omnino, nisi velis aut *Galeno f* cre-

v Aristoteles pro cordis fundamento habuit. In elephanti corde, frustra quidem, medici Romani quæriverunt apud *Galenum*.

x Rhazes ad *Almanzorem* L. I. c. 3. 14.

y Boyle hist. firmitat.

*y** l. c. p. 29.

z Buffon T. V. p. 34.

a De radice Chinæ.

b l. c.

c Opuscul. Patholog. obs.

§1.

d Lapid. p. 100.

e De futur. cran. n. 17.

f Administr. Anat. L. VII.

c. 10.

dere, fatis quidem subtili uso ratiocinio, quod cor, resectis nervis, non perinde ut alii musculi moveri desinat, sive *Hambergero g*, qui a culina suam objectionem repetit. Rectius aucter libri *h* inter *Hippocraticos* conservati, *fortem musculum* vocavit, & natura musculorum dixit sequax *Hippocratis Celsus i*. Inter nuperos veram sententiam restituit *Nicolaus Stenonis F. k*, cum priores, & princeps *Galenus*, non crederent posse musculum dici, quod adeo manifesto, & tanta cum nobilitate visceris nomen gereret.

Etiam hoc manifestum est, cordis fibras, raro in animale exemplo, non parallelas sibi, rectasque, sed omnino ramosas & reticulatas esse, & cum sui similibus suis processibus inoculari. Inde illa difficillima musculorum lacertorum cordis evolutio, cum fibræ carneæ ubique cohæreant, neque ullum stratum nudari queat, quin plurimæ aliæ fibræ lacerentur. In toto corde lens vitrea / hanc reticulatam fabricam demonstrat, in lacertis vero, qui in cavea ventriculorum sunt, etiam nudis oculis res manifestissima est.

g *Physiolog. Med.* p. 615.
Nempe carnem ab aliorum musculorum carne differre, & minus in coquendo emolli.

h *De corde*, n. 4.

i *L. IV. c. 1.*

k *De musculi & gland.* p. 22. ed. hafs.

l *Ant. v. Leewenboeck Arcan. Natur. detect.* Epist. 52. p. 412. Ill. *Senac T. I.* p. 194. 206. *G. W. Muys de fabric. fibr. musc.* p. 367.

§. XX. *Rectæ nullæ sunt.*

Deinde, ut propius ad rem accedam, etiam hoc certum est, & per experimenta constitutum, nullas in corde fibras rectas dari, quæ a basi natæ, in mucronem eadem directione ferantur. Primus hujusmodi fibras ex brutorum anatome in humanam introduxit *Andreas Vesalius*, in visceribus fere ubique solis bestiis usus *m*, cum ad finem magni operis properans, satis frequentibus hominum cadaveribus destitueretur *n*. Successerunt in erroris hereditatem vel incisores perinde bestiis usi *o*, vel physiologi *p*, qui sua ex anatomicis scriptis potius quam ex natura receperunt, a quibus equidem Cl. olim *Hambergerus q* in situ harum partium hætenus differt, quod eas fibras & interiori loco ponat, & exteriori, transversas medias interjiciat. Verum uti ego quidem remoto adipi, quo cor humanum sæpe velatur, nihil unquam ejusmodi recti strati fibrarum simile vidi, ita neque alii a secandi peritia, & ex veri

m In utero, oculo, larynge.

n L. VI. p. 731.

o *Lomerus* bobus & ovibus usus est p. 16. 18. tab. 3. f. 2. Car. *Perrault* *Essays de Physique* Tom. III. p. 227. 230. 232.

p *Carolus Stephanus* *Anat.* L. II. c. 33. *Hannibal Albertinus*, qui perinde ut in ventriculo, intestinis, vesica,

rectas lineas ad cordis dilationem, obliquas ad contractionem requirit *de cordis affectionibus* p. 57. *J. Alphonsus Borellus* *de motu animal.* L. II. prop. 37. *J. G. Hayman* in *comment.* ad *Boerh.* T. V. p. 67. *S. Schaaër Schmidt* in *Epistola* ad *Ill. Eller.* *Chirac* *advers.* p. 250. *q* *Physiolog.* p. 41. 43.

amore perinde celebres Profectores, ullas re-
pererunt, *Stenonis* *r* inprimis filius, & nuper *J.*
Baptista Morgagnus *s*, tum quisquis famæ *Mal-*
pighianæ ultor sub nomine *Horatii de Florianis*
t latuit, & *Raymundus Vieussens* *v*, diligentissi-
mus cordis incisor, & nuper *Cl. Siegmart* *x*.
Si aliquas ejusmodi fibras in sinistri ventriculi
superficie *Heisterus* *y*, si centesimæ parti reli-
quarum fibrarum pares *Johannes Tabor* *z*, si
decem aut duodecim obscuras fibras rectas vi-
dit *Ill. Senacus* *a*, raras tamen esse visu certum
est, quæ in superficie positæ meos oculos, ad
id opus intentos fugerint, & ad magnum ali-
quod officium ipsa sua paucitate inefficaces.
Consentit nobiscum *Ill. Ludwigi* *a**.

§. XXI. Descriptio fibrarum cordis difficilis,

Quæ vero fibrarum cordis veræ series sint,
res certe dictu difficillima est: neque ego po-
tui, post macerationem, aut coctionem in ace-
to, hoc ænigma enodare, uti neque *Vesalius*
potuit *b*, neque summus anatomicus *c*, in cu-
jus peculiari schola prima rudimenta artis didi-

- r* *Epist.* 70. *Centur.* IV. *cordis* p. 33.
Bartholini. *y* *Compend. anat.* T. II, not.
s *Advers.* *Anat.* V. *anim.* 45.
14. *z* *Exerc. Med.* p. 96. fig.
t In *Epistola in qua plus-* 11. *Vituli corde usus est.*
quam 150 errores in oculorum
& mentis vigiliis demonst- *a* l. c. p. 204.
tur p. 77. *a** *Ep.* 169. ad me.
v *Neurograph.* p. 17. *b* p. 731. Negat extricari
x *De antagonismo fibrarum* posse.
c *Ill. R. S. Albinus,*

ci, primaque corpora humana secui. Difficultatem facit, quod fibræ reticulatim intricatæ *d* nullo modo separari possint, ut quidem in aliis musculis possunt, in quibus parallelæ sibi adjacent, & in quibus, si diversarum directionum strata sibi inposita fuerint, tamen supremum stratum facile de inferiori non violato removetur, ut in palato molli fit, & alibi. Deinde etiam cellulosæ fibrillæ breviores quamquam alibi, & numerosiores *e*, fibras non sinunt separare, quæ quidem fila non pauci, neque humiles anatomici *f* pro veris transversis fibris descripserunt, quæ cordis fibras jungant. Denique aliorum musculorum laceratos separant striæ conspicuæ adiposæ, quibus cultello exemptis intervalla inter eos musculos nascuntur. In corde, præter extimam superficiem, nihil simile adest, neque strata carnea interiora ullo adipe ambiuntur, quem excidere, eaque strata a vicinis aliis separare possis *g*.

Brevis ergo labor erit ea exponere, quæ ego quidem ipse vidi: fida ea, etsi minus plena sunt. Ergo fibræ cordis universæ mihi videntur obliquæ esse, ut tamen transversis pleræque quam rectis propiores sint. Oriuntur
ab

d p. 350.

e Kaauw de perspir. n. 781.

782.

f J. Jacobus Wepfer de cicut. aquat. p. 87. R. Lomwer c. 1. p. 19. tab. 3. f. 5.

J. B. Morgagnus Advers.

Anat. ll. anim. 7. J. Fantonnis l. c. p. 286. R. Vieussens nouvelles decouvertes sur le cœur p. 38. Vocat ramos intermedios, quibus ductus carnosissimi communicant.

g Conf. Senac T. I. p. 198.

ab auris dextræ sede, deflectunt per faciem convexam *b* in mucronem, & ad eandem aurem per faciem planam redeunt *i*; sed prope eam aurem inque basi plurimæ, cor crassissimum reddunt; inter basin vero & aurem earum multæ focias relinquunt, & in caveas ventriculorum tendunt, musculos internos & reticulatos lacertos earum cavearum effecturæ, unde fit, ut versus mucronem cordis carnes multo, quam prope basin tenuiores sint.

Ita vero videntur, mihi quidem, diversa strata differre, quibus cor componitur, ut extrema strata & intima obliquitatem rectæ lineæ a basi ad mucronem ductæ propiorem sequantur, mediæ inter extimas & intimas magis transversæ sint *k*. Porro in septo cordis fibræ dextri ventriculi & sinistri inter se invicem intricantur, ita tamen, ut pene sibi parallelæ sint *l*, neque ad magnos angulos se secent. Denique fibræ musculorum papillarium rectæ sunt, & a mucrone versus ostia venosa resurgunt.

§. XXII. *Ex Borello, Stenonio, Vieussenio, Lancisio, Johanne Tabor.*

Primus J. *Alphonsus Borellus* ante *Lowerum*, anno 1657. *m*, sed in bestiis, cordis fibras car-

b *Comper* l. c. tab. 36. f. 1.

i *Ibid.* f. 2. Ita fere descripsit C. *Bartholinus Thomæ* F. in *specim. anat.* p. 64.

Tom. II.

k *Comper* tab. 36. f. 4.

l *Idem* in omnibus figuris, m. l. c.

neas evolvere conatus, similia fere eorum moriens reliquit, quæ *Lowerus* docuerat, fibras nempe rectas a basi ad mucronem euntes, & in caveas ventriculorum reflexas: tum duo alia strata fibrarum, quæ ad spiræ modum ad mucronem descendunt, postquam se cum sui similibus decussarunt, & partim columnas interni cordis effecerunt, & partim ad basin redierunt.

Nicolaus Stenonis F. n non facillimam, etiam post exhibitas icones, descriptionem dedit: videtur tamen ante nuperos Viros Cl. externum fibrarum stratum posuisse, quod utrumque ventriculum complectatur: fibras etiam, quæ ventriculorum caveas subeunt, descripsit, post eum a *Pechlino* dictas o, easque, quæ circa conum reflexæ ad basin redeunt.

Raymundus Vieussens multum in his ipsis fibris laborem posuit p: in ultima q tamen & copiosissima historia multum obscuritatis ex hypothesis in suum sermonem irrepere passus est, quæ ductus carneos (ita fibras vocat) ex arteriis coronariis, earumque poris oriri ponit, & cui hactenus obsecutus est, ut secundum eas arterias fibrarum tractus describeret. Non decerpam verba Cl. viri, ex quibus certe nulla

n In L. de musculis & phia p. 18. seqq. Alterum glandulis & apud Bartholinum in Anat. tert. renov. p. 382. Nouvelles decouvertes sur le cœur in toto libello. Tertium du cœur.

o Diff. de corde n. 7.

q Traité du cœur p. 78.

p Tribus operibus, quorum primum est Neurogra-

Clara rerum imago in mentem meam transiit, quam in lectorem transmittere possim.

Paulo facilius *Lancisium* intelligo, sive ex propria industria ejus Cl. viri liber natus sit, sive ex junioris alicujus medici solertia. Ergo, secundum eum amplissimum olim Præfulem *r*, fibræ cordis extimæ a facie externa auricularum oblique, & spiræ similes, per exteriora ventriculorum ad mucronem cordis eunt, & dum descendunt, una molē crescunt. Hæ fibræ in universum corticem ventriculorum constituunt, aliquæ vero recta introrsum penetrant, & spirales fibras revinciunt. Deinde spirales fibræ, quas diximus *s*, quando ad mucronem cordis venerunt, simplici facta advolutione, internam faciem sinistri ventriculi cum valvularum musculis efficiunt, & inseruntur iterum internæ venarum & aurium fabricæ.

Mediæ *t* demum fibræ inter extimas, quæ ab iisdem nascuntur principiis, ex circularibus nempe arteriarum tendinibus & ipsis arteriis, multa strata fibrarum efficiunt, in sinistro imprimis ventriculo, alia magis inclinata, alia minus, inque easdem arterias redeunt, a quibus primum prodierunt. Quæ vero fibræ dextrum ventriculum comprehenderunt, eæ in sinistrum transeunt, ad viminum modum in septo cordis decussatæ.

Johannis Tabor v descriptionem, ad bruto-

r l. c. p. 49.

s l. c.

t p. 49. 50. tab. 4. f. 3.

v Exerc. Med. p. 96. 97.

rum animalium corda natam, & *Alexandri Stuart* x cor artificiale, ad imitandum naturæ artificium ex hypothefi fabrefactum, lubens omitto. In *Syllabo partium corporis humani*, qui Petropoli incerto auctore prædiit, duæ cordis figuræ exstant, quarum prior y fibras faciei convexæ dextrorfum verfus apicem decedentes, & alias his fubjectas pene tranfverfas repræfentat: altera z fibras faciei planæ tranfverfis proximas exprimit.

§. XXIII. Ex *J. B. Winslow*, & *Cassebohmo*.

Jacobus Benignus Winslowus alias fibras cordis angulares facit, in arcum *a* flexas alias, quarum longiffimæ & extrema ftrata cordis conftituunt, & in ventriculos fubeunt, intima pariter ejufdem mufculi ftrata *b* efficiunt: mediæ vero, fenfim breviores, minusque curvæ, verfus basin faciunt, ut ibi cor craffius fit *c*. In ejus porro Ill. Viri descriptione concursus duorum ventriculorum feptum cordis generat *d*. Ita duo mufculi nafcuntur, uti duo ventriculi funt, quos tertius mufculus comprehendit *e*. Plures fibræ cordis tranfverfim fe fecant, quam quidem fecundum longitudinem *f*. Quæ

x *Philos. Transact.* n. 460.

y *Tab.* 15. f. 1.

z f. 8.

a l. c. n. 47.

b n. 49.

c n. 50.

d l. c. & in *Memoir. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1711.

p. 512.

e *Expos.* n. 52. *Memoir.*

l. c.

f *Expos.* n. 55.

S. III. DESCR. WINSLOWII, CASSEBOHMII. 181

in ventriculi caveam veniunt, earum multæ gignunt internos illos lacertos, qui valvulas venosas retinent *g*. *Idem* vir Ill. icones, absque literulis edidit *h*, in quibus fibræ exteriores in facie convexa ita videntur interiores fibras decussare, ut hæ magis transversæ sint, illæ longitudinem cordis magis sequantur. Denique ventriculum dextrum a sinistro artificiose separavit, ut olim *Nicolaus Stenonis* F. i, & *Bartholinus* nepos *k*. Ita Ill. *Lieutaud* sinistrum ventriculum a dextro & ejus fibris comprehendi reliquit.

Winslowianæ descriptioni ea satis similis est, quam ex *J. Friderici Cassebohm*, solertissimi olim anatomici, scholis edidit *Carolus Philippus Glassius* *l*. Perinde habet fibras externas, quibus quasi cortex cordis constat, in dextro ventriculo magis obliquas, in sinistro minus. Earum aliquæ in cordis septo, eaque sede, qua rami principes arteriæ venæque coronariæ sinistrae descendunt, abdunt se in cordis carnem: aliæ ad mucronem ejus musculi veniunt, & inde reflexæ in caveam ventriculi se abdunt, fibrasque interiores constituunt, & adscendendo vel ad basin redeunt, vel in musculos abeunt, qui valvulas venosas retinent.

Inter duo hæc strata tertium medium intercedit, crassius idem & multiplex, & in

g n. 57.

h In *Memoir*, quæ citavi.

i Apud *Bartholinum* anat. circuitu n. 47.

pect. p. 106.

k *Specim. anat.* tab. 2. f. 1.

l De admirando sanguinis

multas laminas refolubile, a basi sinistrorsum & deorsum fertur, inde transversum fit: septumque cordis inprimis perficit.

§. XXIV. *Ex Petro Senac.*

Nuper denique *Petrus Senac*, Archiatrorum comes, novam plenamque fibrarum cordis historiam proposuit, de qua tantum decerpemus, quantum nostra brevitās admittit, neque ita hæc legi volumus, ut eo minus auctor ipse consulatur, cujus descriptio longe fusior & ornatior est. Orditur ab intimis.

Circa fibras reticulatas *m* sinistri ventriculi, proxime circumvolvuntur spirales *n* fibræ, quæ a basi ad mucronem, & a sinistris ad dextra excurrunt, & ramis transversis invicem junguntur. Eædem non continuæ sunt, uti nusquam equidem fibræ musculorum longe continuantur, inque multa strata, non quidem satis perfecte, se patiuntur separari *o*. Nascuntur ex ipsis columnis sive musculis papillaribus ventriculi sinistri, earumque primæ & intimæ cum axi cordis valde obliquos angulos intercipiunt: quæ exteriores sunt, eæ sensim cum eodem axi angulos efficiunt majores, & extimæ denique penitus rectos *p*, nempe extimæ omnino transversæ sunt.

m l. c. p. 194. n. 9.

n *Tab.* 8. f. 4. & f. 5. D.

o p. 195. n. 10.

p *Tab.* 8. f. 3. & f. 5. C.

His fibris aliæ *q* circumponuntur, contrarii ductus, quæ a dextris ad sinistra descendunt, &, sensim obliquiores factæ, ad magis inæquales angulos axin cordis secant, donec externas cordis fibras contingant.

Eæ *externæ fibræ r* versus basin cum interioribus continuantur, earumque aliquæ ostiis tendinosi cordis adhærent, ut tamen in tendineam naturam non satis certo abeant. Aliæ curvatae *s*, decussatae, cum fibris internis ventriculorum continuantur.

In apice sinistri thalami fibræ externæ fubeunt ipsam hanc caveam, eo modo, ut parietis sinistri fibræ & externæ ad dextram internamque cordis partem terminentur. Eædem in apice cordis stellam quasi efficiunt, & intus conspicuam, & foris *s**. Eædem fibræ, quæ sinistrum ventriculum fubeunt, columnas etiam musculofas cordis constituunt.

In ventriculo, quem vulgo *dextrum* vocant, duo sunt strata *t* fibrarum, musculis papillaribus circumvolutarum: a parte nempe inferiori septi cordis fibræ strati externi oblique versus mucronem descendunt, adtingunt incurvatae faciem cordis convexam superiorem, & in ora septi cordis terminantur.

q p. 196. tab. 8. f. 2. & T. Bartholinus anat. tert. renovat. p. 361.
f. 5. B.

r p. 197. n. II.

s p. 198.

*s** Pinxit ejusmodi stellam quantum ego quidem video.

t p. 200. n. 13. & ad tab. 7. f. 3. tab. 8. f. 1. a. a.

Alterum harum fibrarum stratum *v* oblique adscendit, versus basin, earumque aliquae in superficie ventriculi evanescent, inque linea, quae diagonalis *x* nomine digna, a mucrone ad dimidiam partem baseos progreditur *y*. Ab extremis harum fibrarum finibus nascuntur aliae, quae oblique a basi, & a lateribus, hujus lineae, quam modo diagonalem diximus, deorsum incurvae tendunt, & in alteram lineam diagonalem *z* evanescent, a qua aliae fibrae nascuntur, quae, magis ad mucronem inclinatae, ad unionem duorum ventriculorum in facie superiori, & ad ejus visceris apicem tendunt. Haec omnia hoc modo in corde certo adparent.

Septum cordis a fit ex fibris dextri thalami, & ex sinistri ventriculi fibris: ii enim ventriculi dorso convexa sibi opponunt, & in eo septo utriusque ventriculi fibrae uniuntur. Aliquae, eademque exteriores, ortae ab extremis musculis papillaribus ventriculi dextri, transeunt super ventriculum sinistram *b*. Aliae a facie dextri ventriculi, quae sinistro obponitur, originem ducunt, & sub prioribus se in textum ventriculi sinistri immittunt. Hoc modo ventriculi in facie quidem convexa uniuntur.

In facie vero plana *c* fibrae obliquae a dex-

v Tab. 7. f. 3. & 4.

x Tab. 7. f. 3. B. B.

y p. 201.

z Ibid. D. D.

a p. 202. n. 14. tab. 8. f.

6.

b p. 203.

c Ibid.

tro ventriculo in sinistrum transeunt, sub exterioribus fibris, & oblique versus basin adscendunt. Deinde fibrae externae sinistri ventriculi super oram thalami dextri producuntur, atque ita duo thalami uniuntur.

Versus basin demum cordis duo thalami per fibras uniuntur, quae a dextro in sinistrum transeunt, ut fibrae septi cordis dextrae cum sinistris misceantur.

Ad mucronem fibrae dextrae, certe aliquae, in ventriculi sinistri caveam subeunt, stellam tamen nullam efficiunt ejus similem, quae in mucrone dextri ventriculi dicta est.

Nullum ergo ejusmodi commune fibrarum stratum adest *d*, quod utrumque ventriculum complectatur, & a claris viris propositum est *e*. Fibrae vero externae in facie convexa a dextris tendunt ad sinistra *f*, in facie plana vero a sinistris ad dextra *g*, oblique utraeque, & ad spirae modum, neque satis ad aliquam constantem normam. In facie plana fibrae sinistri ventriculi paulum adscendunt, dum super dextrum thalamum transeunt. In ora superiori septi cordis fibrae dextri ventriculi supercandunt *h* sinistrum, leniter eadem versus basin curvatae, ut tamen in universum oblique ad mucronem inclinentur, & punctum flexus contrarii habeant, ut mathematica voce utamur.

d p. 240. n. 15.

g Tab. 7. f. 2.

e p. 354.

h Tab. 7. f. 1.

f p. 205. tab. 7. f. 1.

Fibrae etiam ventriculi dextri exteriores ex fasciculis carneis exterius nascuntur, & ubique fere, dum plana diversa fibrarum cordis oblique se interfecant, firmitatem eadem multo sibi praestant.

Si obscura haec videntur, neque dilucida fabricae cordis notio ex meo sermone nascitur, excusationem ab ipsius rei difficultate repetam, quae fecit, ut Ill. viri verba nitidius excerpere omnino non potuerim.

Ill. denique *Lieutaud* ita has fibras descripsit ut summam operis difficultatem ipse sentiret.

§. XXV. *Nervi Cordis. Nostra Historia.*

Aliquanto facilior *nervorum* historia est, qui cordis fibras adeunt. Etsi enim neque paratu facillimi sunt, neque in planum sermonem prompti relatu, neque fere hactenus satis plene descripti, plures tamen proprias observationes habeo. Id vero iterata excusatione indiget, quod omnino aliorum clarorum descriptiones non potuerim in unam, continuam historiam conjungere: nimis enim & inter se ipsas dissentiunt, & a meis denique differunt. Sed & id difficultatem auget, quod nervorum in universum, & horum quidem nervorum, qui cor adeunt, itinera ramique miris modis magnaue varietate in corporibus humanis lu-

dant, ut etiam meas, ab alienis omnibus segregatas, observationes in unicum sermonem unire fere supra meum ingenium fuerit. Hactenus autem credidi, me hos meos labores li- quidius enarraturum fore, si unicam in descrip- tionem meas quidem observationes omnes col- ligerem, deinde ea subjungerem, quæ alii cla- ri viri aut aliter a meis proponunt, aut meis addere videntur.

Ex numerosis ergo cadaveribus comparatam descriptionem, brevem equidem, nervorum primarii hujus musculi dabo, cui iconem lu- bens adderem, me præsentē & ad difficile opus discipulum excitante, a Cl. *Andersch* Gottingæ paratam, additamque disputationi *i*, quam de his nervis solertissimus juvenis præparaverat, infelix yero morbus vetuit edere. Eam ico- nem sub oculis habeo. Multa equidem in hac fabrica varietas est, præcipuos tamen ramos, & constantiores recensabo.

In dextro ergo latere nervus *supremus* aut *superficialis cordis*, oritur primario ex ganglio cervicali supremo *k*, cujus radices, & maximæ & numerosiores, ex nervis sunt cervicalibus, a primo *l*, a ramo inter primum & secundum

i Prostat hæc tabula in II. *Asche* de primo pari ver-
Nov. Comm. Soc. Roy. A- vorum cervicis f. 3. 4.
cad. Gott. T. II.

l Ibid. f. 4. Sigma maj.

k Tab. art. max. in Fasc.

communicante *m*, secundo *n*, & tertio *o*: aliqua tamen etiam pars a cerebro, aque mistis quinti paris *p* & sexti *q* propaginibus accedit. A nono aliquando nervo, aque octavo *s* demum, aliorum ad experimenta, aliqua medullæ penus ad hoc ganglion advenit, quod alibi copiosius descripsi. Ex eo adeo ganglio prior radix *t* nervi cardiaci supremi provenit. Accedit altera ex plexu *v*, quem nervi molles, ab eodem ganglio nati, cum pharyngeo octavi paris ramo, cumque laryngea ejusdem paris propagine, committi componunt. Idem carotidis externæ ramos sequuntur, inque ea arteria proprium ganglion efficiunt *x*, qua truncus in cerebralem ramum & facialem discedit. Vidi eundem cardiacum nervum a solo octavo pari prodire, ut radicem aliam truncus ederet aliam nervus laryngeus, ab eodem trunco natus. Aliquando omnino nullus nervus cardiacus supremus adest, ejusque locum subplet juncta ex trunco intercostali & ex ganglio thyreoideo propago.

Quando adest, & adest utique frequentius, tunc descendit secundum thyreoideam glandulam, & asperam arteriam, dat furculos hyo-

m *Asche* ibid. 2. f. 3. mi
III. *Mekel* f. 1. 98.

n Ibid. Tab. *And.* e. b.
Asche f. 3. xi.

o Ibid. betha, gamma,
delta.

p III. *Mekel* de quinto pa-
re in omnibus figuris.

q Idem. ibid.

s Per aliena experimenta,
non mea. Habet *Vieußens* tab.

23. p. q. III. *Mekel* l. c.
95. ex unica observatione.

t Tab. *And.* m.

v Vide *Fascic.* II. art. ma-
xill. int. not. ff.

x Ibid. & diff. cit.

thyreoideo aliquando musculo, alias thyropharyngeo & cricothyreoideo, & thyreoideæ glandulæ, & ramulo aliquo plerumque, aut pluribus ramis, cum recurrente octavi paris propagine communicat, aut vicissim ab eo recurrente ramo radices accipit: est tamen, ubi nihil cum eo nervo commune habet. Ejus fines continuo dicemus.

Sed alii etiam in cervice ad cor nervi abeunt. Truncus nempe intercostalis ex ganglii equidem cervicalis supremi ima *a* parte descendit, & nonnunquam ramum octavi paris accipit, alias vero, & frequentius, a tertio *b* quartoque & quinto cervicalium pare. Deinde ad quintam fere colli vertebram, aut aliquanto inferius *c*, supra arteriæ thyreoideæ inferioris præcipuum truncum, qui cognominem glandulam adit, aut certe proxime infra eam arteriam, ganglion constituit, quod *cervicale medium* *d* plerumque dixi, nonnunquam a vicinis, *thyreoideum*, minus equidem supremo cervicali, perinde tamen constans. Id in colli musculo recto majori positum, a quarto quintoque cervicalium nervorum, aque phrenico trunco radices accipit, majores, quam quidem ipse intercostalis nervus eo loco est, & thyreoideam arteriam varie amplexas. Vidi etiam duo ejusmodi ganglia sibi vicinia, variisque

a Tab. And. r. Fasc. II.
tab. art. thy. inf. ant.

b Fascic. II. T. T.

c Multo inferius in T. And.

d Fascic. II. l. c. ypsilon,
 Tab. And. ypsilon, omega.

nerveis funiculis inter se conjuncta invicem; eorum inferius ponebatur ad sextam septimamque vertebram colli in longo musculo, ad interiora arteriæ vertebralis. Etiam hanc arteriam hujus ganglii rami tamquam laquei amplectuntur.

Ab eo nunc medio cervicali ganglio varii rami cor adeunt. Et primo aliqui, unus alterve, adeunt nervum cardiacum supremum *e*, qui cum nervo recurrente eo loco communicat *f*. Videtur tamen, ex diametrorum ratione, a cardiaco supremo potius nervos de recurrente ad œsophagum euntes augeri, neque vicissim a recurrente ad cor quidquam *g* hic mitti. Est, ubi nulla ejusmodi cum recurrente nervo anastomosis locum habet. Hi porro rami, supremus nempe cardiacorum, alterque, nunc expositus, in plexum intricati *h*, quem nonnunquam proprium ganglion *i* distinguit, porro ad cor ramos suos mittunt. Eorum dexterrimi ante aortam arteriam descendunt *k*, cum sequentibus irretiti, & partim in aorta sub dextræ subclaviæ ostio manere videntur, & in pericardio, partim ad cardiacum plexum principem se in aortæ inferiori sine *l* admiscunt, & partim comites se dant arteriæ coronariæ dextræ, cum sequente fasciculo misti, quem magnus plexus

e Tab. And. x. y. 1.

f Conf. ibid. 20.

g Ibid.

h Ibid. u. z. 1. 2. y. x.
9. 8.

i Ibid. 2.

k Conf. fascic. II. pfi, Pfi maj.

l Ibid. Pfi maj.

edit. Sed etiam a trunco octavi paris, ad tertiam colli vertebram, aut aliquanto inferius, ramus prodit, qui vel auget cardiacum supremum, vel etiam seorsim parallelus ad cor properat.

Verum ab eodem cervicali medio ganglio alius ramus ad cardiacum supremum accedit, cumque eo conjungitur. Augetur idem una, altera radice, a ganglio cervicali infimo prodeunte, & descendit a carotidis dextræ cum subclavia confiniis, advenit ad asperam arteriam, recipit non raro a recurrente furculum unum alterumve, unitur cum uno, pluribusve nervis cordis infimis, emittit & ipse furculos tenues, qui in aortæ trunco, inque ejus membranis finiri videntur, & in pericardio; trunco vero suo venit ad anteriora arteriæ pulmonalis dextræ, retro aortam, mollescit, duobusve aut pluribus furculis cor cum arteriæ coronariæ dextro trunco ejusve ramis adit, quos sequitur, idemque auriculæ dextræ propagines nerveas impertit. Cum his cardiacis dextris ramis aliqui a sinistris advenientes miscentur, & vicissim aliqui dextrorum ad sinistros cordis nervos se socios addunt, varie in boncho cum iis implexi, qui est primarius cardiacorum ramorum plexus. Horum porro dextrorum nervorum, in eum plexum commistorum, aliqui coronariam sinistram, & sinum ejus lateris ad-eunt, misti cum recurrente ramo, nervisque sinistris. Alii retro arteriam profundiori loco ad sinistram sinum, ad venæ cavæ usque ostium, faciemque planam cordis veniunt.

Porro ganglion cervicale medium duos emittit ramos, qui intercostalem truncum continuant. Eorum *anterior* *p* alter minorque, ante subclaviam arteriam pergit, adque initia nascentis mammariæ arteriæ in thoracem venit. *Profundus* alter *q* idemque major, retro arteriam subclaviam descendit, non rarissime peculiari ganglio donatus, & præterea celebre *ganglion cervicale infimum* *r* constituit, quod inter longum colli musculum, arteriam vertebralem adfidentem, processum transversum primæ dorsi vertebræ, costamque primam, supra limitem supremum pleuræ ponitur, latum, breve & multiforme. In id ganglion a sexto, septimo *s* octavoque *t* cervicalium, & primo *v* dorsalium, & secundo, radices firmæ, & insignes accedunt.

Ab eo nunc ganglio, ave profundo intercostali trunco, qui id ganglion format, nascuntur *nervi cordis infimi*, mollesque. Eorum aliqui, cum recurrentis & vagi nervi ramis irriti, pulmonalem arteriam venamque sequuntur, exigui, pulmonis anteriores nervuli. Plerique vero accedunt ad bronchum, cumque nervis a ganglio cervicali medio jam deductis uniuntur, inque præcipuos nervos cordis, unum alterumve abeunt, qui *x* plexum, cum

car-

p Tab. And. 91. 92.

q Ibid. 95.

r Ibid. 78. *Vieussens* l. c.

32. 37.

s Tab. And. n. 80.

t 79. 81. 82. 83.

v 84. 85.

x Ibid. 26. 27.

cardiaci principis propaginibus, in asperæ arteriæ ramo sinistro, aut paulo superius ad dexteriora arteriosi ductus constituunt, a quo nervi & dextri cordis porro, uti dixi, oriuntur, & sinistri aliqui, perinde citati.

Sinistri lateris nervi dextrorum fatis similes sunt. Supremum cardiacorum hic non vidi defuisse. Ejus similis historia est, qualem in dextro latere descripsi. Partim nempe in aortæ superficie manet & consumidetur *y*. Parte alia dexteriori loco, cum ramis dextris mistus, ante aortam primarium coronariæ sinistrae ramum adit *z*, & ad cor cum eo per septum dividitur, cum ramis plexus principis cordis unitus; dextræ etiam arteriæ coronariæ truncum majorem alias perinde sequitur. Reliqui furculi circa ductum arteriosum se in cordis plexum majorem demergunt *a*.

Alii nempe nervi a ganglio supremo, a medio, & ab imo nati, retro aortam advenientes, cardiacorum principes, componunt plexum cardiacum magnum *b*, in superficie anteriori ramus sinistri arteriæ asperæ positum, retro aortam, supra pulmonalem arteriam, ad dexteriora ductus arteriosi, non sine admittis dextri lateris ramis, quos citavimus *c*. Ab eo plexu, perpetuo, tribus itineribus nervi cordis ad suos destinatos fines pergunt. Unus alterve & re-

y Ibid. 21. 22. 23.

z 24.

a 16.

b 12. 13. 14. 15. 18. &c.

c 26. 27.

trō arteriam pulmonalem, & ante eam advenit, ad nervos coronariæ dextræ focios, cumque iis mistus cor dextrum adit. Aliqui, reliquis majores, incedunt retro aortam, dextri lateris ramis retro eandem principem arteriam advenientibus aucti. Hi sunt, quos inter utramque magnam arteriam comprimi non est visum inprobabile. Eorum nunc aliqui, trans aortæ superficiem, ad coronariam dextram arteriam veniunt, implicati cum iis, quos ea via incedere continuo scripsimus. Plerique vero ad coronariam arteriam sinistram tendunt, porroque ejus arteriæ anteriorem ramum comitantur, faciemque cordis superiorem adeunt: alii cum ramo posteriori ad faciem cordis cavam, & auriculam sinistram, numerosi tendunt, cujus radicem legunt. Alii ramos, cum octavo pare mistos, ad anteriorem pulmonis faciem emittunt. Alii & ante arteriam pulmonalem, & retro eam, cum dextrorum aliquo etiam ramo conjuncti, posteriori loco, quam reliqui cordis nervi, arteriam coronariam sinistram, & cognominem ventriculum adeunt. Alii denique ab eodem plexu nati, retro arteriam pulmonalem, ad sinum sinistrum faciemque cordis planam tendunt, cum nervis a recurrente natis, aliisque supremi cardiacorum furculis commisti. Omitto eos ramos, quos idem plexus œsophago dat, & asperæ arteriæ, & aortæ membranis.

Ab octavo pare in sinistro pariter latere rami & ad plexum cardiacum magnum *d*, & ad

superficiales aortæ intratos *e*, & retro aortam in plexum, quem dixi *f*, & ad pulmonalia vasa & pulmonem tendunt *g*.

Tres ergo præcipuæ origines sunt nervorum cordis, ganglion nempe cervicale supremum, medium, & imum: tres etiam nervorum fasciculi, quorum maxime quidem conspicuus ante magnam arteriam advenit: medius, idemque majoribus factus funiculis, inter duos grandes arteriarum truncos ad faciem cordis convexam tendit: postremus denique retro pulmonis arteriam ad faciem planam sinumque sinistrum pergit.

§. XXVI. *Nervi Willisii, Vieussenii.*

Veteres parum omnino hic præstiterunt. *Vesalius* unicum *h* nervum cordis describit, ab octavo pare, ut nunc loquimur, editum, ut omnino in posterioribus scriptis *i Fallopii* *k* consilium miratus sit, qui plures cordi nervos tribuat. Sed iste quidem Vir Cl. ab octavo pare, sub recurrentis origine natos ramos, a nobis pariter citatos, & in plexum sub carotide prodeuntes habet, ex quibus ad cordis basin nervi veniant, quæ verâ quidem, cæterum non satis

e 15. 17.

f 32.

g 35. 34. 33.

h p. 508. 524. L. VI. f. 6. 154.

i In examine observat. *Fal.*

lopii p. 108.

k *Observ. Anat.* p. 152.

plena sunt. *Thomas Willis* divitem & laboriosam historiam nervorum cordis dedit, multaque utiliter monuit: in homine nempe plures ramos ab intercostali nervo cor adire, & pauciores *l* ab eo trunco in brutis animalibus advenire, quorum cor fere ab octavo pare suos nervos habeat. Verum, uti idem in plerisque suis scriptis bestiis usus esse videtur, ita aliqua habet, quæ vix ab homine harum rerum gnaro fidem impetrant, uti duo octavi paris ganglia *m* nunquam mihi visa: veram tripartitam aortam adscendentem, & alia a consuetudine humani corporis fabrica aliena. Quare ejus quidem viri descriptionem omitto repetere.

Plura similia nostrorum, quam quidem reliqui profectores, *Vienssenius* habet, solis alioquin hominum cadaveribus ad suam nervorum historiam usus. Ergo, in splendida systematis *n* nervosi pectoris & abdominis tabula, nullum in dextro latere a ganglio cervicali supremo nervum ad cor deducit; & a medio ganglio cervicis, eo in latere, primos nervos cardiacos derivat, omnino, ut ego quidem vidi, & descripsi. Eum nervum ad arteriam coronariam dextram, & ad cor recta ducit, cum ramo magni plexus cardiaci conjunctum *o*. Ita porro ramum *p* ab octavo pare sub recurrentis origine ortum describit, qui & magnum plexum

l De cerebro & nervis p. *phiae*.
 164. *o* Ibid. 36. 37.
m Tab. IX. G. G. K. K. K. *p* l. c. 5.
n Tab. XXIII. Neurogra-

adit *q*, & aurem dextram, quam, circa ostium venæ cavæ superioris, circumit *r*. In sinistro etiam latere habet nervum cardiacum supremum, nonnullis fibrillis cum octavo pare mistum *s*, & ad cor pergentem. Habet etiam furculos ab imo cervicali ganglio natos, medium enim, sive thyreoideum ganglion omittit: imum vero in duo ganglia dividit *t*. Hujusmodi duos furculos enumerat, qui retro aortam incedunt, & plexum cardiacum constituunt *v*, a quo aliquæ fibrillæ ad dextram coronariam arteriam, & ad dextrum ventriculum eunt, aliæ vero sinistram aurem ambeunt *x*, aliæ cum arteria coronaria sinistra ad cor descendunt *y*, & aliqui denique furculi sinum sinistram, quantum ego quidem intelligo, adire videntur *z*. Denique a recurrente trunco ramum derivat, qui & magno plexui cardiaco miscetur, & alio ramo ventriculum sinistram adit. Adparet virum Clar. pleraque nostrorum similia habere, nimis tamen paucos nervos, & nimis simplices delineare, solo cardiaco plexu excepto, quem utique maximum depingit. In gangliis viri diligentiam, aut fortunam desidero.

§. XXVII. *Lancisii, Winslowi, Waltheri.*

J. Mariæ Lancisii descriptiones & icones om-

q l. c. 6.
r l. c. 10. 12.
s l. c. 29. 30.
t l. c. 40. 39.

v l. c. 43. 44. 45. 47. 48. 49.
x l. c. 46. 53.
y l. c. 49.
z l. c. 48.

nium maxime & a nostris, & ab aliorum anatomicorum observationibus differunt. Tres nervos vir Ill. *a* ab intercostalis trunci supremo ganglio, valde conspicuo & plexuoso nimisque fere ramis divite *b*, derivat. Alios deducit ab ejusdem intercostalis trunci duobus gangliis cervicalibus imis; duo enim ejusmodi ganglia facit, (& omnino non rarum est, duo esse) crasso funiculo subrubro, quasi angustiori isthmo conjuncta. Ab iis gangliis creberrimos nervos ad cordis plexum deducit *c*. Porro a phrenico trunco & ad aurem, & ad ventriculum dextrum *d* ramos derivat, & circulum quemdam nervi phrenici dextri & sinistri circa pericardium depingit *e*, ex quo rami venam cavam inferiorem adeant. Ejusmodi nihil unquam vidi, neque quisquam alius vidit. Ita neque octavum par *f* ullo modo principe suo trunco plexui cardiaco inferi potest. Neque a cervicali primo, sive decimo pare, unquam furculus provenit, quem ait vir Clar. cum arteria vertebrali per canalem processuum transversalium colli omnium descendere, in ganglion cervicale infimum se inmittere, & nervos ad pericardium & plexum nervorum cordis *g* edere, Etsi eum enim nervum Clari viri adoptaverunt, nihil

a Inprimis *tab. 7.*

b c. a. p. 75.

c l. c. g. k. & p. 75.

d Tab. 7. l. l. & p. 75.

e Ibid. p. p. & p. 75. 77.

f In tab. 7. & tab. 4. f.

i. & f. 2. Q. q. Plexum tamen cardiacum, qui ductui arterioso vicinus adidet, expressit ad H.

g p. 75.

tamen simile in corpore humano reperiri, quantum sufficit, ostensum est *h* a *Georgio Thoma Asch*, clarissimo medico, & olim nostro auditore. Qui vero nuper ejusmodi vertebralem nervum dixerunt, ad cor tamen non duxerunt *h**. Denique alii rami a tertio quartove parte cervicis nati *i*, & per venam cavam superiorem, & auriculam dextram ad cor tendentes, aut rami ganglii cervicalis medii sunt, aut omnino quid sint, ignoro.

Apud *Jacobum Benignum Winslow* nervi cordis enumerantur, quos hic recenseo. Ramus supremus cordis *k*: ramus octavi paris rarior, quem depictum dedi *l*: ex ganglio cervicali imo bifido *m* (non medio) ortus ramus cordis medius unicus *n*: Plexus cardiacus, quem *gangliiformem* vocat, ortus a ganglio cervicali imo *o*: nervi cordis profundi *p*, si recte Cl. virum intelligo. Breviter hæc omnia recenset, uti quidem compendii anatomici ratio postulat.

Augustinus Fridericus Walther q ganglia cervicalia tria perinde numerat, ut nos quidem solemus. Cardiacos nervos tres dextros maiores, neglecto supremo *r*, ab imo ganglio cervicali, & a nervo octavi paris in plexum

h In diff. de prima parte medullæ spinalis p. 25. not. k.

*h** *Sabatier anat.*

i p. 75.

k *Exposit. Anat. T. III. tr. des nerfs* n. 378.

l n. 379.

m n. 381. 382.

n n. 386.

o n. 389. 890.

p n. 388.

q In progr. primo quo pars vagi & intercostalis investigatio continetur Lips. 1733.

r Nam eum ad posticum mediastinum ducit.

committis derivat, a quo etiam plexu pulmo furculos accipiat. Sinistros accepto a dextris ramo partim alium plexum ait constituere, alios vero ramos cum recurren- te commu- nicantes, in eundem cardiacopneumonicum plexum terminari. Solet autem vir Cl. difficili- ori dic- tione uti.

§. XXVIII. *Senaci, Tarini, Schmiedelii.*

Vir Ill. *Petrus Senac* multo brevior in hac parte historiae cordis fuit, quam quidem in reliquis, numerum etiam nervorum exiguum, & imprimis in figuris paucissimum proposuit. Describit autem plexum nostrum *s*; deinde pro- prii alio plexu numerat rete nervorum, qui inter duos truncos *t* arteriosos maximos cor adeunt. Idem recenset nervum cardiacum su- premum sinistri lateris, ejusque furculum aor- ticum *v*: tum alium *x* ab octavo pare natum, qualem etiam depictum *y* proposui; alium a re- currente nervo in plexum cardiacum mistum *z*; alios, a nobis pariter dictos, ab octavo pa- re sub recurren- te ramo ortos nervos: alios a ganglio cervicali inferiori prodeuntes: nervos ante aortam descendentes *a*, alios retro eam *b*

s l. c. p. 224. & n. 2. tum p. 493. & Tab. 5. f. 5. ut- cunque.

t Ibid.

v p. 224.

x p. 225. tab. 5. f. 4.

y In tabula arteriae thyreoideae inferioris priore.

z Ibid. f. 3.

a Tab. 5. f. 1. *a*.

b Ibid. f. 2. c. d, e, f. 4. d.

arteriam deorsum tendentes : nervum cardiacum medium *c*, a medio ganglio productum.

Porro Cl. *Petrus Tarin d* habet nervum cardiacum, a laryngeo octavi paris ramo natum, & cum nervis cervicalibus *e* conjunctum, cumque furculis ganglii cervicalis supremi, & ramulis pharyngei ex vago pare nervi nati: habet ganglion in carotide arteria minimum, fere quale descripsi *f*: deinde nervum ab octavo pare ad aortam, pericardium & cardiacum plexum *g* euntem: nervos ab octavo pare alios ad plexum cardiacum & auriculam dextram missos: ganglion cervicale medium, cum nomine equidem inferioris: nervos ab eo ganglio natos, a dextro latere & a sinistro, in plexum cardiacum coeuntes, quæ quidem omnia cum nostris observationibus apprime consentiunt, &, nisi quidem meis nimium tribuo, cum ipsa natura conveniunt.

Nuper vir Cel. *Casimirus Christophorus Schmiedel h* recensuit nervum longum a supremo ganglio cervicali intercostalis trunci natum *i*; in plexum cardiacum inmissum: ganglion adsidens arteriæ thyreoideæ *k*, indeque pariter natum

c p. 226. Videntur quidem Ill. viri verba significare, nervum cardiacum sinistrum non a ganglio cervicali imo oriri, sed a medio. Verum utrumque ganglion nervos ad eor mittit, & infimum quidem magis numerosos.

d *Anthropotomie* p. 286. & 310.

e p. 287. 310.

f *Disp. de vera nervi intercostalis origine* n. 17.

g p. 305.

h In *diff. qua quædam de nervo intercostali notantur* Er-lang. 1754.

i *Ibid.* n. 5, 7.

k n. 8, 9.

nervum cardiacum *l*: ramos cordis finistros; alium superficiei propiorem cum pulmonicis communem, cumque arteria pulmonali ad ventriculum dextrum tendentem *m*: alium profundum, inter duas magnas arterias deorsum ductum, & cum ramo cardiaco vagi parís coeuntem, adque auriculam sinistram & cor sinistrum inpensum *n*. Dextrum ramum cardiacum ab intercostali trunco fere minorem describit, cum octavo pare communicantem, in aortæ superficiei confutum, aut certe in pericardium & truncos vasorum majores *o*. Hæc iterum similia sunt superficialis nostri, & magni plexus.

His post primam additionem addi possunt, quæ in posthumis *Josephus Guichard Duverney*, & in disputatione anni 1772. vir doctiss. *Adolphus Murray* de his cordis nervis dederunt. Demum non possum *Portalii* nervos omittere, quos icone illustraverit, nostrasque & *Senaci* descriptiones incompletas vocet. Duos esse plexus, *superiorem* majorem, inter duos bronchos positum magis ad sinistra: dare ei broncho furculos *o**, tamen ut alius sit aliisque. Esse ubi fere a solo octavo nervo fiat.

Inferiorem plexum & minorem imponi basi cordis ad latus radices magnarum arteriarum, magis in sinistris. Oriri a nervis ple-

l n. 10.

m Ibid.

n Ibid.

o Ibid.

*o** Ad *Lieutaud anat.* p. 651.
T. I. g.

xus superioris, qui rami coronarias arterias ambeunt o**.

Alios nervos super magnas arterias spargi o***. In dextro latere ramos a laryngeo nervo octavi paris, a trunco octavo sub clavicula, a cardiaco superiori intercostalis ramo, a recurrente dextro, ab octavo sub eo nervo nasci.

In sinistro latere ab octavo prope glandulam thyroideam nervum venire, cujus furculus alter in aortam spargitur, alter pulmonem adit & cor. Tum a recurrente sinistro flabelliformum ramum prodire, ad plexum magnum; in faciem superiorem ventriculi, & alium posteriorem in aortam.

Ramos aliquos plexum superiorem perficere, alios super nervos incedere, venasque cordis, serpentino ductu. Porro alios ramos octavum par dare ad aurem sinistram ejusque venas.

Intercostalis nervus dat nervum superiorem prælongum a laryngeo furculo natum, sub aortæ arcu transeuntem, conjunctum cum ramis ganglii vertebralis inferioris, euntem ad plexum superiorem. Non constantem esse o†.

Alius nervus, ex media cervice aut inferiorius natus, recipit ramum paris octavi, descendit, in fila dividitur, posteriora ad magnum plexum, anteriora ad magnas arterias o††.

Iterum a ganglio cervicali inferiori furculus it, multos abeuns in ramos, quorum aliqui cum

o** p. 652. T. I. g.

o*** T. I.

o† p. 653.

o†† p. 654.

recurrentis furculis conjunguntur, etiam alio modo ludens.

Truncus sinister intercostalis fere similes dextro, furculos dat, tantum ut sinistrum ramum fere antrorsum, dextri retrorsum eant, sinistri inferius oriantur, cardiacus superior fere ex medio collo nascatur ejus unus ramus inter duas arterias magnas cor adeat, furculus pulmones o†††.

A ganglio cervicali ultimo furculus etiam a primo dorsali accedit. Hæc *Portalius*, quæ pleniora nostris videtur existimare. Multa nos aliter vidimus, superiorem cardiacum plerumque in sinistro latere supremo loco, multo pluribus ramulis conspicuum; ex ganglio cervicali *medio* ramos alii ordine, denique non omnes sed multos, ex imo.

§. XXX. *J. Ernesti Neubauer, Nervi dextri.*

Hunc egregium virum nuper amisimus o††††. Pleraque cum meis fatis consentiunt, quorum ecce compendium.

Nervus cardiacus superficialis raro ex solis nervis mollibus, plerumque ex ganglio cervicali superiori, conjunctis cum molli furculis, & ex aliis nervi intercostalis ramis in collo natis, etiam cum ramo ex thyreoideo ganglio prodit, commistus cum ramis ab eo ganglio cardiacis, trans subclaviam arteriam it, in ea potissimum

finitur, ramis nonnunquam in plexum cardiacum datis.

Ganglion cervicale medium nervi intercostalis ramos ad plexum cardiacum emittit, aliis cum nervo cardiaco superficiali communicat, & nonnunquam principes cordis nervos constituit.

Ganglion cervicale infimum cum recurrente communicat, & cum superficiali cardiaco; sed potissimum principem cordis plexum constituit, tantum ut in ramorum numero & situ ludat, tum ganglion thoracicum primum auget. Plexus ipse inter duos magnos arteriarum principum truncos ponitur.

§. XXXI. *Nervi nobis ignoti.*

Rariores esse persuadeor, quos ego quidem nunquam viderim, nervos ad tertiam quartamve costam ortos, qui ramis ad gulam datis, canalem Botalli supergressi, cor adeunt, a Cl. viro J. *Zacharia Petsche* descripti *p*. Ea quidem sede, secundum totam pectoris longitudinem, furculi a nervo intercostali nascuntur, & versus vertebrae tendunt, quorum finem nunquam adtigi. Minus pene fidei aliis cordis nervis praestiterim, quos Cl. olim academicus *Hunaud q* a magno plexu mesenterico, in ipso abdomine abscessisse, & per foramen venae cavae in thoracis caveam regressos, in dex-

p In diss. saepe laudata n. 104. *q* *Hist. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1734. n. 4.

tram aurem venisse scribit. Eosdem credo a *Lancisio r* intelligi, quando a plexu renali ad venam cavam inferiorem nervos deducit. Nullos certe furculos ad cor redire vidi; cum sollicite nervos transversi septi a gangliorum semilunarium conjunctione natos persequerer, etsi eorum plurimi foramen venæ cavæ prætereunt, quos tamen in carnes ejus, quod dixi, septi tendere inquirendo reperi. Ita neque Ill. *Seniacus s* hos nervos confirmavit. Habet tamen simile quid *Portalius*, nervum natum supra diaphragma, ab intercostali, unum alterumve *s**.

§. XXXII. *Cordis Arteriæ. Earum Origo.*

Arteriarum cordi propriarum sive *coronariarum* multo, quam nervorum facilior est historia, etsi minime absque controversiis est. Et primo de earum origine plurimæ, & physiologicæ omnino lites agitatae sunt. Verum ego quidem constanter & abunde eam originem altiore, sive a corde remotiorem reperi, quam sinus est valvulae anterioris & posterioris *t*, in quo sinu alii Cl. viri eas arterias aiunt oriri. Plurimis nunc experimentis hæc abunde confirmata habeo, ut eo confidentius & veram hanc legem & perpetuam esse statuam. Nam primo

r p. 77. tab. 7.

s In opere de corde.

*s** p. 655.

t Dextram & sinistram numerat *Morgagnus Epist. XV.*

n. 8. obliquitas autem aliqua facit, ut non valde a nostris dissentiat. *Vesalius* posteriorem & dextram l. c. p. 486.

in cadavere non facile est, valvulosum velum ita extendere, ut arteriarum coronariarum originem protegat, unde factum est, ut ab optimis scriptoribus, & in icone *v*, & in descriptione, etiam consideratis contrariis argumentis, hæc origo supra eos sinus ponatur. In vivo animale eo minus valvulas ea ostia adtingere, aut claudere, probabile est, quod in iis animalibus manifestum sit, & aortam, & alias arterias, dum a sanguine replentur, longiores reddi *x*, atque adeo valvulas eo minus coronaria oscula protegere, quod ea in cordis systole, una cum aorta, a corde recedant; cor vero interea valvulas, quas producit, omnino retineat *y*. Deinde, cum callosa linea alba *z* superiorem finem sinus valvularum, totumque per aortam arteriam circulum circumeat, eaque linea in fenum corporibus manifestior sit, & demum procul dubio a confrictione oræ liberæ valvularum nascatur, quas contra aortæ parietem sanguis ex corde expulsum advenit; is callosus anulus utique sub ostiis arteriarum coronariarum est, mediusque inter valvularum si-

v Eustachius tab. 16. f. 1. *Senac* tab. 13, f. 1. 2. *Trem.* *Commerc. Litt. Noric.* 1737. hebdom.
x J. D. Santorinus observ. anat. c. 8. n. 6. J. Ad. Thebesius l. c. p. 23. J. Wilhelmus Albrecht in parænesi ad discipulos & docentes p. 7. Petrus Senac l. c. p. 218. & 365. Hl. Trem. l. c. Ple-
 rumque ita se habere Morgagnus auctor est *Advers. Anat.* V. p. 37. 38. *Epist. Anat.* XV. n. 11. & frequenter, cæterum dissentiens a nobis, *Lancisus* p. 294. nov. ed.
y Second Mémoire sur le mouvement du cœur Exp. 47. 48. 56.
z p. 346.

nus & ea ostia intercedit. Iterum, si valvulæ aortæ arterias cordis proprias tegerent, sequeretur necessario, ut hæ arteriæ alio, quam reliquæ totius corporis animalis arteriæ, tempore suum sanguinem acciperent. Nempe in ea hypothefi, quam convellimus, sanguis ex corde prodeuns valvulas semilunares contra aortæ parietem adprimeret, ostia arteriarum clauderet, de quibus sermo est, eas præteriret, & reliquos repleret aortæ ramos. Ita fieret, quod omnino Ill. viri *a* fieri voluerunt, ut arteriæ cordis non ex ventriculo sinistro, sed ex aorta retrogradum sanguinem accipiant, & adeo pulsant, aut percussæ altiore sanguinis saltum edant, quo tempore aorta contrahitur *i*, cor vero dilatatur.

Nunc horum omnium contraria fiunt, & primo, si in venam umbilicalem fetus sebum impuleris, ut sæpe in fetu & homine nuper nato solebam, utique ventriculus sinister repletur, & una coronariæ arteriæ, quas nullæ valvulæ obtegunt. Deinde, si in vivo animale salientes arterias accurate contemplatus fueris, manifesto videbis, omnes una, & paribus temporibus, aortam, atque carotidem, in exemplo, & coronarias salire *b*. Cl. etiam *Spalanzanus*

a R. Vieussens traité du haave Inst. rei med. d. 183. cœur p. 76. Christianus Stroem &c.

b Vidit etiam J. M. Lammalys p. 38. J. Ad. Thebesius de circulo sanguinis in Cl. Starke de reliquis instrumentis quibus sanguis in circulum agitur.

lanzanus in suis minutis animalculis vidit, vasa cordis in ejus systole repleti, in diastole evanescere. Nobiscum sentit, quem honoris causa nomino, Cl. *Sabbatier* *b**.

Nuper Cl. *Mieg* & a corde has arterias repleti docuit, & ab aorta, cujus sanguis retrorsum versus cor nitatur; huc puto referas, quod etiam in diastole cordis coronaria percussa saliat, equidem debilius. Verum si in spirante bestia arteriam aliquam cordis lanceola percusseris, iterum absque ullo dubio videbis, ut ego sæpe vidi *c*, aliique ante me Ill. viri *d*, altius, & cum impetu, sanguinem de eo vulnere subfilire, quando cor contrahitur, molliter vero delabi, quoties cor se remisit, & aorta nunc arctatur. Addito, non abs re, omnino non esse contractæ arteriæ eam vim, eumque impetum, quo natura sanguinem in ramos conicos propellere velit.

Qui contra ex valvularum sinibus eas arterias oriri, aque earum velis operiri scripserunt, neque pauci cæterum, neque contemnendi viri *f*, aliqui etiam propriis experimentis

*b** Clar. vir *Achilles Mieg*. *thèses*. 1776. *En de cause motum cordis*

c *Second Memoire sur les parties sensibles & irritables* *Exp.* 502. 542. 543. 544. *alternum producente, in eadem collectione disputationum*

d *Jos. Exuperius Bertin* in *thesi* Parisiis 2. 1740. *proposita, & in meæ collectionis* *Portalius* p. 443. & in *icone* *f* *J. Fantonus* l. c. p. 306.

T. II. recusa, cui titulus: Abrahamus Kaauw Boerhaave *de perspirat.* n. 637. 758. *Jos.*

Ergo causa motus alterni cordis multiplex. Jacobus Theodorus Baron in *thesi* a. 1743. *Lieutaud essays anat.* p. 234.

in hæc verba defensa, & pariter a nobis recusa, *Giering* in *select francofurt.* *Tom. IV. Part. 1. & in equo*

Ergo dum contrahitur cor dilatan- *Cl. Bourgelat hippiatricque T. II, P. II, p. 449.*

contrarii g, eorum plurimi hpothesin habuerunt, quam ornarent. Receperunt enim cor in contractione expallescere g^{*}: sed id omnino videbant locum non posse habere, si in ea contractione cor sanguinem in suas arterias acciperet, a sanguine enim ruborem habet. Supererat, ut statuerent, cordis arterias, dum ipsum pulsant, inaniri, atque adeo exfulante sanguine eum in corde pallorem succedere, quem credebant omnino certum subnasci. Verum facile certe Clari viri eo se errore potuerant se liberasse. Cor enim in sua contractione omnino non expallescit h, uti jam 1740. in prælectionibus *Boerhaavianis* monui, uti neque ullus alius musculus ruborem suum, dum contrahitur, unquam deponit. Millies vidi, in omni genere animalium calidi sanguinis, avium pariter & quadrupedum. Vidit nuper in infantis humani pendulo corde Cl. *Dinkler* apud *Sandyfortum*. Ne vero fallacis experimenti viros præstantissimos accusasse videar, omnino tenendum est, in frigidi sanguinis animalibus, quibus tenuis cordis caro est, cor in singula constrictione expallescere; & album imprimis cor pulli, qui ovo incubato continetur. Id videbat in rana *Helmontius* i, in serpente *Harveius* k,

g Id. *Santorinus* p. 150.
 g^{*} *Chirac advers.* p. 232.
 &c.

h Conf. pauca, ex multis,

l. c. *Exp.* 474. 482. 483. Cl. *Remus* p. 33.

i *Blas humanum* n. 16.

k l^{*} c. p. 21. 22. 24. 28. 47.

S. III. VALV. ARTER. NON TEGUNT. 211

in piscibus *l*, quadrupedibus oviparis, & vermibus *m* alii. His animalibus cor sponte pallet *n*, rubet autem, quando undam rubri sanguinis ab aure recepit, & pallet iterum, quando eam undam in magnam arteriam expulit. In eo vero Cl. virorum error est *o*, quod ruborem cum pallore alternum in carne cordis posuerint, qui in cavea est. Hinc perpetuus rubor residet in majoribus, calidisque animalibus, quibus cor crassum est, neque sinit ventriculorum sanguinem pellucere, & in ipsa sua carne causam purpuræ habet. Auriculæ vero utique, quæ tenuissima carne sint, & quarum de cavea sanguinis rubor pellucet, etiam in calidi sanguinis animalibus repletæ rubent, & pallent contractæ *p*.

Num quidquam vero in *Lancisii* *q* theoria firmum sit, non definivero, etsi eam confirmat *Caietanus Petrioli* *r*; verus forte ejus hypotheseos auctor. Aiebat vir Ill. in animalibus audacioribus, & procul dubio carnivoris, arterias coronarias supra valvulas oriri: in timidis, herbivoris, sub iis valvulis ex sinubus prodire, in hominibus denique incertam originem esse,

l *Walæus*, *N. Stenonis* F. *n* 1. c. *Exp.* 487. 492. 542.
Act. Hafniens. 1. c. p. 149. 546. 549.
Lower c. 3. p. 111. *Lancisius* *o* *Gavet* 1. c. p. 26.
p 68. 81. ed. 1628. In rana *p* Vidit etiam *Volcherus Coi-*
de Bremond *memoir de l'Acad.* *ter Obs. Anat.* p. 124. Adde
Roy. des scienc. 1739. p. 472. experimenta nostra 487. 492.
In lampetra *Power* *obs.* 32. 514.
in salamandra *Jacobæus* *p*. *q* 1. c. p. 63.
220. *r* Sibi certe hanc observa-

m *Lister* *p*. 29. in cochlea. tionem vindicat, ad *Eustachium* p. 91.

ut alius alio audacior fuerit, aut debilior. Priorem legem confirmavit vir summæ auctoritatis J. B. *Morgagnus* s. Varietatem vero aliquam admisit, & homines dari non negat, quibus valvulæ arterias protegant, Ill. & sæpe a nobis laudatus Archiattrorum comes t. Id autem & huic Ill. viro v, & *Lancisio* x, & *Miegio* facile dederim, siquidem aorta constringitur, & sanguinem versus cor repellit, utique tunc aliquam etiam ejus sanguinis partem in cor retroagi posse: ita tamen, ut fateatur Ill. Præsul, minus profunde in cordis carnes eum sanguinem penetrare, quem aorta inpulerit. Necdum certo puto oculis constare, in sano homine, cui libera vasa sunt, tantam esse arteriæ constrictionem, ut sanguis contra subsequens in plena aorta affluentum retroagatur. Valvulas callosas vidi, ut non possent ostia arteriarum tegere x*.

§. XXXIII. Numerus, & alia adtributa.

Uti duæ valvulæ sunt, quas diximus, ita duo sunt ostiola arteriarum cordis. Plura nunquam vidi, neque pauciora. Non oportet certe pro tertia y arteria cordis numerari exiguum furculum, qui ex coronaria dextra, adeo vicinus ejus origini, satis sæpe nascitur, ut in aperta aorta ejus principium conspici possit: is

s *Epist. Anat.* XV. n. II.

t p. 218. 365.

v p. 365.

x p. 63. 64. 65. l. c.

x* *Santorin* p. 117.

y Ita numerat *Fantonus*, & *Lancisius* p. 61.

vero aortæ proprias membranas, aut adipem adit *z*. Rarissimum credo, si vera tertia *a* cordis arteria adfuerit. Contra neque unicam arteriam cordis unquam reperi, neque fere alternæ ejus visceris convexitates id ferunt, quas ab unico trunco perreptari necesse foret, neque nisi in bove *b* nonnunquam, & in homine semel aut bis *c* quidquam ejusmodi, ab idoneo teste, visum est, etsi veteres a *Galeno d* seducti *e*, unicam cordis arteriam, uti venam unicam, communi consensu recensuerunt. Dudum, totus tamen *Galenicus*, *Jacobus Sylvius f*, & ante eum *Jacobus Berengarius g* duas arterias viderunt.

Iter harum arteriarum ex sua origine est ejusmodi, ut ad cor redeant, sive ut angulum, cum progrediente aorta majorem *b*, cum nascente minorem intercipient, neque alium ductum fere necessitas tulit, quæ jussit ex aorta, atque adeo supra cor, eas arterias educere.

In ejus arteriæ ostio sunt, qui valvulam

z Conf. *Icon. Anat. Fasc. VIII. p. 7.*

a Posterior dicta *Winslowo Expos. Anat. T. III. traité des arteres n. 44. T. IV. tr. de la poitrine n. 72.*

b *Kaauw n. 675. Morgagn. Epist. Anat. XV. n. 8.*

c *Fanton l. c. p. 293. Muralt. vademec. p. 455.* Huic tamen auctori, in humana anatome, minus tribuo.

d *De Hippocr. & Platon. decret. L. I.*

e *J. Ant. van der Linden physiolog. reform. p. 69. Guerner. Rolfinck dissert. anat. p. III2. III3. de corde p. 33.*

Is tamen frequenter geminam esse fatetur. Plures vidi in not. *a.* ad n. 4. diff. meæ de *vasis cordis propriis.*

f *Var. corp. dissect. p. 70. b.*

g *Isagog. anatom. p. 29.*

b *Eustach. tab. 15. f. 2. tab. 16. f. 2. Vieussens tab. 5. f. 1. Fanton p. 293.*

descripserint *i*, qualem rarissime quidem visam, etiam *Lancisius k* repetit. Nihil ego simile unquam vidi, nisi velis, quod quidem ubique in ramorum arteriosorum ostiis locum habet, aggerem ab altera parte convexum, & ab altera cavum incile, pro valvula numerare. Sed neque *l* in progredientibus arteriis cordis ad ortum majorum furculorum, valvulas reperio, Ill. Præfuli *m* dictas, quæ intercedant, ne sanguis ex ramis minoribus in majores retroagatur, faciantque, ut aqua injecta, corde compresso, neget in eas arterias redire: quæ demum in equo manifestiores sint. Denique Ill. quem sæpe excitamus, Romanus Archiater in ostiis majorem furculorum arteriarum cordi propriarum quosdam quasi sphincteres vidit *n*, de iisdem forte eminentibus arcubus locutus *o*, quos in arteriarum historia descripsimus.

Internam membranam earundem arteriarum crassiores, quam alibi, reperit *Lancisius p*. Mihi tamen solida & alba, neque rubella aut plicata videtur, qualis in aliis visceribus reperitur *q*, etsi sunt qui ejus modi in hac arteriæ tunica viderunt. Frequenter *r* autem

i Isbr. v. Diemerbroeck anat. p. 475.

k p. 61.

l Unicam etiam vidit C. Victor. Schneider de corde p. 28. 38. & semel *Rantonus l. c.*

m p. 63.

n l. c. Repetit ex *Lancisio Glassius l. c. n. 52.*

o p. 66. 67.

p Ibid.

q L. II. p. 128.

r Post crebras palpitationes *Senac T. II. p. 434.* Coronaria arteria per digitum ossa *Loeseke observ. p. 30.*

offescunt eadem, & succus luteolus, inter membranam musculosam & intimam depositus, in callos, cartilagines *s*, & osseas squamas aut lapideas *z*, tubulosque fit, quales etiam mihi *v* occurrerunt, & Cl. olim *J. Friderico Crellio* *x*: ejusmodi vero vitia late per truncos articularum cordis dominantur. Non video fibras anulares offescere *y*, quas sæpe integras de ossea interiori squama avulsi, cui fulcos inscripserant. Ruptam fuisse in variolis exemplum exstat.

§. XXXIV. *Arteria Coronaria dextra, inferior.*

Diximus, quæ utrique arteriæ cordis communia sunt, nunc per singula eundem est. Dextra arteria coronaria plerumque major est, uti per repetita exempla confirmavi, post *Vesalii* *z* effata; nam aliquando minor est, qualem & ipse olim vidi *a*, & pro frequentiori fabrica *Fantonius* *b* habuit. Prodit ex fede aortæ dextra & inferiori, & dextro, ut vulgo vocant, ventriculo prospicit, & circa ejus originem, in vallecula auriculam ejus lateris a corde sepa-

s La Mettrie obs. CXI.
t Gieseler. de calculo vesicæ. Leid. 1674.

w Opusc. patholog. obs. 51.
x In disp. de arteria coronaria instar ossis indurata.

y Morand. Memoir de l'Acad. des scienc. 1736. p. 632.

z Lib. III. c. 12. p. 486.
 & Petrus Senac p. 218.

a De vas. cord. propr. n. 4. not. a.

b l. c. p. 295.

rantem circumit *c*, multo adipe tecta, secundum valvulae anterioris originem.

Plerumque in facie cordis plana, inque ea sede finitur, quae septo cordis respondet, ibique cum vena media cordis ad mucronem flexuosa descendit *d*, circa eam sedem evanitura, aut per valleculam inter duos cordis mucrones ad faciem convexam continuata *e*, inque occurrentem sibi praecipuum ramum sinistrae arteriae coronariae inosculata. Alias tamen septum cordis praeterit, & versus obtusum marginem pergit, magnamque partem fulci tenet *f*, qui inter cordis sinistrum ventriculum, & ejus lateris sinum est, ut denique aut in sinistram aurem terminetur *g*, aut in sinum, prope venae cavae inferioris ostium.

Praecipui rami sunt *b*, primus quidem ad arteriae pulmonalis originem, & incumbentem adipem, quem proprio nomine dignum judicavit *Vieussenius i*, nonnunquam duplex *k*; & perpetuo trans arteriam pulmonis cum sinistrae arteriae coronariae furculis inosculatus. Aut

c In facie convexa depinxerunt *Eustachius* tab. 15. f. 2. tab. 16. f. 1. *Vieussens* tab. 5. f. 1. *Senac* tab. 1. h. In facie plana, aut inferiori *Vieussens* tab. 5. f. 2. e. e. tab. 6. f. 2. f. 2. f. f.

d *Ruyssch Thes. Anat.* IV. tab. 3. f. 1.

e l. c. p. 10. n. 6.

f Ibid. n. 4.

g Tale quid *Ruysschius* habet *thes. anat.* IV. f. 2. &

Senac tab. 3. f. 2. *k. k.*

b Praeter eum, qui membranas aortae adit, & pro tertia coronaria nonnunquam habitus est, *Vieussens* p. 68. tab. 1. f. 1. tab. 11. f. 2. *g.*

i *Artère graisseuse Vieuss.* tab. 5. f. 1. f. *Morgagn. Epist. Anat.* XV. n. 8.

k Duos, & duas cum sinistra arteria coronaria anastomoses, habet *Senac* tab. 1. l. & l. m. m. p. 220.

iste, aut eorum aliquis, quos continuo dicemus, etiam aortæ *l* ramum exhibet, qui cum bronchialibus supremis communicat. Ejus anastomoseos iconem dedit F. *Ruyschius m*, trunculi vero originem non definivit, qui cum coronaria coit.

Inde ad aurem dextram tres fere in facie convexa *n*, tres alios in facie plana *o* & inferiori, ramos mittit. Eorum aliqui per foveam, quæ septo auricularum cordis respondet, & foraminis ovalis fedem, longe in sinum sinistram *p*, & aortam, ei sinui obversam, excurrunt, & cum ramulis arteriæ coronariæ sinistrae inosculantur. Ab ejusmodi etiam ramo furculi aliqui membranas venæ cavæ utriusque adeunt, & superioris nempe, & inferioris, & in illa cum furculis nervi phrenici fodalibus *q*, atque a thymicis & mammariis natis; in ista cum arteriolis a phrenica, & a renali, ad venam cavam missis, furculos communicant. Alii venas pulmonales dextras adeunt, inque iis cum ramulis bronchialium inosculantur.

Verum multo majores rami sunt, quos eadem coronaria dextra deorsum & versus cordis mucronem emittit; quatuor nempe & quinque in facie convexa, quorum infimus idem lon-

<i>l</i> Senac <i>m</i> .	<i>l</i> c. C. sed unicum pingit.
<i>m</i> Epist. Anat. III. tab. 3.	<i>p</i> Vieussens tab. 5. f. 1.
<i>n</i> Senac tab. 1.	<i>q</i> Pictis in tab. 1. arteriarum pectoris, quæ est in fasciculo iconum III.
<i>o</i> Idem tab. 2. i. i. Ruysch	

gissimus ad mucronem cordis pervenit *r*, qui iidem trans sedem septi cordis numerosissimis anastomosibus cum ramis sinistrae arteriae intertexuntur & inosculantur. In facie plana alios, iterum ex ordine minores, & similes furculos edit, rarum enim est hanc coronariam arteriam adeo parvam esse, ut in margine acuto finiatur *s*, & sinister truncus totam faciem planam cordis teneat.

Coronam quamdam coronariae dextrae arteriae circa cor universum in sinistram coronariam continuatam *Ruyschius* *t* depictam dedit, quam alii Cl. viri faciles receperunt *u*. Nunquam vidi, in facie plana duas arterias in unum truncum obvias convenisse: neque alii solertes viri viderunt *x*, nisi forte *Ruyschius* aliquam trans arteriam pulmonalem minorem anastomosin intelligit, qualem utique perpetuam reperio *y* sed exiguam quam Cl. *Neubauer* aliquando insigniorem vidit, saepe & plures vidi.

§. XXXV. Sinistra superior.

Sinistra, sive superior arteria coronaria cor-

- | | |
|--|---|
| <i>r</i> Ruysch Epist. Anat. III. tab. 21. f. 1. | Hermannus Boerhaave Instit. rei Med. n. 183. |
| l. c. f. Thes. Anat. IV. l. c. f. 2. | Senac T. I. |
| <i>s</i> Qualem quidem iconem dedit III. Senac tab. 2. ad o. a. q. | Abrahamus Kaaum Boerhaave de perspir. n. 674. 676. Jacobus Benignus Winslow tr. de la poitrine n. 72. |
| <i>t</i> Epist. Anat. III. tab. 3. f. 1. | <i>x</i> Senac p. 219. |
| <i>v</i> Philippus Verheyen anat. | <i>y</i> p. 372. |

dis, exit de aorta inter arteriam pulmonalem & aurem sinistram, & ex brevi trunco continuo duos, & nonnunquam tres præcipuos ramos edit. Eorum prior, *anterior* *z*, continuo per fulcum, qui septo cordis interius latenti respondet, per faciem cordis convexam, ramosus *a* & flexuosus ad mucronem descendit, idemque nonnunquam, ut modo tetigi *b*, trans mucronem, per valleculam ibi descriptam, in planum inferius continuatur *c*, & demum obviæ coronariæ dextræ contrarius occurrit & inosculatur.

Hujus propaginis furculus ex primis ad aortæ membranas *d* & ad pulmonis arteriam *e* venit, trans eam cum dextræ arteriæ, quos dixi, furculis inosculatus, duplici potius *e*^{*}, quam simplici anastomosi. Eos ad arteriam pulmonalem ramusculos alia altera magna sinistræ arteriæ propago *f* edit, quam continuo dicemus. Idem cum propaginibus bronchialis arteriæ in arteria pulmonali inosculantur. Reliqui rami fere ventriculū sinistrum numerosissimi adeunt *g*.

Alter princeps, *circumflexus*, ramus sinistræ

- | | |
|--|---|
| <p><i>z</i> Artère coronaire antérieure Vieussens conf. Winslow l. c. n. 72.</p> <p><i>a</i> Vieussens tab. 5. f. 1. e. e. tab. 6. f. 1. 3. Senac tab. 1. g. b. tab. 3. f. 1. d. d. z. i</p> <p><i>b</i> Nam aliquando ramus dextræ major est, qui circa</p> | <p>ca mucronem circumit.</p> <p><i>c</i> Ruysch Thes. Anat. IV. l. c. Senac l. c.</p> <p><i>d</i> Vieussens p. 64.</p> <p><i>e</i> Senac tab. 1.</p> <p><i>e</i>[*] p. 218.</p> <p><i>f</i> Vieussens tab. 6. f. 2.</p> <p><i>g</i> Ruysch Epist. III. tab. 3. f. 2. Vieussens tab. 6. f. 1. 4. 5.</p> |
|--|---|

coronariæ per valleculam, quæ inter sinistrum finum, & ejus lateris ventriculum est, versus obtusum marginem tendit, circa eum marginem conflexitur *g**, venit in planum inferius, & plerumque posterius, quam septum cordis, ad aliquam a fine trunci coronarii dextri distantiam, in carnem ventriculi sinistri versus mucronem deflexus finitur *h*. Rarior fabrica est, etsi summi viri *i* eam in icones receperunt, quando hic ramus ad venam cordis mediam usque producit, & cum ea versus mucronem cordis descendit.

Hujus rami plerique iterum furculi flexuosi in carnem cordis sinistri descendunt: alii vero, numerosi, sursum in aurem *k* sinumque sinistri lateris veniunt. Qui sinum adeunt, ii in eo sinu cum ramis arteriæ dextræ, jam dictis, inque venis pulmonalibus sinistris cum furculis bronchialium arteriarum inosculantur. Aliquando ad faciem usque sinus sinistri anteriorem producti, in aurem dextram, fossam ovalem, & inferiorem venam cavam veniunt, perinde cum phrenicarum & renalium ramusculis uniti, inque aortam, pariter cum dextris coronariis conjuncti *l*.

*g** Conf. art. coronaire gauche *Vieussens* tab. 5. f. 1. c. &c. *Senac* tab. 2. a. a. a.

h *Senac* tab. 3. f. 2.

i *Eustachius* tab. 16. f. 2. *Senac* tab. 1. & tab. 2. i. i. i. *i*. *Vieussens* tab. 5. f. 2. *d. d.* tab. 6. f. 2. *C. r.*

k *Ruyfch* *Epist. Anat.* III. tab. 3. *Vieussens* tab. 6. f. 2.

l Conf. *Fascic.* VIII. icon. anat. p. 8.

m Tab. 7. f. 2. l. f. 1. r. 2. 4. 4.

l Conf. *Fascic.* VIII. icon. anat. p. 8.

Non rarum est tertium *ramum* haud longe ab origine coronariæ sinistrae ex ejus trunco prodire *m*, quem etiam, raris in exemplis, aorta *n* genuit: interiorē vocat *Vieuſſenius*. Is profunde carne cordis tectus per septi sedem ad mucronem usque descendit, nulla vena comite. Non tamen adeo perpetuo, ut quidem Viro Cel. visum est, unicus truncus est, qui eum profundum locum tenet. Vidi tres fuisse, quos ex ordine ramus anterior sinistrae coronariæ produxit, primum longiorem, breviores reliquos, crassæ carni sinistri ventriculi datos.

Innumerabilibus ramis hæ, quas descripsi, arteriæ omnes cordis musculosos lacertos perambulant, unde ille intensus rubor: plures vero furculos persequi, singulasve valvularum, aut papillarium musculorum arteriolas exprimere non putavi e re fore, cum ejusmodi minuta fabrica, etiam summa cum diligentia ad cadaver descripta, ne de proximo tamen, quod incideris, cadavere vera sit. Id unice addimus, infinitis locis arterias cordis dextras & sinistras ramos sibi communicare, ut omnino non mirum sit, etiam ante inventam artem vasorum artificiose replendorum, tamen jam innotuisse o, altera arteria flatu aut aqua repleta,

m Tab. 7. f. 2. l. f. i. i. i. p. 6. *Carolo Drelincourt in canicid. V. Gualthero Charleton three lectures* p. 46.
n *Idem* p. 67.
c *Richardo Lower* l. c. cl

repleri & alteram. Via ex arteria in cellulofam telam hic, fi ufquam liberrima eft.

A bronchiali utraque arteria ad fui lateris auriculam cordis ramum mitti, nuperus auctor exftat *p*, qui forte citatas a nobis arteriarum auriculæ utriufque, cum bronchialibus inofculationes intelligit.

§. XXXVI. *Venæ majores. Coronaria.*

Venæ cordis non unius generis funt; nos tria faciemus, venarum *magnarum*, *mediocrium*, & *minimarum*. Iftas quidem non omnes anatomici admittunt.

Magnarum venarum princeps eft, quam *Galenus* peculiariter *coronariam q* dixit, aliique veterum, qui nomen ab ejus venæ circa marginem obtufum circumflexione finxerunt. Grandis certe vena eft *r*, fi cum mediocri cordis pondere contuleris. Ostium *s*, quod aliqua fingularia habet, aperitur in auriculæ dextræ faciem pofteriorem, ad finiftrum latus anuli ovalis, & prognatæ ex eo anulo Euftachianæ valvulæ. Ita aperitur, ut ftylum ex auricula verfus obtufum marginem admittat. Ora venæ, qua in aurem patet, pofterior resecta eft, anterior femilunarem valvulam præpofitam habet, quam *Euftachius t* invenit, *Bartholinus v* recte

p *Disdier* *farcologie* Part. III. p. 55.

q *Dissect. arter. & venar.* c. 2.

r *Vesalius* L. VI. p. 279.

s *Idem* *ibid.* f. 7.

t *De vena sine pari anti-* gram. X. p. 263. 264. tab. 8.

f. 6. & tab. 16. f. 3. quæ quidem figuræ non differunt.

v *Anat. tert. renov.* p. 678.

pro Guiffartiana valvula habuit, plerique & vero anatomici receperunt. Tenera est & lunata, vidi reticulatam fuisse, qualis etiam *Morgagno* y occurrit. Vidi latam, irregularem, quadrangularem, ut pars lunata se ostio venoso adplicaret, pars reticulata hinc in oram ostii venosi adnasceretur, inde in auriculam dextram sinisterius, quam Eustachii valvula. Est ubi ex reticulo fibram dedit, quæ aut obposito margini magni ostii cordis adligaretur z, aut in Eustachii valvulam a. Non rarum est, pro una valvula plures adesse, duas ut *Lancisius* b, plures etiam usque ad sex c omnino valvulas Parisiis a. 1727. Defuisse non vidi, quod Cl. viro accidit d, neque ideo negaverim, veram esse valvulam, quod directionem cum ora superiori (aut priori) venæ suæ continuatam sequatur e. Aliarum valvularum venosarum simillima, cavet procul dubio in vivo homine, ne sanguis ex auricula sinistra adeo facile in venam coronariam regurgitet. In cadavere tamen eo officio maligne fungitur, cum omnino venam cavam non possis sebo replere, quin vena coronaria una repleatur f. Sed etiam in vivo & mori-

x *J. C. Arantius obs.* 33. dedit, olim noster Clar. col-
Riolanus anthropograph. p. 346. lega.
Isaacus Cattier obs. 78. Se- b p. 66. *Glass* n. 44.
nac p. 200. &c. c *De vas. cord. propr.* n.
y *Advers. Anat.* V. p. 32. 18.
z *Martine Comm. in Eu-* d *Glass* propos. 42.
stach. p. 145. e *Ill. Trem de different.*
a In icone valvulæ Eusta- inter nat. & non nat. n. 9.
chii, quam *Ill. Brendelius* p. 49. tab. I. f. II. g. &c.
f *Lancis.* p. 67. 68.

bundo animale , manifesto , sanguis alterne in venam coronariam refugitur , ut alias ostendamus *g*.

Alias in venis coronariis valvulas , a claris viris *h* & in dimidia fere parte incisorum corporum ab ipso *Morgagno i* visas , ego quidem non memini me vidisse *k*. Et certum est , omnes venas cordis ita liberas patere , ut sebum ostio venæ coronariæ immissum , omnes hujus venæ ramos repleat , inque omnes pariter alias venas cordis expedite transeat *l*. Uti vicissim in nullam reliquarum venarum cordis aut ærem , aut aquam injeceris , quin in omnes transeat.

Ex eo nunc ostio , non unica vena coronaria , sed duæ omnino , & minime infrequenter tres , venæ in diversum abeunt. Princeps earum , vera coronaria , sequitur radicem sinistri sinus , atque inter ejus membranas incedit , multo tecta adipe , supra arteriam coronariam sinistram , & retrorsum ad obtusum marginem per faciem planam migrat *m*. In ea parte cordis & sursum in sinistrum sinum *n* ramos mittit , & deorsum in ventriculum , versus cordis mucro-

g In historia pulsus venosi 179.

L. V. inque hujus libri *Seçt.*

IV.

h *Lancisius* p. 67. *J. Ad.* *Lower* l. c. *Charleton* l. c.

Thebesius l. c. p. 24.

i *Morgagnus Epist. Anat.* *stach. tab. 16. f. 2. Ruysch*

XV. n. 21.

sens tab. 1. f. 2. & alibi

k *Nec Verheyen anat. p.*

n *Senac tab. 2. a. a.*

mucronem *o*; eo quidem duas, aut tres propages, quæ inter se invicem, & cum vena cordis media frequenter inosculantur. Venam vero pericardii *p* ex ea sede natam, ego quidem nunquam vidi, quam vel ideo conspicuam fieri oporteret, quod ex ostio, dum cor eo facco nudatur, resecto, non possit non cæram emisisse.

Quando porro truncus coronarius se circa marginem obtusum conflexit, tunc planum anteriùs adtingit, ejusque partem summam, semper in sinistri ventriculi principio, inde comes rami anterioris arteriæ cordis sinistrae descendit *q* per lineam, quæ latenti interius cordis septo respondet, ad mucronem usque, & ultra eum producta, perinde uti de arteria diximus *r*, venæ mediæ occurrit & inosculatur. Ventriculo sinistro, arteriæ pulmonali, aortæ *s*, sinistraeque auriculæ furculos exhibet, & multis cum innominatis venis anastomosibus communicat. Vidi etiam ramum trans arteriam pulmonalem, sub aortæ radice, versus acutum marginem cordis descendisse, & in ipsa carne auriculæ dextræ in aliquam venarum innominatarum se inmisisse. In subclaviam vero dex-

o Ruysch l. c. f. 1. Senac
ibid.

p Quam Vieussenius habet
tab. 1. f. 2. K. tab. 5. f. 2. f.

q Senac tab. 1. k. k. tab.
3. f. 1. Ruysch l. c. f. 2.
pulchre. Vieussens tab. 1. f.

pene absque ramis. Peculiare
autem, apud eum auctorem,
eo loco nomen induit *veine*
coronaire anterieure.

r p. 219.

s Vieussens p. 32.

tram hanc cordis principem venam se inferuisse, rarissima est observatio *t.*

§. XXXVII. *Vena cordis media: Vena sinus dextri: Innominata: Anterior.*

Vena cordis nobis media, posterior Vieus- senio x, ab aliis scriptoribus *y* inter ramos magnæ coronariæ numeratur. Perpetua, multo tamen minor, ab ipso suo in auriculam dextram ostio, in septo ventriculorum, per faciem planam, arteriæ comes *z*, descendit flexuosa ad mucronem, perque valleculam utriusque ventriculi fini interjectam, credit in venam coronariam principem, in quam obvia terminatur. Præterea cum majori coronario trunco & cum innominatis venis, plurimis intermediis ramis unitur. Non rarum est, huic venæ, in ostio communi dextræ auriculæ, peculiarem valvulam præpositam fuisse.

Vena sinus dextri a perinde perpetua est, non tamen perpetuo proprium in magno ostio coronariæ ostiolum habet. Sed alias utique in venam potius mediam *b*, inferius se inmittit, quam ejus cum coronaria confluens est. Mi-

t Claud. Nicol le Cat hist. de l'Acad. des scienc. 1738. obs. 7.

v Diff. de vas. cord. propr. n. 14.

x Tab. 1. f. 2. L. tab. 4. f. 2. tab. 5. f. 2. g.

y Eustach. tab. 16. f. 2. ad

e. Albini. Vesal. L. VI. f. 6. D. E. Ruysch 1. 1. f. 1. absque numero Senac tab. 2.

b. b. tab. 3. f. 2. p. 221. z p. 219.

a De vas. cordis obs. iterat. n. 8.

b Senac tab. 2. h. b.

grat inter membranam externam & internam dextri sinus, aurisque, & versus marginem acutum cordis tendit, in ipso margine, aut certe proximo loco, finem ita factura, ut mediæ venæ cordis parallela versus mucronem descendat. Est etiam, ubi absoluto arcu circuli inosculetur in venam cordis anteriorem. Alias redit quidem in planum cordis superius, cæterum non in venam anterioris nomine dignam, sed in aliquam innominatarum finitur.

Venæ, quas modo diximus, cordis *innominatæ Vieussenii* c hoc minus utile nomen acceperunt, *anteriorum inferiorum* nomine adprime dignæ. Hæ venæ tenent eam totam sedem plani superioris cordis, quæ est inter marginem acutum, & aortam arteriam. Numerus incertus est, tres tamen aut quatuor crebrius reparias, quarum longior semper & major est, quæcunque inferior, acutoque margini propior est. Inferuntur in auris dextræ radicem, qua se sui lateris ventriculo committit, qui ramusculi ejusmodi venarum inter duas auriculæ dextræ oblique repunt: ii *sinus* sunt, quos *Vieussenius d* & *Lancisius e* depinxerunt, etsi etiam alia, quam continuo dicam, vena perinde forte pro sinu ab Ill., quos citavi viris, descripta fuerit. Cum vena coronaria magna, & cum vena me-

c Tab. 1. f. 1. i. i. i. i. propr. n. 15. 19. & in obs.
& p. 45. Habet etiam Drake iterat. n. 7.
tab. 2. a. a. Nomen confer- d Tab. 4. f. 1. 1. 1. 1. tab.
vavi in diss. de vas. cord. 10. f. 1. tab. 11.
e Tab. 5.

dia, sinusque dextri vena varie intermedios furculos communicare diximus.

Inter has innominatas venas aliqua sæpe adeo grandis est, ut peculiare nomen mereatur, *anteriorem* autem jam *Galenus* dixit *f*. Eam sæpe vidi *g*, hoc titulo dignam, proque perpetua describit *A. Kaauw* *h*. Solet innominatarum aliquando suprema esse, alias una ex infimis: aperitur autem in auriculæ dextræ radicem *i*, fere in medio, aut inferius, e regione venæ coronariæ majoris. Alias infima innominatarum tanto grandior est reliquis, quanto cor in sede acuti marginis longius protrahitur *k*. Nam ea tunc vena imam auriculæ sedem tenet, prope acutam cordis oram.

§. XXXVIII. *Venæ cordis mediocres.*

Dixi venas cordis majores, *coronariam*, *mediam*, *innominatas*, *venamque dextræ auriculæ principem*. Sequuntur aliæ minores quidem, neque longæ, sed quarum tamen & rami per cordis carnem sparsi conspicui sunt, & ostiola in dextri lateris sinum auremque manifesta patent.

f De dissect. arter. & venar. c. 2. *Administr. Anat.* l. 7. c. 10. Habet etiam *Eustachius* tab. 15. f. 2. tab. 16. f. 1. & *Ruyshius* in *Epist.* X. tab. XI. f. 4. *Epist.* III. tab. 3. f. 2. qui sibi inventam tribuit, tum *Guilielmus Comper myotom.* nov. tab. 37.

f. 3. & III. *Senac* tab. I. i. i. tab. 2. I.

g De vas. cord. propr. n. 15. b. *Obs. iter.* n. 6.

h l. c. n. 714. 717.

i In venam cavam, minus bene, *Rolfinck* de corde p. 38.

k Dixi in diss. de vas. cord. propr. n. 16.

Ejusmodi venam vidi, in radicem dextri sinus super ostium coronariæ venæ insertam. Ejus duo rami in contrariam divergebant. Alter *l* occultus, sub aorta, per latentes carnes baseos cordis incescit, venæque, quam continuo dicemus, coronariam magnam & dextræ auris venam aut innominatas conjungenti, se immisit. Occultus *m* alter ramus, supra aortam in coronariam magnam se inseruit, ut omnino aorta circulo venoso contineretur. Hæc etiam vena potest pro sinu a *Vieußenio n* & *Lancisio o* habita fuisse, & certius videtur is esse *circularis sinus*, quem aliquot post nostras observationes annis *p*, aurem amplecti scripsit vir Ill. *Josephus Lieutaud q*. Circulum verò circa universum cor venosum perficiunt, quando hæc quidem fabrica obtinet, vena coronaria magna: vena occulta, quam modo dixi: vena coronariam magnam conjungens cum dextra auriculæ vena, aut cum innominata, quæ eadem cum dextræ auris vena conjungitur: demum vena dextræ auriculæ. Sed hæc fusius exposui *r*, non satis constantia, ut in hunc librum tota describere velim.

Aliud, frequens, osculum venosum *s* reperitur, haud longe a fossa ovali, idemque sanguinem a vena revehit, quæ aurem sinumque

l Vena peculiaris in *obs.*
iteratis n. 9.

m Ibid. vena occulta.

n Tab. 4. f. 1. tab. 10. f. 2.

o Tab. 5.

p *Observationes iteratæ* anno 1739, Tentamina *Josephi Lieutaud* an. 1742. prodierunt.

q *Essays anatomiq.* p. 235.

r l. c.

s *Vieußenius* tab. 12. f. 1. L.

dextrum adit. Alia similia ostiola venosa, ad trunculos conspicuos ducentia, passim in sinu & in aure dextra aperiuntur τ : sed etiam in vena cava aperti ostioli *Vioussenius* ν meminit, quod ab aorta & a vena pulmonali sanguinem reduxerit.

Deinde etiam in sinistro sinu foramen venosum supra ostium venosum cordis, & aliud supra medium foramen ovale reperi, & osculorum venosorum in venam pulmonalem patentium apud *Vioussenium* mentio fit α , & ejusmodi sinuum apud *Cacilium Folium*.

Ex vena cava ad sinistram sinum euntem venam vidi,

§. XXXIX. *Venæ minimæ.*

Et de his quidem venulis nulla potest controversia nasci. Non ita recepta sunt alia minima, per utrumque sinum & utrumque ventriculum dispersa, venarum ostiola, quæ quidem ad aliquos ramosos truncos aut ægre referas, aut omnino referre non possis; cæterum videas aërem, aquam, argentum vivum in venas cordis, aut in arterias, impulsam in ejus caveam emittere. Inventor *Vioussenius* γ est, & causa inventi hypothesis fuit. Quærebat vir cel. fermentum,

Talia habet *Vioussens* tab. decouvertes sur le cœur p. 18.
 10. f. 1. tab. 12. f. 1. & p. γ Anno 1706. in nouvelles
 47. *Lancisius* in tab. 5. decouvertes sur le cœur, deinde in traité du cœur anno
 ν p. 32.
 α Ibid. & p. 51. Nouvelles 1715.

quod dotes peculiare aliquas sanguini in ventriculis cordis impertiret. Nam vena in cordis caveam aperta, ab *Amstelodamensibus* anatomicis olim dicta, ad priorem classem potest pertinuisse x. Post *Vieussenium* similia proposuit, proprio libello, *J. Adamus Thebesius a*, deinde alii Ill. viri *b*, & nuper Cl. *Geislerus c*. Contra alii de his ostioliis aut dubitarunt *d*, aut omnino non faventem sententiam pronuntiaverunt *e*. Quare oportet experimenta, tamquam productos testes, audire.

Inmittitur tubulus venæ alicui cordis, magnæ, aut mediæ, perinde est, cum omnes inter se ramos sibi plurimis locis communicent. Ligantur prope ostiola omnes, quotquot possunt filo comprehendi, venarum trunci. Impellitur versus mucronem cordis, averso adeo ab ostioliis itinere, aër, aqua colore aliquo tincta, argentum vivum. Observatur in corde sub aquammerso, quid inde fiat. Non longus labor erit, donec guttulæ liquoris aërisve bullæ de iis prodeant, in auribus quidem sinubusve cordis per obliqua oscula, quorum productæ ex altero sinus semicirculo membranæ pro valvulis *f*

z Colleg. priv. p. 10.

a In diss. de circulat. sanguinis per cor Leid. 1708. 4.

b *Rochet* in *Galeria di Minerva* Tom. 7. p. 55. *Phil.*

Verheyen in anatome. *Lancisius* in citato opere. *Kaauwius* &c.

c In propr. disput.

d *J. Georgius Duvernoy* Comment. Acad. Petropolit.

T. II. p. 295.

e *Senac* l. c. p. 113. 115. 367.

f *Rochet* l. c. *Vieussens* nouvelles decouvertes p. 24. traité du cœur p. 101. 111. 112.

a nonnullis scriptoribus habitæ sunt, quæ in dilatato corde claudantur g. In ea oscula venæ patent, conicæ, versus sua ostiola latiores k, etiam ramosæ l, quæ quidem ad mediocrium venarum cordis numerum pertinent. Sed etiam in dextro inque sinistro ventriculo, inque imo fundo fovearum, quæ inter reticulatos lacertos cordis intercipiuntur, oscula sunt, per quæ ex cordis carne, injecti liquores exeunt. Frequenter in his osculis aut sanguinis grumuli m resident, aut radiculæ etiam polyporum n in eadem se infigunt : ut quidem omnino hæc reticula ad *carminandum* & *adtenuandum* sanguinem non potenter facere videantur, cum a polypis ipsa habitentur o. Guttulas argenti vivi in iisdem ostiolis prominentes vidit R. Vieussens p.

ompl Ostiola, quæ nunc exposuimus, reperiuntur in auricula, sinuque dextri lateris q, in ventriculo dextro r, in aure sinuque sinistro

g Vieussens nouv. decouv. p. 24. 26. tr. du cœur. p. 45. 46. 48. III. II. 2. Kaaw. n. 720.

k Kaaw n. 725.

l Thebesius p. 13.

m Vieussens nouv. decouv. p. 15. 16. tr. du cœur p. 100. Thebesius p. 31. Dam. Sinop. in parergis.

n Rochet l. c.

a Senac p. 305. 364. 365.

p Obs. d'anat. p. 54.

q Vieussens du cœur p. 32. 33. 45. 46. tab. 2. f. 1. tab. 4. f. 1. 2. tab. 10. & 12. f. 1. Lancis. p. 70. Fantonus p. 294. Kaaw n. 721. Senac p. 222. Geisler n. 14. Portal.

r Vieussens tr. du cœur p. 31. tab. 12. f. 1. 4. 4. 6. 6. Thebes. p. 12. Verheyen T. 21. f. 3. Palsin Anat. Chirurg. p. 278. Kaaw n. 719. 731. Lancis. p. 70. Geisler n. 14. Portal.

s, inque ventriculo sinistro t, & in septo cordis v etiam potissimum. Si per venas quidem liquor impulsus fuerit, facilius subibit x, sed pauciora y in sinistro latere, & nonnunquam omnino nulla z ostiola reperientur, quæ impulsam liquorem emittant. Si per arterias a liquorem injeceris, perinde in dextra auricula a*, sinuque & ventriculo dextro b, & in sinu b* atque thalamo sinistro c guttulæ exstillabunt, sæpe quidem absque mora, etiam in Cl. viri *Arnoldi Duntzi* experimentis, alias difficilius, & nonnunquam omnino, uti continuo dicemus, &

s *Vieussens* tab. 13. f. 1. *Comper* tab. 39. f. 1. *Thebes.*

p. 23. *Verheyen* p. 176. *Lancisius* l. c. *Kaauw* n. 721. 723. *Portal.*

t *Vieussens*, *Thebes.* p. 12. 13. f. 2. *Palfyn* l. c. *Lancisius* l. c. p. 69. 70. *Verheyen* p. 177. *Winslow* n. 71. *Schmiedel* de ulcer. peric. *Portal.*

Venam magnam in ventriculum sinistrum apertam describit.

v *Thebes.* f. 1. E. & p. 22. *Lancis.* p. 69. *Kaauw* l. c.

x *Lancis.* p. 70. *Verheyen* p. 177.

y *Thebes.* p. 23. *Winslow* l. c. *Kaauw* n. 726.

z *Geisler* l. c. n. 15.

a *Vieussens* p. 18. *Adamus Brendel* obs. anat. dec. 3. in præf. *Rochet* l. c. (qui venas ligavit) *Ens* l. c. n. 44. *Portal.* p. 445. mal. int. II. p. 54. 12.

a* *Vieussens* mal. int. p. 85.

b Ex arteria dextra *Vieussens* nouv. decouv. p. 21. 34. Ex sinistra *Idem* in obs. d'anat. & de medec. prat. posthumo opere. Ex arteriis in universum *Geisler* n. 14. &c.

b* *Vieussens* l. c. mal. int. p. 12. 85.

c Ex arteria sinistra & profunda, in ventriculum sinistrum *Vieussens* nouv. decouv. p. 18. 20. 22. in obs. d'anat. & de medec. prat. Tantumdem & in dextro mal. int. II. p. 85. *Rochet* l. c. *Geisler* n. 14. qui ex arteriis foliis liquores in aurem & ventriculum sinistrum depluere docet. Contra *Vieussenius* l. c. ex arteria dextra in aurem sinistram liquorem exivisse scribit: ex sinistra vero in obs. d'anat. In ventriculum sinistrum *Portal* l. c.

mihi, & Senaco, & clarissimo Zinnio nihil ex-
fudavit.

Qui hæc ostiola, in sinus & thalamos cor-
dis patula admittunt, ii omnino persuadentur,
sanguinem ex vasis cordis propriis, arteriosis
& venosis, brevissima via in ea ostiola, cor-
disque atria thalamosque effundi : & addunt
aliqui, rem subtilius rimati, eum sanguinem
per hæc oscula inprimis exire, quo tempore
cor contractum est, iidemque in corde dilata-
to, eadem ostiola claudi autumant *d*.

Contra alii clari viri ejusmodi ostiola ex
naturæ lege patere *e* negant, & vi, ruptaque
cellulosa tela parari *f* credunt, ut nonnunquam
liquor vasis cordis injectus in caveas erumpat.
Verum ego quidem vim a meis experimentis
abfuisse satis certo novi, & a *Vieussenianis g*
abfuisse sponte intelligitur, quæ sola pressione
peracta sint. *Ruyfchiana h* etiam experimenta,
inter gravia equidem testimonia, tuto recen-
sentur, quoties de simplici eventu sermo est.
Deinde aqua adeo meabilis & mollis est, ut
in omnes quidem corporis animati caveas ex-
fudet, & tamen in numerosissimis periculis nun-
quam ab ea vasa lacerata fuisse meminerim : eo
magis vero non rumpi constat, quoties post
eam aquam impulsam insequens cera eandem
viam non sequitur. Porro arteria profunda,

d Kaauw n. 725. *Vieussens* II. p. 152.
tr. du cœur p. 45. 97. &c.

e Duvernoi l. c. *Senac* T.
I. p. 367. 368. *Sabatier anat.*

f *Senac* p. 369.

g *Traité du cœur* p. 104.

h *Advers. Anat.* I. n. 6.

quæ septo cordis providet, omnino focia vena destituitur, ut etiam magis probabile fiat, aliam viam hic a natura paratam esse, qua sanguis hujus arteriæ in vias circuitui sanguineo dicatas redeat. Denique Ill. contrariæ sententiæ auctor non diffitetur, in sinistro ventriculo rotunda ostia reperiri *i*, quæ aliquid videantur emittere, & alibi vasculorum extremos fines in ventriculos *k* apertos & patentes admittit.

Quare quidem mihi omnino vero proximum videtur, oscula mediocribus venis cordis affinia, sanguinem ex arteriis profundis cordis in ejus caveas revehere. Non ideo credo quidquam intercedere, quin & in dilatato corde, & in contracto, in & omni cordis statu sanguis per ea ostiola in caveas cordis redeat. Nullam enim machinam reperio, quæ impediat, ne sanguis, quem continuo per arterias cordis fluere ipsius oculi testimonium docet, etiam in minimos ramos, & in ostiola excretoria continuo torrente urgeatur. In systole enim cordis sanguinem arteriarum coronariarum saltu *m* vehementiori salire, atque adeo in ramos minimos valide urgeri ostendimus, & in diastole, minori quidem cum celeritate, tamen iter suum persequi *n*. Quæ vero vir amplissimus de sanguinis in corde diverticulis philosophatur *o*, deque refluxu sanguinis in venulas

i Senac p. 192. 193.

k p. 188.

l Ens n. 43.

m p. 209.

n Ibid.

o Lancis. pag. 70. 71. 72.

exhalantes ad valvulas usque redeuntis, ea quidem, tamquam ingeniosam aliquam hypothefin, malo apud Ill. *Præfulem* legi.

Sed neque fermentum aliquod *Vieussenianum* in corde locum habere, proprio loco ostendemus *o**, neque innatum calorem *Aristoteli* dictum, neque cum *Vieussenio* *p* nos sentire res ipsa finit, qui per ostiola modo descripta, liquorem sanguine aliquanto subtiliorem & calidiorem depluere, cumque venoso sanguine misceri, docuit, a quo redux a cavis venis cruor calefcat & tenuetur, adque motum excitetur, aut omnino demum fermentetur, ut alii clari viri, ad ejusmodi feryores admittendos promtiores tradunt *q*.

Facile *Boerhaavius* olim ostendit *r*, parvum discrimen esse inter sanguinem, per ostiola illa minora percolatum, & communem sanguinis venosi naturam. Qui enim sanguis hoc temporis momento in coronariis arteriis est, is, si diutissime ponas in pulmone hæsisse, ante sex horæ minuta prima per venam cavam ad cor advenit. Intra 450 enim pulsus nongentæ uncix ex corde sinistro exeunt, quæ massa major est tota mole humorum, per rubras venas ad cor revectorum. Ut ergo cor habeat, quod in aortam expellat, necesse est, ut intra idem tempus sex primorum minutorum sanguis, ve-

*o** Inter causas motus cordis dicetur in S. V.

p Du cœur c. 2. de remot. & proxim. c. 15. 16. nouv.

decouvertes sur le cœur p. 52. &c.

q *Lancisius* l. c. p. 71.

r *Inst. rei Med.* n. 177. &c.

na cava contentus, totus in pulmonem successerit, inque noningentarum unciarum locum venerit, quas aorta interim accepit.

§. XL. *An dentur in corde glandulæ.*

Ita neque glandulas admittimus, quas nonnulli Cl. viri in corde statuerunt. Unicam in medio septo cordis se vidisse, *Riolanus* s auctor est. In cuniculo *Harderus* t intestinalium similes glandulas descripsit, & in acipensere nigraglandulæ esse dicuntur v, quæ in cordis ventriculū atrum humorem deponunt. In elephanto x demum glandulas conspicuas in cordis ventriculis habitare, rubrumque & tinctorium liquorem parare, vir inter solertes anatomicos utique honoratum locum suis laboribus meritus docuit. Verum in homine quidem nulla hætenus industria aliquid glandulosi detexit y; neque videtur aut a glandula mora abesse posse z, aut in corde mora admitti. Sed neque in elephante *Petrus Camper* peritus incisor glandulas *Duvernoii* reperit. Si omnino in aliquo

s *Anthropograph.* p. 239.
t *Exercit. Pæonis & Pythagor.* p. 114.

v *Morgagn. Epist. Anat.* XV. n. 2, ex observatione A. M. *Valsalvæ*.

x *J. G. Duvernoi* l. c. p. 300.

y Exstat equidem J. B. *Bianchi* de glandulis internis cordis humani testimonium

apud *Senacum* T. I. p. 115. Sed ejus auctoris passim in describendis particulis corporis humani nescio quæ infelicitas, multis exemplis innotuit, musculorum urethræ, cranii sinuum, & nervorum, ductuum hepatico cysticorum &c.

z L. VII.

animale glandulosum aliquid in corde residere potest, id in pisce, lento, minusque celeris pulsus animale, expectari posset.

§. XLI. *Vasa cordis lymphatica.*

Vasa vero a rubris alia, *lymphatica*, valvulosa, utique certa fide in animalibus detecta sunt, neque ab humano corde ejusmodi venas abesse probabile fit, cum par utique earum in homine necessitas esse videatur, quæ fecit, ut in animalium corde a natura fabricarentur. Primus *Olaus Rudbek a* ad ductum chyloferum usque vasa aquosa deduxit, inde *Antonius Nuck b*. Nuperiora experimenta sunt insignis viri *Abrahami Kaauw c*, qui peculiari encheiresi usus, & ea vasa in corde ostendit, & aëre ope antliæ impulsio replevit. Nodos, ob valvulas interpositos, demonstravit *Petrus v. Muschenbroeck d*. Pro vasis lymphaticis etiam *Jacobi Hovii e* experimentum exstat, & ego in vivente capella, sub aure sinistra, vera & valvulosa vidi *f*. Denique *J. Fridericus Cassebohm g* unicum, flatu sub membranam cordis immisso, vas lymphaticum dexterit, & discipulus Cl. viri *J. Zacharias Petsche h* vasis aquosi meminit, quod ve-

a De sero ejusque vasis.

b Epist. de nov. invent. p. 143.

c n. 629. 631. 632.

d In disp. de aëre p. 19. Recusa est in Vol. IV. collectionis meæ.

e De circul. humor. per oculum p. 89.

f Second Memoire sur le mouvement du sang. Exp. 521.

g In codice M. S. Cl. viri, quem possideo.


h l. c. n. 83.

nas coronarias a basi ad apicem comitatum sit. Quin adeo in homine vasa pellucida in corde reperiantur, minime dubito, etsi neque ego vidi, neque Ill. *Senac* i, neque nuper Cl. *Guilielmus Hewson*.

S E C T I O IV.

M O T U S C O R D I S.

§. I. *Systole Cordi non naturalis.*

RDO ducit ad historiam motus cordis, qualem anatome in vivis animalibus ostendit. Is motus totus in contractione ponitur, qua eadem communis omnium muscutorum functio absolvitur. Dum enim animal vivit, cor cum summa celeritate & vehementissimo impetu contrahitur: languenti contra animali debilior contractio, mortuo nulla est, vitæ adeo filia est viriumque animalium. Deinde idem cor, post absolutam contractionem, in eum statum transit, quem dilatationem, remissionem, aut diastolen dicimus *k*, & qui idem in debili corde, per medium inter duas contractiones interval- lum, & post mortem superest, eo unico cum discrimine, quod a cadavere cordis repletio

abesse possit, cum qua in vivo & sano animale conjungitur. Hoc alterum cordis stadium in vivo animale alterna requies, in cadavere mortis & inertiae status est. In omnibus autem, etiam minutissimis animalibus, hæc alterna contractionis & remissionis successio observatur *l*. Non recte adeo, aut caute satis, systolen cordi naturalem, diastolen violentam esse *Gavetus* *m* scripsit, aut alienis ex dissectionibus doctor *Jac. Drake* *n*: nam certe sponte, nulla aliena causa accedente, cor in diastolen transit, in eo statu mansurum, nisi stimulus quicunque accesserit. Minus etiam recte, vir olim ingenio magis, quam experimentis usus, *Georgius Eberhardus Hamberger* *o*, adfirmavit, cor vivi canis non flaccescere, quando se in diastole remittit. Id de hac opinione verum est, carnem cordis relaxati hætenus suæ dilatationi reniti, uti post mortem etiam renititur, parietes nempe cavi musculi suæ dilatationi resistunt, a qua extenduntur, & resistunt eo magis, quo latius distenduntur *p*. Ex eo simplicissimo experimento sequitur, cor quidem diastolen ex sua natura non moliri, sed quietem.

§. II.

l V. C. in pediculo cyprini scopico *Wrisberg* *satur.* p. 69.
Baker *employment for the* *m* *Nov. feb. idea* p. 143.
microscop. p. 376. in animale *n* *Anthropograph.* L. II. c. 7.
 rotifero *Idem* p. 279. in ani- *o* In diss. qua ostendit,
 malculo. quam crucem aqua- diastolen cordis a sanguine non
 ticam vocat *Joblot* *descript.* perfieri *n*. 35.
de plusieurs microscopes T. I. *p* *Senac* T. I. p. 311, 451.
 p. 55. In animalculo micro- &c.

§. II. *An diastole a fibris carneis fiat.*

Non defuerunt tamen etiam contrariæ sententiæ & vetusti auctores, & nuperi, qui diastolen perinde cordis actionem esse docuerunt, uti systole ejus visceris actio est, & a quiete cordis diastolen nasci negaverunt. Ita *Pechlinus q*, non ille obscurus auctor, diserte negavit, meram cordis relaxationem esse, quæ diastole dicitur, huncque statum ad spiritus pariter, & ad musculosam vim pertinere docuit, eo argumento usus, quod a piscibus fumitur. Eorum enim cor alterne relaxatur & constringitur, quo tempore neque liquorem aliquem admittit, neque expellit, quales quidem alternas relaxationes nos in plerisque musculis reperimus *r*, alii in omnibus statuunt *s*. Paulo ultra progressus *Claudius Perrault*, hætenus veteres secutus, & *G. Ehrhardus Hamberger v*, cordi fibras alias rectas faciunt, transversas alias; & perpetuam successionem alternæ cordis actionis inde fieri docent, quod fibræ dilatatoriæ a constrictoriis superatæ, cum aliqua molestia extendantur; qua quidem injuria se liberare, & ad situm sibi nativum redire conentur, ita cor laxari: & paulo post constrictorias fibras vim, quam a dilatan-

q De corde n. 12.

IV. p. 174.

r Prem. Memoir. sur les part. irritables p. 61.*v* Promiserat causam alterni motus cordis in diss. jam*s* Whytt on vital motions. p. 63. 64.

citata an 1744. Stetit hæc-

t Essays de physique T. III.

nus promissis in Physiologia

p. 227. 237. 232. Conf. L.

Medica p. 43. 50. 51. Vide

Tom. II.

hujus operis L. IV. p. 174.

tibus passæ sunt, pari restitutione vindicare, quæ cordis systolen efficiat.

Qui honores medicos sua virtute non desideratos meruit, Cl. *Browne Langrish* x fere eadem docuit, quæ *Pechlinus*, addidit præterea non contemnendam rationem, prius nempe cor relaxari, quam nova sanguinis unda adveniat, a qua dilatetur.

Verum hæc omnia a levi certe animi attentione refelluntur. Nam plerique primo musculi alternis constrictionum & relaxationum vicibus agitantur *a*, quibus manifestissime unica fibrarum directio est. Deinde in corde ostendimus, externas rectas fibras nullas reperiri *a**. Si vero velis lentiores descensum externi strati *b* fibrarum ita interpretari, ut rectas voces, non ideo fas erit, iis dilatationem cordis tribuere. Eæ enim fibræ, quæ in cordis superficie oculis primæ se offerunt, eas utique exteriores vocare necesse est. Sed eæ fibræ extrema, in omni animale, vidi autem plurima, dum cor constringitur, manifesto trahuntur, tument, durefcunt, in rugas colliguntur, breviores fiunt, & contra, dum cor se remittit, eæ rugæ evanescunt, cor leve, planum & molle fit, ipsæque fibræ evidenter rectæ & longiores nunc sunt *c*. Id experimentum pulchrius

x *Lecton the third on muscular motien* n. 142. 143. 144.

a In *Memoir. sur l'irrit.* l. c. *Fontana leg. irritabilit.*

a* Hujus operis p. 175. 177.

b p. 352.

c Vide *Second Memoir. sur l'irritabilité Exp.* 476. 477. 484. 485. 492. 496. 524. 526. 536. 537. Adde *Walæum* in I. edit. epist. ad Barthol. I. p. 402.

in debili animali, vel in frigidi sanguinis be-
stiola, ut in pisce succedit. Quando enim ra-
ri sibi pulsus succedunt, manifestius est, post
brevem systolen diuturnam diastolen succedere,
in qua cor molle, laxum, & quietum manet
d, donec ad systolen iterato stimulo redeat.
Revoca nunc animo fibras, quas professor vi-
det, in systole agere, eas vero omnino extimi-
strati fibras esse, quas adversarii eo tempusculo
laxari, contra in diastole tendi, contrahi, bre-
viores fieri aiunt, quorum utrumque a nostro,
adeo facili experimento refutatur. Nunquam
etiam, ab irritatis fibris externis cordis, dia-
stole, & contra perpetuo systole sequitur. Si
vero extimæ fibræ relaxationis essent opifices,
eæ irritatæ, adeoque contractæ, cor in laxita-
tem reponerent. Ab irritatione enim fibræ
musculosæ ejus actio sequitur e.

Iterum ostendimus, cordis lacertos & fibras
vehementer intricari, sibi que & densa cellulo-
sa tela *g*, & ramis *h* denique fibrarum ita in-
necti, ut ne quidem cogitari possit, in hoc re-
ticulo musculofo aliquas fibras solas agere & con-
trahi posse, dum reliquæ quiescunt. Porro
certum est, diastolen non vitalem aliquam ac-
tionem esse, quæ robur & vim musculosam
requirat. Diastole enim est, in quam cor lan-
guore suo, aut perfecta demum inertia redit,

d Second Memoir. sur les *e* Premier Memoir. p. 7.
part. irritabl. p. 392. n. 7. &c.
Exp. 481. 550.

g p. 176.
h Ibid.

& in qua aut perpetuo immotum manet, aut certe, donec ab aliquo stimulo nova contractio fuscitetur *k*.

Denique mihi quidem nihil quidquam obscuritatis esse videtur in ea dilatatione, quæ contractionem cordis excipit. Omnis enim musculus, utcunque ejus fibræ disponantur, tamdiu in contractione versatur, quamdiu ejus systoles causa in musculo præsens manet *k**. Aufer eam causam, auferes una contractionem, & sua sequetur laxitas. Vis mordere, contrahitur masseter, durefcit & tumet: aufer voluntatem mordendi, laxatur subito idem musculus, & mollescit. Irritas cor scalpello, constringitur: idem desinente irritatione in diastolen se reponit. Irritas flatu, systole sequitur: expellis aërem, laxatur idem. Admittis in cor sanguinem venosum, contrahitur, expulit eundem, quiescit. Avertis eum sanguinem ab auricula dextra, ab eo ventriculo, perennat utriusve diastole *l*. Evidentissime vero in animalibus frigidi sanguinis conspiciere est, uti ea pars cordis quiescat, quæ inanitur, & contrahatur vicissim, quæ sanguinem recepit *m*. In testudine magnus testis est *Joh. Baptista Caldesi m*. Denique in aure & ventriculo piscium lu-

k Second Memoir. l. c. & hujus operis n. 24.

*k** Legem nuper confirmavit Ill. Fontana & in *ricerche fisiol.*

l l. c. Exp. 515. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523.

m Exp. 512. 513. 514. &c. p. 388. seq.

n Off. notom. fatte nelle Tartarughe. p. 67. Cæterum totam hanc quæstionem fusc pertractavit Cl. Siegwartus in diss. de antagonisme fibrar. cordis.

culentissime adparet, quam vehementer se hi cavi muscoli circa inflatum aërem, aut sanguinem per vincula coercitum, contrahant. Objectiones aliquas suo loco repetemus, quarum resolutio nonnulla phænomena prius cognita ponit. Inanitem cor non subito quiescere, quod nuper argumentum ab Ill. viro probatum est, id quidem ad communem omnium musculorum naturam pertinet, qui post irritationem aliquoties alterne se contrahunt & remittunt, donec in eos motus, sensim languescentes, vis stimuli consumpta sit. Videtur enim contractio muscoli ejus irritabilitatem debilitare & demum destruere, ut quiescere ei necesse sit, etiam si causa stimuli superfuerit: nam cor etiam, quod fusius repetetur^{n*}, lapideo concremento perpetuo irritatum, alterne tamen quiescit.

§. III. *Systoles phænomena.*

In universum de cordis actione diximus. Verum ejus motus dignitas utique minutio-rem & sollicitam considerationem meretur. Ergo de ventriculis primo, deinde de eorum partibus, de auriculis demum ultimo loco dicemus. Quando cor quietum, aut relaxatum, a stimulo quocunque in motum cietur, tunc adparent in externa cordis superficie rugæ, in quas fibræ contractæ crispantur, undulatae, in rana & anguilla evidenter transversæ o, neque in cane,

^{n*} L. XI. L. IV. Sect. V. o Exp. 524. 526. 547.

fele, aut aliis calidi sanguinis animalibus *p* ob-
 scuræ: eæ rugæ cum tremore & palpitatione
 aliqua conjunguntur, neque totum semper ven-
 triculum occupant, & sæpe, in languente in-
 primis bestia *q*, sparsas aliquas, & separatas
 partes carniū cordis agitant, quæ in universi
 demum ventriculi contractionem nonnunquam
 confluunt *r*. Quando vero cor viget, tunc
 utique totus una uterque ventriculus eodem
 tempusculo contrahitur. Et dexter quidem tha-
 lamus sursum ad septum cordis & sinistrum
 ventriculum adscendit *r**. Sinister ad idem
 septum *s*, per lineam tamen breviorē,
 deorsum ducitur.

Una apex quidem cordis uterque ad basin
 adtrahitur, brevior fit, obtusior, & paulum
 antrorsum recurvatur, & dextrorsum ad basin
 se quasi replicat *t*, atque adeo cor brevius red-
 ditur *v*. Ab apice etiam motus cordis incipit,
 indeque versus basin procedit *x*, aliusque mo-
 tus a basi versus mucronem huic quasi obviam
 it. Ea basis, in ratione fere inversa firmita-
 tum, aliquantum versus mucronem descendit

p Exp. 470. 477. 481. 492.
 496. 506. Conf. Volcherus Coi-
 ter obs. anat. p. 124.

q Exp. 476. 484. 494. 499.
 536.

r Exp. 476.

*r** Exp. 475. 515. 534. 536.

537. 539. 542. 543.

s Exp. 475. 534. 536. 542. p. 470.

t Exp. 470. 474. 478. 481.
 484. 492. 496. 501. 510. 515.
 532. 553. 535. 547. 552. 555.

Senac p. 294.

v Exp. 477. 478. 483. 484.
 503. 514. 532. 535.

x Exp. 519. Conf. Bourge-
 lat hippiatrice T. II. Part.

y, & nonnunquam non videtur moveri z. Si præterea cor aperueris, videbis, in eodem constrictionis motu, septum ventriculorum, minime immobile a, utique brevius reddi b, & mucronem ad basin adtrahere & sinistrorsum. Demum ipsos musculos, qui valvulas retinent, breviores reddi, adque ostia venosa accedere c, valvularumque tendineos funiculos relaxare reperio. Hæc omnia in numerosissimis animalibus visa, tuto statuo.

Valentius præterea aliquantum ventriculus sinister d, quam dexter thalamus, in motu suo laborat, & clari viri principium systoles violentius esse observarunt e, ut sensim cor, dum depletur, lentius etiam contrahatur. Denique totum cor durius fit, dum contrahitur & digitum tangentem cum robore repellit f.

§. IV. *Omnino cor, dum agit, brevius fit.*

Mirum est, cum hæc omnia non valde difficulter in quocunque animale inciso adpareant, dum vivit, tamen potuisse contraria omnino eorum, quæ exposui, Cl. viris persuaderi. Et cordis quidem longitudinem, quam in diastole minorem nunc esse scripsi, *Vesalius g* contra in systole au-

y *Exp.* 470. 501. 515. 555.

z *Exp.* 481.

a Uti visum est Cl. viro J. *Walæo Epist.* I. p. 402. *Epist.* II. p. 417.

b *Exp.* 539. 543.

c *Exp.* 543.

d *Exp.* 507. 508. 509. conf.

J. *Fanton* l. c. p. 295.

e *Senac* p. 305.

f *Exp.* 485. 470. 471. conf.

Harvei p. 27. *Bertin thes.* cit. *Mayow oper.* p. 368. in piscibus. *Lister in cochlea &c.*

g l. c. p. 732. 744.

geri scripsit, & in diastole decrefcere. Hujus viri auctoritas alios, ut folet, impulit, ipfum *Riolanum* *h*, qui tamen vivifectiões citat, aliosque phyfiologos *i*.

Verum etiam in nuperrima luce anatomes hæc controverfia Parifiis & Monfpelii agitata fuit, & exftiterunt non ignobiles viri, qui omnino cor in fyftole longius reddi fcripferint, variis rationibus ufi. Aliqui experimentum citarunt, in quo certe dubium fuerit, num cor omnino in dilatatione brevius fiat *k*. Alii numerum roburque fibrarum tranfverfarum æftimarunt, quas oftendebant, cor contractione fua verfus mucronem, quafi compreffum, expellere, cum nullæ vires contrariæ fufficiant, quæ decurgent *l*: eorumque, qui timidiores fuerunt, certe cor in fyftole non brevius fieri contenderunt *m*. Valvulas etiam venofas citarunt, quas credebant in fyftole contra naturam circuitus fanguinei apertum iri, fi in cordis contractione mufculi papillares breviores fierent *n*.

Sed imprimis Cl. *Hieronymus Queye*, aut

h *Arthropograph.* p. 241. pour fervir à l'hiftoire des Vivifectiõs, p. 415. animaux.

i *Hannibal Albertinus* l. c. l. *J. A. Borellus*, Jac. Ben. Winslow in hift. de l'Acad. des scienc. 1725. & 1731. Car. Phil. Glafs l. c. n. 70. *J. Ren.* *Crefc.* *Garengeot* l. c. p. 112.

k In rana *Charleton* *man-tiff. anat.* p. 88. In teftudine *Parifini Academici Memoir.* &c.

n *Hift. de l'Acad.* l. c.

vir Cl. qui calamum amico præstitisse dicitur, *Fournier*, Monspeli per experimenta auctam cordis longitudinem confirmare tentavit *o*, & cum quinquaginta pericula frustra fecisset *p*, demum in testudine vidit, dum cor contrahitur, extendi idem, & a basi apicem recedere, etiam microscopii usu adhibito *q*, & demum limitibus fixis, sententiam confirmavit, quos vidit, a corde in systole producto impelli & incurvari *r*, uti contra in diastole una cor rubere, & una apicem ad basin adduci, idem putat se vidisse *s*. Sed etiam in cane *t*, & bove, vidit, cor digitum vicinum repellere, quando in systole est, non ita, quando est in diastole *v*, & apud laniones denique confirmavit, cor, dum contrahitur & expallescit, longitudinem suam producere *x*.

Varia nuperrimi scriptores reposuerunt. Et quidem Cl. *Bassuel* ad argumentum a valvulis venosis repetitum respondit *y*, earum fabricam contra adversarios facere. Si enim in systole cordis mucro a basi recederet, tunc certe sequeretur, ut adtractis ad apicem funiculis, valvulæ in cordis caveam deductæ ostium aperirent, sanguinique venoso eam viam referarent, quam utique clausam esse oportet, dum cor

o In diss. de syncope, quam in collectionis meæ T. VII. recudi feci.

p p. 26.

q p. 32. 38. 42.

r p. 29. 30. 31. 38. 42. &c.

s p. 30. 31.

t p. 33.

v p. 28.

x p. 34. 35.

y Hist. de l'Acad. 1731.

contrahitur. Mihi vero videtur, valvulas quidem venosas eo tempore a sanguine versus aures repulso extrorsum, inque aurium cavitates, cessuras fore, nisi a musculis suis papillaribus, eo ipso tempore se decurtantibus, retinerentur, inque ventriculum reducerentur.

Aliud experimentum addidit Cl. *Bassuel*: cor nempe aqua replevit, viditque, dum brevius fiebat, aquam expelli z.

Verum mihi quidem experimenta & oculorum testimonia suffecerint. Nam & innumeri illustresque profectores a cor in contractione sua brevius reddi, & ad basin apicem accedere viderunt, & ego tot in periculis vidi, quæ citavi. Vidit in homine Cl. *Dinkler*. Deinde etiam experimentum Cl. *Hieronymi Queye* repetii, & scalpelli aciem ranæ cordi vicinam opposui b. Ita factum est, ut in systole quidem recurvus mucro ferrum evitaret, in diastole vero cor extensum se convulneraret. Denique

z l. c. p. 28.
 a Ecce aliquos. *Volcherus Coiter observ. anat.* p. 124. antiquus, sed sollicitus, operantis naturæ speculator. *Guil. Harvey* p. 27. 49. 165. etiam in serpente. *J. Walæus Epist.* I. p. 402. *Nicolaus Stenonis F. de musculis & glandulis* p. 5. *Denys conference XIV.* *Car. Drelincourt in Canicid.* 2. *Nath. Highmor disquisit. anat.* p. 145. *Thomas Bartholinus anat. renov.* p. 377. *Franciscus Bayle Problem.* XX. P. *Dionis cours d'anat.*

p. 426. *J. Nic. Pecclin de corde* n. 10. *Joh. Bohnius in J. Forresti diff. de cordis motu.* *Raim. Vieussens* l. c. p. p. 84. 85. *J. Mayow oper. omn.* p. 369. *J. Jac. Peyer obs.* 32. *Cl. de Bremond* l. c. p. 292. 311. *Joseph. Lieutaud Essays anat.* p. 236. *Antonius Ferrein hist. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1743. n. 4. *Browne Langrish* l. c. n. 142. Omnes priorum experimentorum in vivis animalibus factorum auctores.
 b *Exper.* 525.

in puero, cui cor extra pectus propendebat, cor in diastole longius, & in systole brevius factum est, perinde ut in bestiis videmus *c.*

Accedit ad experimenti auctoritatem rationis persuasio. Si enim a basi ad apicem fibræ cordis exeunt, si mucro exiguus, basis crassa est, si omnis fibra musculosa, dum contrahitur, se ad medium ventrem colligit *d*, & suos fines ad id medium adtrahit, nullo modo certe potest fieri, quin in hac cordis contractione tenuior mucro ad basin longe accedat, basis ad mucronem aliquantum convergat.

De animalibus frigidi sanguinis lis nondum confecta videtur. Mecum equidem Cl. *Spallanzani* sentit, qui in salamandra, etiam mensuris captis, apicem ad basin accedere vidit. Deinde cum *Felix Fontana* & in rana & in anguilla, & in testudine, cor in agendo longius esse confirmaret, eamque anomalam peculiari cordis fabricæ tribueret, molle enim esse, & in diastole sanguinem in cor receptum, a mucrone ad basin descendere, cum idem superior sit, sic accedente ad basin mucrone cor brevius fieri: in systole vero cor sanguinem suum expellere, ita distendente humore se liberare, & naturalem longitudinem recuperare *e*.

Verum in rana quidem hic Ill. viro aliquid imposuisse certus sum, qui oppositum acus

c In libello Cl. *Martinez*, quem in T. II. collectionis meæ recusum dedi.

d *Premier Memoire* p. 63.

e *Ricerche fisol.* p. 221. In testudine brevius fieri olim scripserat *Epist.* T. IV.

mucronem a corde animalculi in systole non adtingi, in diastole omnino feriri repetito viderim.

Sed neque in anguilla quidquam reperio, cur alio modo in constrictione mutetur. Oblongum enim est *e**, & secundum lineam perpendicularem longius, & superiori fine ad aortam in mucronem exit, inferiori ad hepar producitur, eaque sede crassius est. In eo utique animale, cor dum contrahitur, & expallefcit, longius fieri putatum est *f*, ut eodem tempore mucro sursum abscedat, & pars ima ad hepar propius se adplicet: ut omnino fallerentur, qui anguillæ cor perinde, ut aliorum animalium corda, in systole brevius fieri scripserunt *g*. Verum nuper vir acutissimi judicii *M. Ant. L. Caldanus* & in testudine cor contractum brevius fieri vidit, & in rana, & in anguilla, in qua ego quidem propria experimenta non habeo, nihil reperio, cur aliter se habeat quam in adfinibus frigidi sanguinis quadrupedibus. Si verum est *h*, limaci in contractione sua cor in longitudinem produci, aliam formam ei cordi inesse crediderim, etsi aliter se habere, & apicem basinque sibi propiores reddi, melior testis adest *Listerus i*. In conico vero corde, quale homini, aut quadru-

*e** l. c. Exp. 526. 527.

Muraltus vademec. anatom.

f Ibid. *Remus* diss. cit. p. p. 385.

33.

h Auctor est *M. Gautier*

g *Dominicus de Marchettis Observat. T. III. p. 482.*

compend. anat. p. 73. Johannes i De cochlea p. 26.

pedi, aut avi, ejusmodi motus locum non habet, quia basis quidem nimis crassa a fibris medii, & in medio angustioris, atque adeo pauciori carne firmati cordis superari, & repelli non potest; apex vero transversis fibris, sanguinem undique de medio corde repellentibus, ideo non cedit, quod ejus fibræ manifesto in basin continentur; atque adeo contractæ mobilem mucronem, ad firmam basin, necessario abducant.

§. V. *Cordis pulsus.*

Non vero figura sola cordis in systole mutatur, sed una situs. Nam mucro cordis in quadrupede, dum ad basin accedit, dextrorsum & antrorsum circa basin parum dimotam, tamquam extremus radius circa firmum cardinem, arcum circuli describit, inque termino sui motus costam quintam sextamve, uti varia erit hominis ætas, ictu percutit, quem *pulsus* dicimus. Hinc eodem tempore aorta pulsat, & cor *k*. Neque enim in diastole cor pectus ferit *l*, neque id unquam ab *Harveio m* scriptum est *n*, aut cum vivi animalis spectaculo conciliari potest: sed etiam in homine vidit, prudenter infortunio usus, *Harveius*, in systole arteriæ cor emergere & dilatari, tunc vero

k Riolan anthropograph. p. princ. of practice p. 194.

234. 240. 476. &c.

m De gener. anim. p. 157.

l Uti docuit A. Shebbeare n Shebbeare p. 195.

pectus ferire & prominulum esse, quando sursum erigitur, & in se contrahitur o.

Causa hujus erectionis non una est. Et primum, cum mucro tenuior sit, basis autem crassior, cumque adeo mucro ad basin accedere cogatur, antrorsum versus basin idem ideo incurvatur, quia sinus sinister, pone cor positus, eo ipso tempore perfectissime intumescit & repletur, eo magis, quod etiam aliquis ex contracto eo ventriculo sanguis in auriculam redeat o*, & ipse præterea a vertebis retineatur, neque cedere possit o**. Antrorsum adeo, cum retrorsum non possit, mucro cordis versus basin recurvatur. Ita enim vere se habere, atque ab illustribus in Gallia incisioribus p recte proponi, experimento mihi constitit. In cadavere nempe sinum sinistram aëre replevi, & vidi, omnino mucronem ad papillam salire, solitumque pulsus imitari.

Addit Cl. Ferrein motum conversionis. Cor nempe circa medium in basi punctum arcum circuli describere: ejus motus causam esse, quod sinister sinus vehementius compressus cor magis ad sinistra repellat, quam dexter sinus ad dextra, per sua experimenta p*.

Cum præterea certum sit, in cordis pulsu

o l. c.

o* Sabatier II. p. 146. 147.

o** Feirein duodecim quæst. 256. Ant. Ferrein in 12. quæstionibus Monspeliæ ann. 1737. qui hunc motum rectum vocat, & sinibus repletis tribuit.

p P. Senac *Essays de physique* p. 191. tr. du cœur p. 256. Ant. Ferrein in 12. quæstionibus Monspeliæ ann. 1737. propositis.

p* l. c.

etiam magnas, cordique commissas arterias erigi, & dextrorsum in rectitudinem se porrigere, conjectura Ill. Archiatri nata est, aortam & pulmonis arteriam eodem tempore se in rectitudinem extendere, & cor cogere, ut arcum circuli describat, eo majorem, quo cordis quæque pars a basi remotior est *q*. Denique etiam dextræ auriculæ, eodem tempusculo repletæ, aliquas in pulsu partes esse Ill. Archiater expertus est *r*.

Aliquanto simpliciores pulsus in corde causam esse adparet, cum in ranis auriculam & posteriorem habentibus, & unicam, neque curvam, neque adeo se erigentem arteriam, inque pullo incubato, cujus arteriæ minimam ad cor rationem habent, tamen perinde cor, dum contrahitur, antrorsum se erigat. Ita nuper Cl. *Fournier* *r*^{*} ostendit, cordis pulsationem non esse a resistentia sinus sinistri repleti. Aqua sinum dextrum replevit, vidit cor perinde ad costas accedere, uti faccedit, quando auriculam sinistram repleverat.

Ipsam vero cum corde diaphragma aliquantum dextrorsum & antrorsum recedit *s*: nam a mucrone undique tumente percutitur *t*. Contra etiam inspiratio, & pulmonum plenitudo, situm cordis aliquantum mutat, & mucronem

q Senac l. c. *Lamure* Anonymus ad l. de Cacao. Aliquid conferre *Sabatier*.
r p. 357.

r^{*} *Journ. de medec.* 1774. Juill.

s *Exp.* 476.

t *Exp.* 502.

antrorsum cogit , ut totum viscus magis ad perpendicularum ponatur *v*.

§. VI. *Auricularum contractio.*

Sequitur , ut contractionem auricularum cordis describamus , in quibus observandis nuper in vivis animalibus multus fui α . Et in dextra quidem auricula omnes diametri una minuuntur. Nam apex quidem cæcus corrugatur , descendit y , adque cordis carnem deprimitur , ut manifesto motum , a supremis ortum , deorsum continuari videas. Eodem tempore alius ejus auriculæ motus ab inferioribus sursum tendit z , & pars ima adscendit , atque adeo tota auricula brevior fit. Cristatæ adpendices una eriguntur quasi & curvantur. Præterea cum auricula dextra convexa sit , & innumeri arcus circuli cogitari possint , qui ab ostio venoso cordis ad sinum dextrum , sedemque fossæ ovalis ducuntur , etiam hi arcus breviores sunt & rectiores. Dum breviores redduntur , dexter limes auriculæ sinistro propior fit , & vicissim , atque adeo auriculæ diameter transversa minuitur a , adeo conspicue , ut longiores illi arcus , qui denticulos crenati marginis auricularum

v Exp. 500.

α Anno 1756. post editos
Comm. de part. irritab. &
Sensibilibus. Vide in Oper. anat.
min. T. I. p. 164. seq.

y Second Memoire Exp. 477.

482. 510. 538. 539. 556. Lanc.
cist. p. 57.

z Ibid. Exp. 482. 548. 126.

a Exp. 533. 537. 538. 539.
540.

larum efficiunt, manifesto ad medium axin, inque aurem reducantur. Denique, cum antrorsum convexi sint, & retrorsum in rectitudinem exporrigantur, diameter auriculæ ab anterioribus ad posteriora tendens minuitur *b*. Eo confert sinus sinister, qui cum septo aurium, eodem tempore, antrorsum arcatur, atque adeo nulla diameter auriculæ dextræ est, quæ brevior non fiat.

Sinistræ auriculæ eadem phænomena sunt, quæ adpendicis dextri atrii cordis. Evidenter enim eadem mucronem suum contra partem latioremsursum retrahit *c*, & diametrum arcuat *d*, ut denticuli crenarum introrsum reducti, sibi propiores fiant, & incurventur. Hæc cum rapidissimis quibusdam tremoribus *e* conjungi solent, quos in dextra auricula non perinde observamus. Qui vero sinus dicitur, is & in transversum angustior fit, & inprimis antrorsum ad cor comprimitur.

§. VII. Cor in systole evacuatur.

Supereſt, ſiquidem & in corde & in auriculis omnes una diametri minuuntur, ut ca-

b Exp. 555. 556.

c Exp. 541.

d Exp. 539. 545.

e Exp. 507. 508. 509. 534.

Phænomena vidit Cl. Bertier, dilatationem vero vocavit, quæ contractio est, & ad recipiendum sanguinem de ven-

triculo dextro eas dilatationes repeti putavit. Sed fiunt, quo tempore ventriculus dexter nihil per impervium pulmonem ad sinistram aurem mittit; *Physiq. des corps anim.* p. 155.

veæ eorum receptaculorum arctiores reddantur. Et in auribus res in vivis animalibus manifesta est, & in ventriculis. Horum enim arctatio in cordis systole & resecto mucrone, & visu & tactu demum confirmatur. Digitus enim in ventriculum missus, constringitur *f*, dum ventriculus uterque ad septum cordis propius accedit *g*. Magna tamen vi urgeri, ut nonnullis Cl. viris excidit, ego quidem non reperi *h*. Addidit vir Cl. demonstrationem, quomodo ventriculi intus magis quam extus intumescant, quia interiores spiræ majores omnino rugas faciunt *i*.

Si cordis & auricularum caveæ arctantur, sequitur, ut sanguinem, aut quemcumque continent liquorem, eadem expellant. Non valde necesse fuerit, vetustum errorem Cl. Viro-
rum *k* repudiasse, qui in cordis diastole sanguinem quasi exundare, & corde egredi scripserunt: quem errorem ab *Aristotele* ortum *Cartesium* l

f Exp. 475. 485. Confer testes, prioris potissimum seculi, pene innumerabiles J. *IVallæum* Epist. I. p. 402. Epist. II. p. 417. *Nicolaum* Stenonis F. de muscul. & gland. p. 29. *Thomam* Bartholinum anat. renov. p. 377. *Isbr. v. Diermhoeck* anat. p. 272. J. *Alph. Boerellum* l. c. L. II. propos. 38. 44. 50. 52. *Petrum* Bayle Probl. 20. R. *Vieußens* neurogr. p. 21. J. *Fantonum* l. c. p. 295. *Jos. Exup. Ber-*

tin thes. cit. Hier. Queye l. c. p. 41.

g *Walæus* l. c.

h Exp. 475.

i *Charleton* three lectures p. 51.

k *Auctor isagoges anatomicae*, quæ passim *Aristoteli* tribuitur, dudum scripsit, humorem ex corde ebullientem pulsum facere.

l *De format. fetus* p. 11. etiam post *Harveii* contraria experimenta p. 197. &c.

cum adfclis *m* priori seculo ipfa hypotheseos necessitas renovare coegit. Cum enim sanguinem in corde ab igne quodam innato effervesce & rarefieri persuaderentur, error certe errorem genuit, ut quasi spumam calefacti sanguinis de corde ebullire docerent, ita vero omnino eodem tempore & cor, & arteriæ, & inanirentur, & replerentur *n*.

Non defuerunt veriori sententiæ priori jam ævo sui gravissimi vindices *o*. Et certe in vivis animalibus, quæ eo tempore plurima incidebantur, visu facillimum est, & in vena cava *p*, & in auricula utraque *q*, & in ventriculis *r*, sanguinem, aërem, chylum, tunc expelli, quando hæ contractiles cavæ constringuntur. Et denique resecto cordis apice luculentissime conspicitur, ut in singulis cordis contractionibus pars aliqua cruoris per id vulnus propellatur *s*. In piscibus *t*, ranisque, & in pulsatili

m C. v. Hoghelande, Wolf. Senguerd Philos. natur. p. 418. J. Jac. Waldschmidt institut. medic. ration. c. 3. n. 11. 12. 13. Theod. Craanen de homine p. 154.

n Cartesius etiam experimentum proponit, apud Bevermyck epist. quæst. p. 132. Sanguinem nempe de incisa arteria effluere, quo tempore cor extenditur, non eo, quo constringitur. Eodem tempore cor & arterias dilatari in ove se vidisse auctor est Malvicinus util. collect. p. 11. & similia docet Gavetus l. c. p. 151. neuter tutus auctor.

o Guil. Harvei p. 23, 181.

J. Walæus Epist. I. p. 401. & in Epist. II. Car. Drelincourt Canicid. 2. Joach. Targirus physiolog. p. 166. Herm. Boerhaave Instit. rei. Med. n. 180. &c.

p Exp. 475. 479. 480. 532. 343. 548. 553. 554.

q Exp. 470. 479. 480. 482. 485. 491. 498. 514. 537. 540. 543. 551. 556.

r Exp. 471. 481. 551.

s Exp. 471. 485. Harvei p. 23. Car. Drelincourt Canicid. 2. J. Walæus Epist. I. p. 393. Thomas Bartholinus anat. p. 374.

t Harvei p. 58.

pulli incubati corculo, inprimis pulchrum est visu, ut rubra nubes sanguinea, a contracta vena cava in auriculam, (quæ his animalibus unica est) inpellatur, eamque cærulescente purpura repleat, tumidamque reddat: & paulo post ea auricula contrahatur, expallescat, rubramque suam nebulam in ventriculum urgeat, quæ sensim, neque eodem tempore, per eam caveam, quam longa est, se diffundat: ut denique ventriculus & ipse se constringat, a mucrone sursum expallescat, & suum sanguinem in aortæ bulbum expellat, qui & ipse cruore turgidus, cærulescit. In astaco vidit *Thomas Willis v*, in testudine *J. Baptista Caldesi x*, & *Hieronymus Queye y*, ego in rana *z* & anguilla *a*.

Num cor penitus evacuetur, dubitatum est. In animalibus certe inter experimenta pereuntibus, plerumque aliquantum sanguinis in corde manet, quem compresso etiam, & inter digitos eliso corde, ægre, etiam post mortem, omnem expellas. Ita in cadaveribus pariter humanis fere omnibus grumi aliqui sanguinei, aut polyposa coagula, in cordis & aurium caveis reperiuntur *b*. Quare non absque experimentorum fide Ill. Archiatrorum comes *Pe-*

v De anim. brut. p. 21.

x l. c. p. 65.

y l. c. p. 30. 21.

z Exp. 487. 511. 516. 530. 546. 548. 549. 553. 554.

a Exp. 526.

b In corde subito mortui aliquis sanguis *Lancis. obs. post. tr. de mortib. subitan. obs. 2.*

trus Senac c, & olim *Bartholinus d*, aliique *e* clari viri, negarunt, in systole sua cor penitus evacuari. Et nuper eo rediit Ill. *Felix Fontana*, in ipso pullo *e**, & in frigidis animalibus ruborem aliquem in corde contracto superesse *e***; in calidis vero animalibus enectis nunquam non aliquam sanguinis copiam se in corde reperisse *e****. A nuce vomica data cor sanguine plenum *ot*. Nam etiam in systole aliquantum sanguinis in cor redire ex arteriis coronariis *ett*, cum pariter etiam a sanguine de carotide redeunte repleatur *ettt*.

Est tamen cur persuadear, in ultima quidem illa & languente systole, quæ vitæ seriem claudit, cor inpotens maligne se sanguine liberare, cum præterea ambeuntium partium pressio ablata sit: in vivo vero & sano animale, aut perfecte cor se sanguine inanire, aut minimam certe particulam superstitem retinere, quæ cum uncia comparari nequeat *f*. Et primo, si insignior aliqua sanguinis copia in corde maneret, irritatio perpetua *g* nasceretur, quæ cordis perennes labores excitaret, neque sineret eum musculum in legitimam laxitatem se remittere. Circa tantil-

c p. 348.

d *Anat. tert. renov.* p. 375.

ea *Contuli Epist. ad Lancisium* ventriculus sinister a fume carbonum.

e *J. God. Brendel* in programm. ad disp. *Cl. Schmidtii*.

*e** *Ricerche* p. 117.

*e*** *Ib.* p. 118.

*e**** *Ib.* p. 120.

et *Stralsund. Magaz.* I.

ett *Ricerche* p. 105.

ettt *Mieg thes.* a. 1776.

f *Senac l. c.*

g Ut in *Experimentis* 515. 516. 518. 526. 550. 551. 552. 553. *Conf.* 477. 507. 508. 509.

lum enim aëris , cum spuma subacti , diutissime se cor ranæ contrahit *b* , & minimam sanguinis copiam ad cordis motum ciendum sufficere , per apoplecticorum phænomena persuasus docuit olim *i Archibaldus Pitcarne* , cum quo viro mea experimenta consentiunt. Nam cum cordis ventriculos , in vivo animale , quantum poteram , premendo evacualsem , tamen exigua , quæ supererat copia , cor non sivit quiescere. Deinde in animalibus quidem frigidi sanguinis cor in systole expallescit *l* , per toties repetita experimenta : omnino vero non posset pallefcere , nisi sanguinem caveis suis contentum hactenus expulisset , ut non ea superesset copia , quæ per albam carnem pellucere , & ruborem diastoles in systole conservare posset. Sed auriculæ etiam in animalibus calidis , cum tenues sint , manifestissime contractæ expallescunt *m*. Denique in nuperis meis , quæ in pullo incubato feci *m** , sæpe certissime vidi , omnem , ruberrimum animalculi sanguinem , de albo & pellucente corde hactenus exprimi , ut omnino solus , absque ulla purpura superstite , albor teneri cordis superesset. Eadem phænomena in salamandra , & in rana , *Spalanzanus* , in pullo , qui ovo continetur *Harveius* & *Caldanus* viderunt. Id facile dederim , debile *m*** cor nonnunquam mi-

b Exp. 479. 480.
i Elem. Med. Mathem. L. II. c. 2 n. 7.

l Exp. 517. 518. 519. *Chirac* adv. p. 292. de corde in universum.

m *Harvei* p. 40. 58. *Coiter* p. 224. *Muralt* vademec. p. 267. Exp. mea 492. 413. 514.

515.

*m** Oper. min. p. 265.

*m*** Irritabilitate destructa *Straß. Magaz.*

nus bene evacuari, cujus eventus testimonium est in historia monstrosi infantis *Dinkleriani*, ejus enim cor nudum non evacuabatur. Robustum vero cor & impatiens stimuli, utique in homine perinde inaniri æquum est, ut in pullo & cane inanitur. Ipse demum sibi *Fontana* respondet, qui cor ut alios musculos irritabilitatem ipsam per motum amittere scripsit, quare minime evacuatum tamen alterne laxari, quod & ipse vidi *m****.

Si autem omnino cor non integre evacuetur, tamen necesse fuerit ad eam angustiam idem reduci, ut quolibet in pulsu nihil de sanguine retineat, nisi eandem semper sanguinis copiam, quæ in primo pulsu in corde superfuerat.

Si enim unica gutta in quoque pulsu intra ventriculos retinqueretur, & decem guttæ in decem pulsibus, intra unicum diem, in fere 100000. pulsationibus, enormem copiam sanguinis in corde manere necesse foret, qualem omnino continere non posset.

Quare quoties cor ob valvulas aorticas obstructas, ob concrementum osseum cor compri-
mens, aut ob aortam arteriam osseam, aut ob arctatam, aut polypos maligne evacuatur, toties innumerabilibus in exemplis idem miram in molem dilatatur, qualem, quæ totum pectus reple-
ret, in juvene vidi. Vidit id *Lancisus m*****, & exempla collegit valde numerosa.

*m*** Ricerche* p. 129.

146. *Vieuss. mal. int.* II. p.

*m**** Lientaud* II. p. 49.

178. *E. M. C. Dec.* III. ann.

Med. Transf. III. p. 16. V. p. 3. *obs.* 24. *Fanton obs. &c.*

Neque defunt exempla ubi vel auricula vel cor ipsum eam ob causam denique dissiluit, cum arteria aorta concremento osseo urgeretur, aut valvulæ induratae maligne paterent.

Corollarium ejus theorematis est, quod cor eo minus sit, quo robustius & perfectius se deplet. In leone & auriculæ & cor ipsum parvum est Cl. viro teste C. F. Wolf *m****. Contra in debilibus, in hydropicis cor amplum est *m†*. Denique uti frequenter aliquantum cruoris in cordibus hominum ægrorum reperitur, quem debilitas funesta non sinit expellere, ita & exempla sunt cordis integre inaniti *m††*.

§. VIII. Cordis diastole.

Cordis constrictionem diximus. Eam sequitur alter status, sive diastole, quamprimum cor se aut toto sanguine suo, aut certe parte ejus plurima liberavit. Etsi enim in frigidi sanguinis animale non perfecta cordis systole est, etiamsi per ligatam aortam sanguis nequit effugere, tamen etiam in hoc experimento aliqua parte sui cruoris cor se exonerat *n*, quem in auriculam retroagit, & perfecta diastole, unice ex apice cordis *o* in rectitudinem restituit.

*m**** Nov. Comm. Acad. ann. III. P. IV.
Petrop. XVII.

m† Harder apiar. obs. 77.

Robert trait. de medec. II. p.
385. E. N. C. Dec. III. cur.

§. 6. obs. 8. & cur. 3. obs. 3.

m†† Greding in advers.

m††† Med. Transf. III. p.

5. 9. Lieutaud. sepulcr. II. p.
17.

n Exp. 551. 553. &c.

o Exp. 550. 552.

to adgnoskitur, brevisque est, & novæ contractioni continuo cedit *p*.

Quando systolen descripsimus, una fere diastole dicta est, habet enim omnia systoles contraria. Rugæ fibrarum cordis evanescent, totumque hoc viscus leve *r* fit, planumque & molle. Idem in rectitudinem se porrigit, & basis ab apice & apex a basi recedit *s*, & una retrorsum sinistrorsum migrat. Sed etiam ventriculorum carnes a septo relabuntur, hinc digitus cavæ cordis inmissus laxatur.

Auricularum etiam status restituitur, ex quo per systolen suam excefferunt. Dextræ ergo apex resurgit, pars ima descendit: auricula sinistra sursum redit, sinus sinister retrorsum laxatur. Crenæ magis conspicuæ redduntur *s**.

In ea omnium fibrarum cordis remissione parietes ejus visceris, ejusque atria, novæ distentioni, solo suo pondere, neque ulla vi contractili, resistunt, & vi inertię. Facillime ergo aer lenissime impulsus, aut venæ cavæ, & pulmonalium venarum constrictio, eam resistantiam superat, ut omnino ad cordis repletionem exigua vis requiratur, neque videam, cur alii respirationem ad explicandam vitalis musculi dilatationem advocaverint *t*, alii fibras rectas ad eum usum finxerint *v*.

p Exp. cit. ad not. g. h. 310.

p. 261. 262.

r Exp. 524.

s J. Walæus Epist. I. p. 402. Senac p. 312.

*s** Lientaud Mem. I. c. p.

t Jac. Drake Anthropogr.

L. II. c. 7. Phil. Transact.

n. 281. ven. Bertier in physique du corps animé p. 359.

v Hamberger physiol. p. 350.

Quietis in cordis statum in animalibus sub mortem languentibus x , & frigidi inprimis sanguinis rarique pulsus, speculari oportet, in quibus diuturnior & perfectior est y .

§. IX. *Venæ Cavæ Pulsus.*

De unico cordis pulsu hætenus locuti, ordinem nunc persequemur, quo diversæ cordis partes in motu sibi succedunt, & tempora comparabimus, quibus singulæ in officio sunt, & sanguinem demum a prima cordis cavea ad ultimam comitabimur.

A vena cava initium facere oportet. Ejus pars aliqua & supra cor, & infra cor, musculosis fibris confirmatur, & irritabilem naturam induit, ut omnino acicula, cultri cuspidē, impulso aëre, aut ab electrica scintilla, aut a sanguine laceffita se constringat z , angustior, planiorque fiat, & decolor, ad cordis similitudinem. Quanta pars hujus venæ musculosa sit, nondum accurate definivero, in ranis certe etiam hepatici venæ cavæ a rami, & cava vena ipsa ad hepar usque manifesto contrahitur b . In calidi sanguinis animalibus pulsatio ve-

x Exp. 481. 492.

y Harvei Exerc. I. c. 2.

z J. Maria Lancisius l. c. p. 84. Senac T. I. p. 310. 329. T. II. p. 217. & in no-

stris nuperis experimentis. Magis quam cor irritabilem facit Ill. Senac p. 329.

a Exp. 548. 553. 554. 125.

b Ibid.

næ c cavæ superioris, & inferioris d certa est, eaque hinc quidem summo pectore, inde hepate terminatur. Superiorem truncum fortius constringi; atque fibras habere robustiores, Cl. auctor existat e, ego experimentum proprium non habeo.

Sollicite de his agere oportet, ne sanguinis a respiratione refluxum, aut diaphragmatis in venam cavam inferiorem imperium, cum vera ejus venæ innata vi confundamus. Quare prima exempla a ranis f sumimus & piscibus g, in quibus neque pectoris constricti pressio, neque septi transversi vis quidquam in venam cavam potest. In his adeo animalibus primæ inter partes cordis numerandæ sunt venæ cavæ, superior & inferior, quæ manifesto, & valido impetu, sanguinem suum in aurem cordis evidentissime impellunt, & rubrum cruorem, quem continebant, in eam aurem conspicuum expriment. Sed neque ab auricula in venam cavam rejectus sanguis solus pulsus facit h. Eadem paulo post remissæ, iterum manifesto sanguine a vicinis venis replentur, & intumescunt, & lateſcunt, & e cæruleo colore livent i. Ita nascitur verus *pulsus venosus*, a claris viris dudum in tabulas medicas relatus. De

c *Exp.* 473. 543.

d *Exp.* 120. Hepate & jugulo *Walæus*.

e *Gunz de humorib.* p. 142.

f *Exp.* 479. 480. 530. 532. 548. 549. 553. 554. 126.

g *Exp.* 526. 527. In anguilla *Muraltus vademec.* p. 585.

h *Schwartz de vomitu & motu peristal.* n. 17.

i *Idem ibid.*

frigidis animalibus diximus. In calidis bestiis, equo, cane, felē, cuniculo aliisque, & a me idem venæ cavæ motus repetito visus est *k*, & illustrium prioris *l* seculi incisorum testimonio confirmatur. Recte viderunt etiam Cl. viri, in animalibus languentibus sæpius venam cavam pulsare, donec unicus auriculæ ictus succedat *m*. Recte iidem monuerunt, venæ cavæ motum pertinacem esse, atque diutissime, etiam per aliquot horas *n*: etiam post plenam cordis *o* quietem superesse, ut sæpe omnino ea vena ultima in toto animale vitæ signa edat, post tres & ultra horas.

§. X. *Et Auriculæ dextra.*

Sequitur auricula dextra, quæ sanguinem a vena cava impulsam recipit. Aliquem

k Exp. 474. 475. 510. 543. 556. 120.

l J. Valæus l. c. p. 783. nuper ed. V. F. Plemp. fundam. med. p. 203. & in nunit. fundam. Plemp. p. 129. in ove, vitulo & porco. F. Sylvius diff. med. VII. n. 87. p. 131. Nicolaus Stenonis F. in coroll. ad disput. inauguralem suam p. 109. 110. 111. 112. & in Epist. 26. Cent. IV. Barthol. & in Act. Hafniens. vol. II. obs. 46. p. 142. seq. Olaus Borrichius Epist. 51. Cent. IV. ad Bartholinum p. 333. Richardus Lower c. 2. p. 73. edit. bat. p. 49. ed.

angl. J. Jac. Wepfer de cic. cut. aquat. p. 172. Anatomici Amstelodamenses in observ. colleg. priv. select. p. 22. J. Fantonus l. c. p. 297. J. Mar. Lancisius p. 84. 85. 86. Vidit idem phænomenon, sed minus recte ad aortæ compressionem retulit Guil. Comper append. anat. Bidl. ad f. 10. in N. Stenonis F. l. c. J. Fantonus l. c.

n Exp. 473.

o Borrich. l. c. J. Jac. Wepfer l. c. J. Fanton l. c. N. Stenonis F. l. c. Lancis. l. c. & in nuperis meis experimentis.

etiam a cordis ventriculis retrogradum *o** diximus: nonnihil denique addit Cl. *Fontana* *o*** ab arteriis coronariis, quæ nunquam non plenæ cum sint, & incisæ nunquam non sanguinem fundant, nullo etiam non tempore sanguinem suum per venas in auriculas dabunt. Denique addimus sanguinem ostiolorum sive minimarum venularum in auriculæ caveam patentium *o****. Eo sanguine ad supremam appendicem pulso *p* auricula tota turget, se erigit, cristas explicat, riget, sanguine violaceo pellucet. Non firmas vero illas de trapezia *q* figura speculationes esse, facile adparet consideranti, quæcunque auriculæ figurâ fuerit, facile sanguini venoso cessuram, dum modo ejus area multo, quam venæ area amplior fuerit. Et variæ figuræ auriculas in animalibus natura fabrefecit, unice vero cava vena semper ampliores.

Ea ergo auricula, ut summe irritabilis est, continuo postquam sanguinem recepit, contrahitur *r*, expallefcit *s* & miro vigore cruorem suum expellit. Duæ vero viæ sunt, quibus is sanguis pressus cedere potest. Prior, ad venam cavam utramque patet. In nullo enim animale, mihi noto, valvula aliqua auriculam inter cavamque venam reperitur, præter imperfectam illam *Eustachianam*. Quare in omnibus

*o** n. 13.

*o*** *Fontana ricerch.* p. 106.

Mieg thes. 1776.

*o**** *Seçt.* II. p. 230. seqq.

p Exp. 492. &c.

q Hamberger de dilatat.

cord. n. XXII.

r p. 256. 257.

s Harvei p. 49. 58. *Lancis.*

p. 68.

bestiis, a me unquam incisus *t*, sanguis ex aure contracta in utramque venam cavam, ejusque etiam proximos ramos jugularem *v*, mammariam *x*, venas hepaticas *y* & abdominales *z* retroit. Sed etiam alii profectores in testudine *a*, in rana *b* aliisque animalibus *c*, eum sanguinis de auricula reditum viderunt. Facile intelligo, in animale vegeto & fano, huic retrogressui obstare eam, quæ nova undique ex venis ad cor redit, sanguinis columnam; omnia etiam magis plena magisque compressa esse, quam quidem in incisa bestia sunt, cui partes cavæ quæcunque, magna parte suæ pressiois liberatæ, sponte hiant.

Verum sunt tamen proculdubio occasiones, neque eæ paucæ, in quibus vivi etiam animalis sanguis de auricula dextra in venas cavas retroagitur; quoties nempe difficultas aliqua in ipsa auricula, in ventriculo dextro, in pulmone, & denique in altero etiam ventriculo, & in aorta, circulationem sanguinis moratur. In nixu quocunque notissimum est, faciem intumescere, & sanguine repleri. Nempe eo in statu sanguis per pulmones ægrius trajicitur,

t In fele *Exp.* 475. 478.
498. 556. 118. 119. 122. 123.
128. In cane *Exp.* 482. 491.
510. 537. 540. 120. 121. 124.
125. In rana *Exp.* 548. 553.
126. 127. *Vid. Prem. Med.*
p. 392.

v *Exp.* 118. 128.

x *Exp.* 556.

y *Exp.* 126. 127.

z *Exp.* 556.

a *J. B. Caldesi* l. c. p. 67.

b *J. Fontanus* p. 297. Venas pulmonales ligaverat.

c *Senac* T. II. p. 328. 509. *Ant. le Camus* in thesi, cujus titulus est *An pulsat. desect. in venis* &c. Parisiis edita, & in collectione nostra recusa T. II. p. 566.

hinc in auricula dextra, & corde dextro congeritur, & utramque caveam distendit *d*, non sine periculo, si causa perpetua fuerit, quæ sanguinem moratur, qualis polypus est *e*, aut vitiosa alicujus in corde cavea angustia *f*, aut impeditus pulmo *g*. Exemplorum iterum plus satis est. A solo impedimento in valvulis arteriæ pulmonalis apud, *Viessenium g**, *Morgagnum g***.

Ab aneurysmate arteriæ pulmonalis in *Philippo Nerio g****.

Ab impedimento in aortæ exitu, & valvulis aorticis ossis aut crassioribus.

In orthopnoca & pulmone a sanguine impedito dextræ cavæ cordis amplissimam sunt. Auriculæ enim tenera inter musculosos laceratos membrana est, & facillime dilatabilis, adeoque non difficulter a collecto sanguine diducitur, & demum rumpitur. In ejusmodi ergo sanguinis in auriculas

d In Phonascis frequentes ossæ, hinc mira dilatatio, & sunt auriculæ, & ventriculi palpitatio *Mem. de l'Acad. des scienc. avant 1699. T. II. p. 238.*

e In hypochondriaco, cui *g* Auricula dextra triplo polypi in dextra auricula, major, cum pulmo consumtus esset *C. Stephanus p. 216.* hæc cavea amplissima *Lancisus l. c. ed. nov. p. 311.* & simile exemplum *Fantonus* auricula amplissima *Loeske observ. anat. chir. p. 35.* habet in obs. 22. Antiquæ & duræ concretiones in dextro ventriculo, hinc vena cava, & dextra auricula, & cor dextrum amplissima *Senac T. II. p. 417.*

f In aure dextra particula ossæ, hinc mira dilatatio, & palpitatio *Mem. de l'Acad. des scienc. avant 1699. T. II. p. 238.*

g Auricula dextra triplo major, cum pulmo consumtus esset *C. Stephanus p. 216.* Cum scirrhus pulmonis dextra auricula amplissima *Loeske observ. anat. chir. p. 35.*

*g** *Hist. de l'Acad. 1701.*

*g*** *Manett. in vita Cocchi. cur Orteschi dedi. T. II. Pisoni.*

*g**** *Haen rat. med. VI. Lanais. Meckel. in Mem. de l'Acad. de Berlin.*

collectionibus, utique cum vitæ humanæ securitate, conjungitur sanguinis de auricula in venas proximas refluxus, quæ sanguini ante pulmones expectanti pro receptaculo, & pro altera quasi auricula sunt. Hinc a polypo perpetua, & ex ordine succedens, pulsatio venarum jugularium *b*. Cum polypi in utriusque arteriæ grandi trunco essent, jugularium venarum pulsatio *i* adparuit.

Periculum vero funesti casus ostendunt, in quibus denique & tricuspidēs valvulæ laceratæ, & vena cava rupta fuit, cum cor amplissimum *k*, aortæ ostium brachii capax, & aneurysmate distentum esset. Quare adparet, cur natura venæ cavæ prope cor musculosas fibras dederit, ut refluxo nempe sanguine se efficacius liberaret: tum, cur nulla valvula refluxum sanguinis in auricula inhibere voluerit, quod facillimum fuisset. Nam *Eustachii* valvula, etsi aliquantum reditum sanguinis in venam cavam inferiorem moratur, omnino tamen non impedit, cum dimidiam ad summum, alias tertiam, aut minorem denique venæ latitudinem teneat *l*; a superiori vero vena cava nihil avertat. Omitto, quod etiam tempore contracti cordis sanguinem venosum retineri necesse sit, quem eo tempore in vena cava inferiori retineri *Cl. viri*

b Morand *Memoir. de l'Acad. des scienc.* 1704. p. 158.
cad. 1732. p. 432. 433.

k Laurent. *anat.* p. 495.

i Homberg, *Memoir de l'Acad.* 1 p. 115.

viri scripserunt *m.* Nempe tempusculum valde breve est, neque ejus moræ majores noxæ esse possunt.

Verum alterum, præcipuum, ab auricula dextra iter, utique ducit in ventriculum ejus lateris. Valvulosus enim anulus *n.*, qui in ostio ad ventriculum ducente reperitur, patet medius, & facile cedit sanguini auriculæ, per inane lumen eunti, & magis patefcit, quando is ipse conus sanguineus, ab axi nitens, a medio anuli ostio extrorsum, versus cordis parietes, mobilem anulum impellit, iterque sibi ipsi parat. Omne enim fluentum in flexilem canalem receptum agit secundum lineas, ad axin sui canalis perpendiculares. Sed ii radii, in exemplo, undique in anulum valvulosum ducunt, eoque impulsio, ad cordis parietes.

Sed etiam morbi, paulo prius citati, hoc sanguinis iter confirmant. Obstacula enim in eo ventriculo nata faciunt, ut dextra auricula intumescat, manifesto argumento, ex ea auricula in contiguum ventriculum sanguinem ivisse, & ab obstaculo reperto moram passum, inque auricula residem, vim suam distendentem explicare.

Verum etiam si hæ rationes satis firmæ sunt, superest tamen validius oculorum testimonium. In ranis ergo & piscibus, inque pullo incubato, quibus auriculæ & cor pellucet,

m Vieussens obs. d'anat. &
de med. pract. p. 164.

n p. 138. seqq.
o In exemplo III. Senaci.

manifesto rubra nubes sanguinea ex auricula in ventriculum se diffundit, ejusque longitudinem percurrit, donec ad mucronem perveniat. Sæpe vidi in utraque classe *p*, viderunt in animalibus frigidi sanguinis viri in hoc studio primarii *Guilielmus Harvey q*, *Johannes Walæus r* *Richardus Lower s*, *Oligerius Jaiobæus t*. Sed etiam in calidis bestiis auriculam contractam sanguinem *v*, & chylum *x* in dextrum ventriculum *x** expulisse vidi.

§. XI. *Ut arteria pulmonis claudatur.*

Non oportet hoc loco neglexisse, dum ostium venosum aperitur, eam partem ejus anuli, quæ latissima est, propelli, & arteriæ pulmonalis ostio prætendi, idque totum, aut certe magna ex parte claudere. Ita cavetur, ne a debili auriculæ vi sanguis in arteriam propellatur, & omnino caveri certum est, cum in vivo & sano animale manifesto arteria eo tempore expallescat, quo auricula contrahitur, atque adeo sanguinem eo tempore nullum accipiat. Dudum hæc valvulæ tricuspидis maxime artificiosa proprietas nota fuit, & ipsi certe *Galeno*

p Exp. 548. 549. 551. 553. remberg. in colleg. anat. p. 554. 371.

q p. 26. 40. 58. 282. &c.

v In fele Exp. 470.

r Epist. I. p. 400.

x Exp. 543. in cane.

s c. 2. p. 45.

*x** De mot. sang. per cor

t De ratib. p. Conf. P. Lau- n. 5.

y, tum nuperorum plurimis z. Rejicit equidem hoc nobile privilegium nuperus vir Ill. a atque valvulas, de quibus sermo est, a columnis carneis distrahi objicit, ita fieri, ne arteriam pulmonalem tegere queant. Et omnino fateri oportet, in avibus anulum valvulosum minorem b videri, quam qui hoc officio defungi possit: in languente etiam & emortuo animale sanguinem ex contracta auricula in arteriam penetrare c. Verum in pectore integro, in vivo animale, omnia sibi propiora esse, & valvulas vias sibi commissas fidelius claudere, certum est, & ita fieri res ipsa ostendit, siquidem omnino arteria sanguinem non accipit, dum eum auricula expellit. Non oportebat hoc valvulæ officium novam rem, sibi que primum cogitatam, Ill. viro d videri, quæ toties dicta, & controversiis agitata fuerit.

§. XII. Sanguis venit in dextrum ventriculum

Eo tempore, quo auricula contrahitur, laxus, & immobilis, ventriculus se remisit: ut proprio loco uberius ostendetur. Si enim cor in systole versaretur, nunquam certe, cum

y Arterias clausas esse, W. Cheselden l. c. p. 180. de quando sanguis venosus in cor aortæ equidem ostio. venit de usu part. L. VI. c.

15. z J. C. Arantius obs. anat. p. 34. fuse Georg. Buffiere let- tre à M. Mery p. 22. 24.

a Senac l. c. p. 88.

b p. 147.

c Harvei p. 40.

d Lieutaud physiolog. p. 67.

tanto robustius sit, ab auricula se dilatari sineret, aut sanguinem reciperet.

In dextrum adeo ventriculum cordis sanguis de auricula advenit, eumque undique replet & dilatat. Ejus distensionis mensura eadem est, quæ duarum triumve unciarum sanguinis, quas auricula expellit. Augeri vero posse, si vis dilatans aucta fuerit, & aream cordis simplici naturæ lege dilatati, esse ad aream cordis sanguine distenti, uti 2 ad 5. auctor est *Stephanus Hales* e, exque unda sanguinea æstimatur, quæ in arteriam exit.

§. XIII. Inque arteriam pulmonalem.

Ita irritatum cor celerrime, dum animal viget, in systolen transit, vires musculosas explicat, & sanguinem eo modo expellit, quem descripsimus. Sed iterum duæ huic sanguini viæ patent, prior ad auriculam, unde advenit, altera in pulmonis arteriam, quæ de ventriculo dextro prodit.

In auriculam quidem in moribundo animale non raro sanguis de dextra cordis cavea redit. In animalibus frigidi sanguinis frequentius est f, quibus perennis fluxus & refluxus auriculam inter & cor excitatur, si aorta ligata fuerit. In mytulo *Meryus* similem euripum vidit, cum alterne cor aquam de aure forberet,

e *Hæmæstatiks* p. 25.

f *Exp.* 551, 553.

& in eam remitteret *g*. In quadrupedibus etiam calidi sanguinis vidi *h*, cum cor leniter premerem, sanguinem in auriculam rediisse, & eodem modo aquam, qua infusa cordis ventriculos metiebar, per auriculam effluere, & aërem demum inflatum in auriculam repelli.

Verum hunc quidem eventum in vivo animale rarissime locum habere, persuadet anuli venosi fabrica, qui ex ostio venoso, & auriculæ confiniis, in dextri ventriculi caveam producit. Cum enim in systole parietes cordis ad septum, atque adeo ad axin ventriculorum accedant *i*, pellunt ergo sanguinem versus eum axin. Verum inter eos parietes, & axin, fluitat anulus membranofus, qui sanguini versus axin prementi cedit, donec undique expansus, & ad angulos cum axi rectos dilatatus, totum ostium venosum occupet: ulterius enim cedere, aut in auriculam expelli non potest, quod eodem tempore etiam muscoli papillares cordis breviores reddantur *k*, atque adeo anulum retineant, ne ultra cedere, aut versus aurem convexus, versus ventriculum vero concavus, fieri *l* queat. Verum mensura hujus valvulosi anuli ea est, ut expansus totum venosum ostium perfectæ claudat, & nihil quid-

g *Memoir de l'Acad. Roy. des scienc.* 1710. p. 421. *vam* (auriculam) rediret

h *Exp.* 474.

k *Exp.* 543. *Conf. Observ.*

i p. 258. Olim *Galenus* valvulas intercedere, ne sanguis ex ventriculo in venam ca-

Colleg. Priv. Amst. p. 23.

l *Senao* T. I. p. 343. 344.

quam de ventriculo in aurem sinat relabi. Imperfecte, aliquo tamen modo, in exciso corde anuli hujus valvulosi functionem imitamur, quando id cor aqua plenum, apice curvato, in systoles speciem transire cogimus: ita enim anulus valvulosus versus auriculam exhibet, & utcunque ostium venosum obturabit. Quo majori vero vi liquor impellitur, eo perfectius etiam hic anulus suum ostium claudit. Cera per arteriam pulmonalem impulsæ solet, in meis certe experimentis, in ventriculo dextro retineri, fugamque sibi ipsi, obturato ostio venoso, claudere. Antiquissima hæc sunt, & ab *Erasistrato* *m* jam, & a *Galeno* *n*, tum a nuperis a professoribus ostensa. Quæ phænomena contra hanc legem fiunt, ea laxitati non compressi ostii venosi, hinc ad latus pro ponderis ratione dilabentis, & valvularum mortuæ inertiae tribuo, & muscutorum papillarium destructæ vi contractili.

Hæc ita vera sunt, ut tamen omnino aliqua sanguinis particula ab ipsa vi contracti ventriculi in auriculam repellatur, uti dudum a scriptoribus non notissimis, & hypothese inservientibus *p*, ex conjectura propositum, deinde a *Petro Simone Roubault* *q*, & nuper ab

m Apud Galenum de Hipp. Claudio Perraut, *Essays de*
& Platonis decretis L. VI. *Physique* T. III. p. 258.

c. 6. *p* Edmundo de Meera in
n De usu part. L. VI. c. 10. *Willisium* de febribus p. 75,
o Harveio, J. A. Borello Gavet l. c. p. 124.

l. c. L. II, *Propos.* 35, 55. *q* *Offero. anat. sifische* p. 8.
Sabatier anat. II. p. 146, 147.

III. *Senaco r*, & a me uberius ostensum est, exque ipsa partium fabrica evidenter deducitur.

Nempe in diastole cordis valvulosus anulus in ventriculū profunde descendit, qualis in mortuo reperitur: potest ergo conicum spatium cogitari, cujus basis ostium venosum, ambitus ipse pariter coni truncati similis anulus venosus est. Quando auricula dextra cor in diastole constitutum replevit, tunc utique hæc area conica tota sanguine plena est. Pone nunc cor in systolen redire, & anulum valvulosum explicare. Tunc utique totus anulus, versus ostium venosum repulsus, premet ante se conum sanguineum, quem dixi, & in auriculam regurgitare coget, quoad nunc ipse anulus limitem auriculæ cum ventriculo communem expansus claudat, inque eodem plano cum ambitu ostii venosi ponatur. Verum ergo est, etsi paradoxum effatum, auriculam dextram suum sanguinem non a solis venis cavis, sed a corde etiam habere, ab ejusque vi & contractione demum perfecte distendi.

Deinde per intervalla fibrarum tendinearum valvulosarum aliquid sanguinis in contractione cordis retrorsum in auriculas rediisse, testimonium adest *r*^{*}.

Verum præcipuum & naturæ conveniens iter sanguinis, ex dextro cordis ventriculo, utique in pulmonalem arteriam ducit. Contracto enim corde, valvulæ venosæ ostium ad

auriculam patulum claudunt, removetur paulatim ab aditu arteriæ pulmonalis valvula maxima s., quæ eum aditum aperit, quamdiu mucrone suo versus apicem cordis extenditur: removetur inquam a columnis sanguinis, quas cordis parietes ad se invicem accedentes propellunt, deque septi cordis sede depellitur, ostiumque arteriæ pulmonalis liberum relinquit t.

In arteriam de ventriculo cordis prodeuntem sanguinem venire, infinita sunt, quæ evincunt. Nam in frigidi quidem sanguinis animalibus oculus nubem rubram sanguineam sequitur, quæ de pallescente ventriculo in arteriam exit v, hancque tumidam reddit, cæruleamque. Deinde, ut ad calida animalia redeamus, arteria pulmonalis vinculo injecto turget x, cor inter & pulmonem, atque adeo a corde sanguinem accipit. Denique morbi hic nobis subveniunt, & pro experimentis sunt. Quoties nempe pulmonem quæcunque causa immeabilem reddidit, toties etiam ventriculus dexter intumescit, & dilatatur, & denique rumpitur. Ergo post vitium respirationis, cum dolore punctorio, cor pene bubuli simile, amplissimum adparuit y. In pulmonis inflammationibus cor tumidissimum reperitur z. In pho-

p. 143. 144.

t Disp. de motu sanguinis
per cor n. 6.

v Exp. 487. 516 526. 530.
546. 548. 549. 551. 554. Nic.
Stenonis F. Act. Hafn. Ann.

ll. p. 141. Harvei Exerc. I.
p. 33.

x Second Memoire sur le
mouvement du sang Exp. 51.

Pecquet diff. anat. p. 34.

y Parerg. Med. p. 144.

z Senac T. II. p. 318.

nascis orthopnoicis, uti auricula, ita dexter ventriculus mire dilatatur *a*. In hydropico, cum pulmones plani essent & elisi, cor dextrum (& arteria pulmoalis) amplissima *b* fuit. Denique post saltationem & æstum venereum, cum sanguis, ut solet, in anhelum pulmonem congereretur, ventriculus dexter subito ruptus est *c*. Idem ventriculus medius crepuit, cum aortæ origo callosa facta esset *d*. In peste cor a copia congesti sanguinis diruptum fuit *e*. Similia fiunt, alibi melius repetenda, quoties sanguis difficiliter ex pulmone iter suum expedit.

Ergo sanguis ex dextro ventriculo in arteriam pulmonalem irruit, eam educit, a corde removet, ejusque longitudinem auget; inter valvulas sigmoideas iter sibi aperit; eas flexiles membranulas pressione sua, quæ ab axi undique ad arteriæ ambitum perpendicularis est, ad arteriæ parietes adprimit, & caveas earum velares evacuat, ut omnino præter minimam crassitiem suam nihil habeant, quod arteriæ ostium impediat; ipsam vero hanc tantillam crassitiem sinus arteriæ *f* recipiunt, ut etiam hoc impedimentum evanescat. Cur vero paulo post, a contracta arteria, sanguis in cor non repellatur, præstat in aortæ simillima historia dicere.

a Michelotti Comment Bon. bit.
non. T. I.

b Duverney Memoir. de M. Mai p. 560.
l'Acad. des scienc. 1730. p.

158.

c Vater de caus. mort. su-
f p. 151.

d Breslauer Samlungen 1723.

e Quesnai des fievres T. II.

p. 448.

His modis ventriculus dexter sanguine partim in auriculam suam, & partim in arteriam pulmonalem emisso, aut inanis, aut inani proximus, laxatur, atque in diastolen transit. Et in animalibus quidem frigidis totum nunc sanguinis circuitum descripsimus, tum eum, qui per arterias venasque universi corporis peragitur *g*, tum alterum, quo sanguis ex vena principe in auriculam, ventriculum & aortam transit. Eum circuitum, ut ultima vice repetam, in animalibus pellucidi cordis, quibus unica vena, auricula, cavea cordis & arteria est, ipse sanguinis rubor pulchre exprimit, quem videas in vena primum esse, inde in auriculam transire, hinc in ventriculum, inde in arteriam didi. Idem etiam experimentum tempusculorum successionem ostendit, in quibus hæ cordis partes contrahuntur, & vicissim se remittunt, nempe vena, auricula, ventriculus & aorta. In ranis *b* lacertis & piscibus *i* sæpe vidi, tum in saliente puncto *k*, & ante me alii viri clarissimi, & in pullo *l*, & in astaco *m*, testudine *n*, anguilla *o*, lucio *p*, variisque frigidis sanguinis animalibus *q*: alii etiam, quan-

-
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>g</i> Libro III. descriptum. | <i>m</i> Willis de anim. brut. p. |
| <i>b</i> Exp. 479. 480. 516. 530. 21. | |
| 548. 549. 553. 554. | <i>n</i> Caldesi p. 65. |
| <i>i</i> Exp. 526. 527. | <i>o</i> Muralt vademec. anat. p. |
| <i>k</i> Oper. min. T. I. p. 168. | 385. bene & diligenter. |
| <i>l</i> Harvei de gener. anim. p. | <i>p</i> A. v. Leeuwenhoeck Phi- |
| 58. Lancisus l. c. p. 141. | los. Transf. n. 319. |
| Maitre Jean de la formation | <i>q</i> Harvei Exerc. I. de mot. |
| du poulet. p. 71. Senac p. | sang. p. 40. 41. |
| 314. 325. | |

tum licet, in calidis bestiis, ut in corvo aquatico *r*, noctua *s*.

§. XIV. *Per pulmonem sanguis in Venas ejus Visceris venit.*

Sed in calidis tamen animalibus res magis composita est. Post arteriam nempe, quæ de dextra cavea cordis prodit, sequitur pulmo, post pulmonem demum alter sinus, alter ventriculus, arteria alia, quæ omnia absunt a frigidis. Inquirere ergo oportet, quo sanguis ex arteria pulmonali veniat. Atque primo dubium nullum est, quin per ejus arteriæ ramos, & furculos, ad minima usque distribuatur. Id vinculum demonstrat; & progressus sanguinis, atque pulsatio: in ranæ etiam pulmone microscopio adhibito non difficulter ostenditur *t*.

Deinde ultimi rami arteriæ pulmonalis in venæ cognominis radículas continuantur. Nam lac, aqua, argentum vivum, alique liquores in arteriam pulmonalem impulsæ, per venam fociam redeunt, ut ipse aqua cærulea & aëre expertus sum *v*.

Sed continuïtas & harum arteriarum cum venis fodalibus, microscopio adhibito evinci-

r Nicolaus Stenonis F. Epist. 93. Cent. III. Bartholini, Act. Hafn. l. c. p. 145.
s J. Jac. Peyer obs. 50.
t Exp. 102. sur le mouvement du sang.

v Conf. Comment. in Boerh. T. II. p. 227.
x Malpighi posth. p. 17.
 Hales hæmastatiks p. 66. Comment. per Phil. Trans. n. 285. f. 5. 6. & n. 280.

tur, & sanguinis ex minimis arteriis in nascentes venulas liberum iter *y*. Per venæ vero pulmonalis ramulos in ramos majores, hinc in truncos, quos diximus, sanguinem tendere, iterum vincula ostendunt, quæ injecta efficiunt, ut ea vena sanguine inter pulmones & cor sinistrum collecto intumescat *z*.

Denique, ut in unum locum experimenta colligam, quæ in plures etiam distribui possent, morbi hunc sanguinis per pulmones circuitum demonstrant. Nam dextra auricula, & dexter ventriculus, & arteria pulmonalis intumescunt, quoties venæ pulmonales obstructæ, sinister ventriculus impeditus, aut exitus sanguinis in aortam difficilior, aut demum ipsa aorta callosa, ossea & immeabilis facta est. Inde manifesto constat, sanguinem in sano homine ex dextra aure, & dextro ventriculo, in sinistrum, & in aortam ire: nunc autem in ægroto, cum ea via impedita sit, eum cruorem in dextris cordis caveis colligi, eaque vasa dilatare. Eadem enim horum impedimentorum, quæ injecti perpetui vinculi, natura est, & eadem ad evincendum sanguinis iter potestas. Horum exemplorum numerus fere infinitus est.

Ergo, cum vena pulmonalis polypo plena esset, sanguis coactus in cor dextrum, & ejus vasa, collectus est *a*. Cum eadem vena pul-

y Hales ibid. p. 68. *Phil.* 388.

Transf. l. c.

a *Hist. de l'Acad. des scienc.*

z *J. Walæus Epist.* I. p. 1701. p. 25. 26.

monalis crassior foret, vasa dextra cordis ampliora fuerunt *b*. Polypus in dextro ventriculo, hinc auricula dextra flexis major, & cruore plena *c*. Valvulæ venosæ sinistræ ossæ, & id ostium pene clausum, hinc auricula dextra, & ventriculus dexter, & arteria pulmonea, & vena amplissimæ *d*. Asthma, hydrothorax: auris dextra vasta, sinistra perparva *d**.

Iterum, cum valvulæ aortæ (& ipsa aorta) induruiſſent, cor amplum fuit, & æquale bubulo *e*, & ventriculus dexter amplissimus. Aortæ valvulæ ossæ, & ostium arctius, hinc cor amplissimum *f*. Cor sinistrum & valvulæ aorticæ duræ, & aorta, hinc dextra auris amplissima, in morte subita *g*. A valvulis aorticis ossæis aut calculosis cor vastius fieri frequens est adnotatio *g**. Cum os in principio aortæ esset, dextra auris & cor dextrum vastissima *h*: Cum aortæ tunica interna, per quatuor digitos, in egressu ex corde ossæa foret, cor enormi mole, & dextra auris, dexterque ventriculus polypo obſitus *i*. Cum aorta in abdomine minima esset, cor enormi mole fuit *k*.

- b* Littre ibid. 1704. hist. g Dam. Sinopeus p. 55.
 XI. g* Lieutaud sepulchret. II.
c Queitsch. select. Francof. p. 40. Vieussens Malad. int.
 T. IV. vol. 6. II. p. 181. 182. Med. Transf.
d Vieussens tr. du cœur c. III. p. 16.
 16. T. 13. Malad. int. II. p. b Bartholin hist. 56. Cent.
 179. I.
*d** E. N. C. Dec. III. a. 5. i Beck de palpitat. cord. in
 6. obs. 8. disp. pract. T. II. quas edidi.
e Lancisius l. c. ed. nov. k Ill. Meckel Memoir. de
 p. 299. l'Acad. de scienc. de Berlin.
f Themel Obereretzgeburg. 1750. p. 167.
 Samlung. T. II. p. 76.

§. XV. *Earum Venarum Pulsus.*

Ergo in venam pulmonalem sanguis dextri ventriculi cordis recipitur, & per eam versus sinum sinistrum convehitur. Paria vero nunc de ea vena, deque sinu sinistro, & ventriculo sinistro, & aorta repetenda sunt, qualia de dextri lateris vena, auricula, & ventriculo, & arteria pulmonea diximus. Simillima enim duo systemata, duo quasi corda efficiunt, quibus per pulmonem sanguinis commeatus intercedit. Ergo, uti venæ cavæ prope cor contractili vi gaudent, ita venæ pulmonales pariter evidenter contrahuntur, suumque sanguinem in sinum expellunt. Ita, post conjecturam Ill. *l* viri, & post anonymi dudum oblivione pressam affirmationem *m*, pulsum ejus venæ, quem non visum Ill. *Archiater* sagaci ratiocinio divinavit, in nuperioribus meis calidorum animalium incisionibus omnino, & repetito vidi *m*^{*}. Pulsat ejus ramus, qui lobum pulmonis bestiis proprium adit, pulsat venam pulmonis sinistri, in ea tota sede, satis longa, qua nuda in duorum lobolorum intervallo eminet.

Perinde etiam, ut in cava vena, pulsus venarum pulmonalium diutius, quam auriculæ, aut sinus motus superest, & pergit, quo tempore & cor, & sinus sinistri lateris dudum quievit. Si aërem inflaveris, perinde eæ venæ

l Senac T. I. p. 310.

Goudæ an 1685. edita.

m In *Oeconom. animal.*

m^{*} Oper. min. I. p. 144. seq.

aërem in sinum finistrum exprimunt. Sensim tamen brevior pars venæ, & sinui propior, sola pulsat. Bihorio & ultra hujus venæ pulsum superfuisse vidi.

§. XVI. *Et sinistri cordis atrii.*

Post venas pulmonales, sinus sinister, cum adpendice, a sanguine recepto distentus, & irritatus, contrahitur. Etiam ipse duas vias apertas habet, per quas sanguinem emittere potest, pulmonis venas, & ventriculum finistrum. Ergo in vivo animale inciso, perinde uti in venam cavam pars sanguinis sinus dextri repellitur, ita in venas pulmonales pars sanguinis sinistri sinus retroagitur, per pollicem & sesquipollicem in fele, inque ea vena diastolen pulsumve excitat, & paulo post, a contracta vena sinui redditur *m***. Is fluxus & refluxus in sano animale, & thorace clauso, locum minus habet: sanguis enim, qui de pulmone per venas ejus visceris redit, videtur sanguinem de sinu sinistro rediturum sustinere, & resistere, ne fluctus vitali flumini contrarius exoriat. In animale inciso pulmo compressus venæ suæ nihil mittit.

Verum alterum iter, naturæ conveniens, in finistrum ventriculum patet, eoque auricula & sinus ejus lateris suum sanguinem omnem mittit. Anulus enim membranaceus, valvulosus, perinde cono sanguineo per axin cor subeunti cedit, & ad cordis parietes admovetur. Quare ex hac fabrica, nimis manifesta, aliqua

*m** Oper. min. T. I. p. 144. seqq.*

pars veri motus sanguinis dudum innotuit. *Vesalius* *n* enim aëri per eas valvulas iter in ventriculum sinistrum permitti, reditum omnino impediri dudum vidit; neque ab alio experimento de vero itinere sanguinis per pulmonem convinci se passus est *Realdus Columbus* *o*, deinde *Johannes Valverde* *p*, & *Adrianus Spigelius* *q*.

Uti valvulæ, ita morbi, hoc sanguinis ex sinistro sinu iter declarant. Quoties enim cor sinistrum, aut exitus in aortam, aut aortæ principium, obstaculo aliquo laborat, neque sanguis libere in aortam exit, toties sinistra auricula tumida, & justo amplior fuit, & nonnunquam a congesto sanguine se rumpi passa est. Ita auris sinistra mole aucta adparuit, cum valvulæ venosæ ejus orificii pene coaluissent *r*. Cum polypus in sinistro ventriculo foret, post anxietates, & palpitationes, sinistra auricula rupta est *s*. Valvulæ aortæ contractæ, & osseæ, & sinus sinister enormis *t*. Valvulæ aortæ, & aorta ipsa dura, scabra, cor maximum: sanguis ex rupto ramo sinistro venæ pulmonalis effusus *v*. Hæc omnia ostendunt, sanguinem a sinu sinistro

n l. c. p. 746.
o De re anatomi. L. VII. c. 19.
p Anat. corp. hum. p. 230.
q Anat. L. IX. c. 8.
r Hunauld Memoir. de l'A-

cad. Roy. des scienc. 1735. p. 19.
s Cl. Langhans Act. Helvæt. T. II. p. 125.
t Douglas Phil. Transf. n. 345. Lientaud II. p. 40.
v Lancis. l. c. p. 299. ed. nov.

nistro in ventriculum ejus lateris, & aortam tendere, siquidem is sinus intumescit, quando via ex eo in aortam ductura intercipitur.

Simul, dum sanguis in ventriculum lævum penetrat, valvula mitralis major ostio aortæ prætenditur, & ampli veli modo cavet, ne ex eo sinu in aortam sanguis vi nimis debili penetrare queat x. Hæc enim valvula huic officio sufficit, cum multo, quam dexter anulus membranaceus, latior sit x*.

§. XVII. *Hic est minor Circuitus sanguinis.*

Priusquam ex sinistro ventriculo prodeuntem sanguinem sequamur, æquum dictu est, ejus iter ex ventriculo dextro, per arteriam, venamque pulmonalem, in sinistrum sinum, & ejus lateris ventriculum, alterum *minorem sanguinis circuitum* esse, qui aliquo ante *Harveium* tempore passim innotuit, etsi nunquam publica scholarum præjudicia ante hunc Ill. virum superari potuerunt. Ergo antiquitas aliter, quam nos, de vasis magnis pulmonis sensit. Cum enim in sinistro ventriculo spiritum, in dextro sanguinem residere persuaderetur y, arteriam pulmonalem a ventriculo *venam*, a cras-

x Repete ex p. 274. quæ de dextro ostio arterioso dicta sunt.

x* p. 162.

y Ventriculus sinister plenus est spiritu vitali *Erasistratus* apud *Galenum* de *Hipp.*

& *Plat. decretis* L. I. plenus spiritu animali *Chrysippus* apud *Eundem*. Sinister sinus per arterias spiritum, per venas sanguinem emittit *Pollux* in *lexico*.

sa fabrica arteriosam dixit z: vicissim ex sinistro aëreo ventriculo natam venam pulmoneam, ob originem arteriam, a tenuitate venam vocavit a. Porro sanguinem ex dextro ventriculo per septi cordis b poros in sinistram cordis caveam duxit, inque ea cavea spiritu vitali imbui docuit. Non undique tamen errarunt auctores, non certe *Galenus*. Nempe per vas ex dextro ventriculo natum, sanguinem quidem alibilem ad pulmonem mitti c, per vas vero sinistro sinui commissum, spiritum ex pulmone ad sinistrum thalamum venire minime ignoravit d. Modice calidum ex venis sanguinem in cor venire, ex arteriis calidissimum *Idem d**.

Cum ergo dudum pars veri innotuisset, primus *Michael Servetus* e *Villanovanus*, inde *Realdus Columbus* f, contemplati magnitudinem g arteriæ pulmonalis (uti nunc vocatur) nimis pro pulmone alendo amplæ: valvularum etiam naturam edocti, quæ humores in sinistrum ventriculum admittunt, a ventriculo in sinum re-

z *Herophilus* apud *Rufum* I. p. 42. *Galenus* de usu part. L. VI. c. 10. 20. &c. Auctor libri Hippocratici de ossibus n. 19. venam cartilaginofam dixerat.

a *Galenus* ibid. *Oribasius* de corde.

b *Idem* ibid. c. 17.

c Ibid.

d Ibid. c. 10. 14. 15. &c.

d* *Form. fet.* c. 3.

e In L. V. de Trinitate ann. 1553. edito, Confer locum in vita *Serveti* ab Ill. olim Cancellario *Moshemio* edita, & apud *Wottonum* of antient & modern learning p. 212. & *Douglasium* in *Bibliographia anatomica*.

f l. c. L. VII. p. 177.

g *Servetus*, *Columbus*, *Aran-tius* obs. anat. 33.

dituris obstant, fere 80 ante Harveii ævum annis utique docuerunt, omnino ex dextro ventriculo sanguinem in pulmonem, hinc per venam pulmonalem in sinum sinistram, inque ventriculum ejus nominis venire *b*. Hæc minor, *Servetiana* est sanguinis circulatio, quam plurimi clari viri & seculo XVI *i*, & sub principium seculi XVII *k* receperunt. *Cæsalpinus* etiam *l*, & *Caspar Hofmannus m*, ante *Harveium* iste *n*, & *Jacobus Back o*, nomina vasorum magnorum a corde in pulmonem tendentium, ad eum modum reformaverunt, qui etiam nostro ævo obtinet.

§. XVIII. *Ex ventriculo sinistro sanguis in aortam exit.*

Ventriculus sinister, perinde ut dexter, contractus, valvulas quidem venosas a parietibus cordis repellit, explicat, donec idem cum ostii venosi ambitu planum occupent *p*: ita aditum sanguini suo ad aortam aperit. Ulterius

b Galenus l. c. *Cæsalpinus* melius vidit, quam docuit. *Quæst. Peripatet.* L. V. c. 4. *Pigafetta*, *Fallopium* discipulus, p. 125. *b* *Arantius* l. c. C. apud *Monavium* in collect. *Hofmannus* de thorac. p. 245. *epistolar select.* L. V. p. 345. de usu part. p. 107.

i *Cæsalpinus*, l. c. *Arantius*, *Prosper Borgaruccius* in disp. de calido innato *Leidæ* an. 1627. defensa n. 14.

Valverdu. *J. Langius Lembergius* apud *Folium* de sanguinis via a dextro in sinistram cordis ventriculum *J. C. Arantius* sed iste timidior, *l* l. c. *m* Ibid. *n* *Exercit. Anat.* l. c. ult. *o* De corde p. 154. *p* Conf. p. 274. 275.

eas valvulas in aurem replicari eædem causæ vetant, quæ in dextro ventriculo dictæ sunt *q*. Cum vero valvulæ sinistræ potentius ventriculi conatui resistent, frequentius etiam callofas carunculas in iis fricatio generat, quo fere modo in tendinibus calli nascuntur: aliquando etiam ruptas fuisse, pauca quidem exempla exstant. In subito mortuo *Lancisius r* vidit: in vivo demum animale, cum arteriam aortam & pulmonalem vinculo intercepisset, vim sinistri thalami, per legitimam viam sanguinem frustra prementis, utrasque dextras & sinistras valvulas venosas rupisse, inauditi eventus testis est *Fridericus Hofmann s*. Conus vero sanguineus, quem anulus valvulosus in basi ambit, etiam hic in auriculam repellitur.

Vera sanguinis via in aortam patet, a valvula venosa nudata: per ejus ostium sanguis exuberans valvulas semilunares perinde ad arteriæ parietes adprimit, uti de arteria pulmonali diximus *t*, eamque aortam una & in longitudinem educit, & dilatat. Hinc aorta ligata, cor inter & linum intumescit *v*. Hinc cum aorta in origine offesceret, plurimus sanguis coactus in sinistrum ventriculum congestus est *x*. In liberam vero aortam ventriculus se inanit, & eo expulso in diastolen se remittit,

q Ibid.

r l. c. p. 495.

s De elasticit fib. p. 7.

t p. 277. 278.

v Exper. sur le mouvement scienc. 1735. p. 20. 21.

du sang Exp. 52. 53. Exp.
sur la natur. irrit. &c. n.
526. 550. 551. 552. 553. 554.
x Memoir. de l'Acad. des

donec nova causa renascatur, a qua sollicitatus constringatur.

Arteria princeps (& perinde pulmonalis) postquam a sanguine impulso intumuit, paulo post subsidet, sive id ab elatere solo fiat, sive a musculosa vi. Constricta sanguinem propellit undique, iterumque & in ramos suos viam invenit, & cruorem versus cor, nunc languens, neque quidquam remittens novi cruoris, repelleret, nisi valvulas semilunares nacta foret *y*.

Quando enim parietes aortæ arctantur, & sanguinem arteria contentum propellunt, offendit idem, in directione ad cor ducente, aperta ostia cæcorum sinuum valvuliformium, eaque subit, replet, valvularum mobilia vela a parietibus cordis dimovet, & versus axin urget, donec tres expansæ valvulæ conjunctæ arteriam integre claudant, & regressum sanguinis in cor omnino intercipient, cum mensuram sectioni arteriæ æqualem *z* nactæ sint. A fibris vero tendineis robur valvularum augetur, ut eo facilius impetum retronitentis undæ sustineant, etsi vim contractilem, & irritabilem *a*, tendinea natura non admittit. Aërem *b* certe contra cor impulsum, & ceram, plerumque a corde avertunt, neque prius rumpuntur, quam vim æqualem *c* 63 libris passæ fuerint. Et in vivo animale, etiamsi aorta ligata fuerit,

y p. 153. 154. 168.

a Senac p. 360.

z Ibid. Conf. Galenum de Hipp. & Plat. decret. L. 6. 606.

b Faber ad Hernandez p.

c 6. Senac p. 359.

c l. c. p. 124.

tamen nihil in cor redit, cum arteria distenta se sustineat, collapsura, si in cor se exinanire posset *d.* Fuerunt tamen, qui in homine febriente & plethorico aliquid relabi suspicentur e, & in puncto saliente non rarissime aliquam partem sanguinis de aorta in sinistrum ventriculum rediisse vidi, per arterias vero coronarias *III.* *Fontana.* Verum sanguinem in cor redire a natura sani & integri corporis alienum est. Ea enim unda sanguinis, quæ ab aortæ systole agitata in cor redire conatur, ea cor plenissimum offendit, & columnas sanguinis resistentes invenit, quæ nunc maxime ex auricula in cor nituntur, valvularumque renixum adjuvant. Si vero omnino via inter valvulas semilunares aperta pateret, accessoria hæc sanguinis copia, cum venosi cruoris legitima penu conjuncta, utique ventriculum sinistrum supra legitimam mensuram dilataret, & repetitis distentionibus tandem validarum equidem carniarum cordis robori vim inferret, ut in aneurysmatis modum cor ipsum intumesceret. Id enim toties factum reperias, quoties valvulæ semilunares, ossæ, aut cartilagineæ, aut lapillis fartæ, rigidæque, a sanguine sinus earum sub eunte distendi, ostiumque aortæ claudere cessarunt.

Aneurysma cordis, cum duæ valvulæ semilunares cartilagineæ essent, tertia ossæ *f.* Mors subita & cor amplissimum ex valvulis

d Meibom de valvulis n. 50.
e Stæbelin. de pulsib. p. 15.

f Lancis. p. 137.

aortæ ad parietes arteriæ adnatis *g*. Pulsus interceptus, artuum gangræna, cordis moles insolita, cum valvulæ ossæ aortæ ostium non clauderent *h*. Cum eadem ostiola ossæ forent, & sanguinem retrogradum in cor admitterent, cor sinistrum amplissimum *i*. Valvulæ aortæ contractæ, ut sanguis in cor rediret, hinc ventriculus sinister dextro amplior *k*. Hydropico valvulæ aortica calcaria plenæ, hinc ventriculus sinister duplo tumidior *l*. Similia exempla sunt, ubi vel totum cor vel solus sinister ventriculus mole increvit, cum valvulæ aortæ induratae, pene coalitæ, vel aorta angustior, vel cartilagineis & ossis squamis varia esset. Est ubi non solæ sinistrae cavæ: sed & pariter dextræ, ob ejusmodi vitia dilatata fuerunt. Numerosa adeo exempla collegi, ut enarrari nequeant. A potentiori cæterum frictione sanguinis aortici hæ valvulæ frequentius, quam sigmoideæ, callis & ossis squamis variantur.

Aliquantum tamen sanguinis de aorta subside in cor redit. Aquam aortæ injectam refluxisse vidit *Ill. Fontana l**. Sed eo experimento nollem uti, cum valvulæ in vivo animale,

g Schaaers Schmid Berlin. Nache 4. 6.
richt 1740. n. 6. Similes fe- *i* Senac T. II. p. 413.
re historiæ exstant in hist. de *k* Douglass Phil. Transf. n.
l'Acad. Roy. des scienc. 1713. 345.
n. 3. & similis mors in Eph. *l* Cheselden l. c. p. 182.
Nat. Cur. Dec. I. anat. 3. Phil. Transf. n. 337. Eph. Nat.
obs. 282. Cur. Dec. I. ann. I. obs. 70.
h Comper l. c. tab. 40. f. *l** Ricerche p. 110.

sanguine cor replente, utique perverso sanguinisreditui melius resistent. Verum utique, uti de venis dictum, ita in arteriis is sanguis qui inter convexitatem valvularum & parietem aortæ est, is intra cor rejicitur, dum arteria subsidet & contrahitur l^{**}. Adnotat idem vir sagacissimus, valvulis in retinendo sanguine laborantibus subvenire arteriarum coronariarum ostiola, parata partem sanguinis contra cor nitentis recipere, valvularum pressionem minuere, intercedere ne valvulæ rumpantur l^{***}, aut ipse demum ventriculus laceretur l^{****}.

§. XIX. *Tempora quibus Cordis partes in motu sibi succedunt.*

I. *Venæ Cordi commissæ pulsant.*

De temporibus, quo diversæ cordis partes agunt, proximum est, ut dicamus. Et primum venæ cavæ eodem tempore, quo pulmonales venæ, constringuntur, atque auriculas replent. Sæpe id in ultimis meis experimentis vidi, ut tamen perennior venæ cavæ motus sit, & versus atria mortis sæpe aliquoties contrahatur, dum pulmonalium venarum actio semel respondet.

Id tempus, quo in sano homine venæ cordi commissæ constringuntur, *primum* dicemus.

l^{**} Fontana ricerch. p. 100.

l^{****} Ib. p. 111.

l^{***} Ib. p. 113.

Eodem tempore auriculæ & sinus replentur, non subito quidem, etsi ob celeritatem ita videtur, verum prior pars venæ proxima, deinde remotiores auriculæ sedes, & omnium ultimæ appendices utriusque atrii: ita tamen, ut totum atrium cordis, aut dextrum, aut sinistrum, intra unicum minutum secundum horæ repleatur, etiam in homine, cui tardissimus pulsus est.

Quare omnino hic monere oportet, ne aliquæ voces *Boerhaavii* in eo sensu recipiantur, quem omnino primum offerunt. Videtur vir illustris *n* aliud tempus facere, quo sinus repleatur, & aliud tempus, quod ei proximum succedat, quo sanguis in auriculam penetret: ita fieret, ut a vena sinus, a sinu auris, ab aure ventriculus repleretur, & vicissim eodem tempore sinus contraheretur, quo ventriculus. Ejusmodi autem temporum successio a vero aliena est. Et dextra primum auricula a sinu nulla valvula, nulloque discrimine distat, quod intercedere possit, ne vena cava perinde aurem, & sinum, eadem unda sanguinis inmissa repleat. Sinus demum dexter *n*^{*}, ne quidem integram caveam efficit, & posteriorem unice dextramque partem receptaculi constituit, quod antea vera reticulata natura auriculæ perficit. Sinister sinus utique integram caveam ip-

m Conf. *Jurin Phil. Trans.* 155. Rectius hæc exstant in
n. 358. Edit. VI. n. 159.
n *Instit. rei Med.* n. 147. *n*^{*} p. 106.

se efficit, cujus appendix est & recessus, quæ auricula dicitur. Nullo modo vero a pulmone sanguis in auriculam venire potest, quin prior in sinum veniat: neque eæ auricula in ventriculum penetrare, nisi per sinum transeat. Hæc eo accuratius monui, quod ad *Boerhaavii* voces non ignobilis de corde scriptor *Petrus Simon Rouhault* o suam sententiam adcommoda-verit.

Non est mei candoris dissimulasse, esse experimenta, quæ possint aliquam successione in repletionem integri atrii cordis suadere. Ita primam partem dextram auriculæ cordis, in rana, ante reliquam vidi *p* a vena cava contracta repleri, inde sinistram, & ab ista ventriculum. Ita in auricula dextra canis vidi, a contracta auriculæ parte inferiori superiorem appendicem sanguinem accipere *q*.

Verum hæc successio quidem cum omni motu a natura conjuncta est, & in ventriculis cordis perinde locum habet *r*, quorum alia & alia pars non eodem, sed duobus proximis tempusculis repletur. Sed ea minima tempuscula, quibus diversæ particulæ auriculæ, aut ventriculi, replentur aut constringuntur *s*, conjuncta demum ejusdem sunt durationis, quæ est integri pulsus cordis, & eorum summa unico pulsui, aut uni sexagesimæ parti minuti pri-

o Réponse à M. Winslow
p 112.
p Exp. 479. 480.

q Exp. 482.
r Exp. 516.
s Exp. 533. 537. 548.

mi æqualis est, quam mensuram pro motu unius cavæ cordis nunc cum *Boerhaavio* recepi, alias exquisitius definiturus.

Penitus contraria ratione insignes aliqui vivorum animalium incisores *t* a venis, perinde ut ab auribus, ventriculos repleti scripserunt. Verum nulla venarum ita cordi committitur, quin prius in sinum præpositum sanguinem suum, ex ipsa fabricæ necessitate, effundat.

§. XX. II. *Dux Auriculæ saliant.*

Uti auricula dextra, & sinistra, eodem tempore replentur, quod nuper diximus, ita eodem etiam secundo tempore una inaniuntur *x*, & sanguinem suum in cor emittunt. Ita in numerosis experimentis vidi *x*, & ratio ipsa suadet, cum dexter sinus cum sinistro in adulto homine eundem communem parietem habeat *x*^{*}, in fetu vero inedito omnino eadem fere cavea sit, quæ in adulto homine, septo subnascente, in dextram & sinistram aurem separatur. Neque tamen in moribundo animale, hæc perennis conjunctio perfecta superest. Nam dextra utique auricula plerumque frequentius, & aliquoties pulsatur *y*, donec sinistra semel constringatur; & demum dextra sola *z*, & diu quidem pergit

t *J. Pecquet* diff. p. 73. *J.* & plerique qui proxime ad
Fanton l. c. p. 296. not. *b* excitabuntur.

v l. c. *Exp.* 470. 474. 478.

x^{*} p. 107.

493. 503. 510. 515.

y *Exp.* 474. 482. 540.

x *Harveii Exerc.* I. p. 38.

z p. 424. ed. 1757.

contrahi, quando sinistram jam æterna quies sopivit. Est etiam contra, neque valde infrequens mos laborantis naturæ, ut celerrimos auriculæ sinistræ tremores videas *a*, dum dextra semel contrahitur: est, & ex artificio quidem aliquo, ubi sinistra auricula pergit pulsare, dextra vero jam emortua languet *b*. Verum hæc præter naturæ legem fiunt, & in fano atque vegeto animale duarum auricularum motus utique synchroni sunt. Cum hoc cæterum aurium motu cordis diastole conjungitur, cum nullum dubium sit, quin auricularum expulso sanguine ventriculi repleantur.

§. XXI. III. *Et uterque ventriculus.*

Post auricularum constrictionem celerrime in calido & fano *c* animale, aliquanto lentius in frigido *d* & languente *e*, & nonnunquam fatigato magno etiam in calidis tempusculo *f* interposito, sequitur ventriculorum contractio: sequitur inquam, cum in plurimis experimentis ita viderim *g*, in fele, cane, glire, facillime vero in pullo incubato; & cum plerique prioris ævi profectores, in vivorum animalium incisionibus enutriti, motum ventriculorum au-

a Exp. 507. 508. 509.

b Exp. 517. 518. 541. 545.

c Exp. 492. 493.

d Exp. 526. 546. 549.

e Exp. 473. *Harvei* l. c. p.

f Exp. 470. *Riolan.* not. de mot. cord. p. 38.

g Exp. 470. 473. 474. 478. 479. 480. 481. 494. 503. 516.

526. 530. 546. 548. 549. 554.

ricularum constrictionem sequi *b* testes se offerant, alternasque auricularum & ventriculorum contractiones suo experimento confirment. Inter eos & Cl. *Spalanzanum*, egregium in natura observanda virum cito, & viros minime mihi faventes Cl. *Verschuer* & v. *Geuns*. Uterque vero ventriculus eodem iterum tempore constringitur *i*, idque tempusculum *tertium* idem cum primo est, ut nempe eodem ictu oculi venæ magnæ contractæ auriculas repleant, quo constricti ventriculi suum sanguinem in arterias expellunt. Eum synchronum utriusque ventriculi motum patres etiam anatomes suo testimonio stabiliverunt *k*. In apertis ventriculis contractionem eodem tempusculo vidi peragi *k*^{*}.

b Volcher Coiter obs. anat. p. 124. 126. Guil. Harvei l. c. p. 38. 40. &c. & in lib. de generat. anim. p. 53. Riolan anthropograph. p. 241. 415. 418. & in not. de mot. cord. p. 83. J. Jac. Wepfer de cicut. aquat. p. 90. Car. Drelincourt canicid. 2. n. 10. J. Jac. Peyer obs. anat. n. 21. J. B. Caldesi l. c. p. 65. J. Alphonsus Borellus l. c. l. II. Prop. 55. Dom. de Marchettis compend. anat. p. 74. J. Muralt l. c. p. 385. (in anguilla), Nicolaus Stenonis F. Act. Hafniens T. II. p. 145. Olig. Jacobæus de ranis p. 120. in salamandra Raym. Vieussens de remot. & proxim. princ. p. 86. du cœur cap. ult. Ant. v. Leeuwenhoeck in lucio pisce, Phil. Transf. n. 319. Bussiere lettre à M. Mery p. 21. in testudine J. Maria Lancisius p. 84. in puncto saliente, Maitre Jean de la formation du poulet p. 71. Joh. Fanton l. c. p. 310. in ranis, Browne Langrish Croonian lectures p. 92. J. B. Senac p. 314. 325. &c. Autoptæ omnes. *i* Exp. 470. 474. 475. 478. 492. 493. 503. 514. 536. 542. *k* Harvei p. 26. 30. 38. Walæus Epist. I. p. 400. aut 784. ed. tert. Lower c. 2. p. 45. *k*^{*} Exp. 471. 485.

§. XXII. *Lancisiana Opinio.*

Ita tria hæc tempora pergunt, combinata, ut eodem semper tempore venæ & ventriculi repleantur & inaniantur, & tempore sequente auriculæ, & arteriæ magnæ, pariter & sanguine repleantur, & inaniantur. Receptam hanc sententiam hoc primum seculo celebres viri sollicitaverunt. Et *Johannes* quidem *Maria Lancisius* *l Petriolium* forte secutus est, quo in administrationibus anatomicis ministro vir splendidus utebatur: idem ad sua experimenta provocat, quæ in grandibus animalibus *m*, in equis, & in puncto saliente, sive pulli incubati *n* tenero corde fecerit. Hactenus autem a sententia vulgo recepta recessit, ut fateretur, contractionem auriculæ tertia parte tempusculi toti pulsui æqualis præcedere contractionem cordis, & cum fine diastoles ventriculorum conjungi: sed altero tempusculo aiebat systolen auricularum, cum initio systoles ventriculi una fieri, & tertio demum tempusculo auriculæ quidem contractionem cum secundo triente systoles ventriculorum conjungi. Quare, si singulam systolen auricularum, aut ventriculorum, in tres partes diviseris, duæ posteriores tertiæ totius contractionis auriculæ cadent in duas priores tertias partes systoles ventriculorum, & unica prima tertia parte auriculæ contractio cordis constri-

l l. c. *Propos.* 59. 60. 61.
m p. 88.

n p. 43.

tionem præcedet, ex *o Lancisii* sententia, quam *Carolus Philippus Glassius p* suam fecit, & excusavit Vir. Clar. *J. Godofredus Brendel q*. Aliquid simile habet *Ill. Fontana* in avibus: nempe finem contractionis cum initio relaxationis fere coincidere *q**.

Non repugnaverim equidem *Harveio r* & *Backio s* præcipuis in experiendo viris, qui motum cordis difficilem observatu pronunciant, aut *Waleo t*, qui non aliam ob causam in languentibus bestiis, aut frigidi sanguinis animalibus, cordis phaenomena contemplari suadet. Non ideo tamen insuperabilis difficultas est, quae *Lancisio* fraudi fuit. Frequentissime certe in piscibus, ranis, lacertis, corvis, ululis, pullis incubatis, muribus, gliribus, fuis, cuniculis, haedis, ovibus, canibus, felibus, erinaceis, & absque omni dubio vidi, auriculas cordis prius repleri, quam iidem ventriculi evacuantur, quo tempore thalami in diastolen se remiserunt, & eo ipso tempore rubro sanguine ab auriculis impulsio distenduntur: paulo post auriculas quiescere, & cordis ventriculos constrictionem moliri, suumque sanguinem expellere, ut manifesto satis præcessionem auricularum, cordisque proxime sequentem constrictionem, distinguas. Ipse demum

o p. 88. 89.

p Diff. sæpe cit. n. 69.

q In progr. de sententia *Lancisiana* non penitus improbabili.

*q** *Irritab. leg. diff. V.*

r *Exerc. I.*

s p. 248.

t p. 403.

Lancifius eadem in vivis animalibus phaenomena vidit *v*. In pullo incubato observatio facillima est. *Cl. Mezgerus* adeo certam legem esse reperit, ut etiam tunc auriculas & ventriculos alternis vicibus moveri viderit, cum utrisque eodem tempore stimulum admovisset *v**.

In moribundo equidem animale ordo & successio in actione auricularum & ventriculorum turbatur. Saepe dextram auriculam videas mira celeritate palpitare, dum cor immutatum quiescit, & denique saepius, & quinquies *x* & sexies *y*, imo sexagesies & centies *a* pulsare prius, quam semel cordis contractio sequatur. Hæc princeps auricularum micatio frequens omnino est visu, *Veslingio* olim dicta, & in puello nuper *Cl. Dinkler*, inque pullo *Ill. Cardano*, Est etiam, ubi in rapido cordis motu non facile sit, praecessionem in motu auricularum distinguere *b*. Cum enim in animale torto pulsus in minuto primo fere 140 sint, contractio vero auriculae non multo plus quam tertiam partem ejus tempusculi sibi sumat *c*, fiet ea intra $\frac{1}{420}$ partem minuti primi, aut unius minuti secundi septimam, adeo certe velociter, ut

v p. 87. *Browne Langrish* l. c. p. 143.
*v** *Mezger Advers.* p. 134. *Highmor* de generat. p. 71.
x *Exp.* 474. 477. 492. *a* *Walæus* p. 401. *Eus* de
y *Stenonis Act. Hafn.* l. c. causa vires cordis alternas pro-
p. 142. *J. J. Peyer* obs. 32. ducente n. 5.
J. v. Beverwyck in *Quæst.* *b* *Harvei* p. 49. 51.
Epist. p. 143. *Senac.* p. 324. *c* *Exp.* 470.

ut oculum fere fugiat. Etiam hoc frequens est, auriculam solam, maxime dextram *d*, nonnunquam vero sinistram *e*, moveri, quando cor dudum & ante aliquot horas quievit. Aliquando etiam ventriculi absque auriculis agunt *f*. Alias ventriculus dexter frequentius sinistro contrahitur. In ultimis etiam incubationis diebus non raro vidi, successionem motus in cordis regionibus turbari. Verum hi in pulsuum ordine errores nihil naturæ legi derogant, quæ in valente animale perpetua est, & quam ipsam ad præsentem naturæ laborem descripsi. Primis diebus, nempe secundo, tertio & quarto, quibus cor animalculi manifestissime coram micat oculis subjectum, ordo perpetuus est, quem dixi; neque hæc sani animalis constantia debet per confusionem refutari, quæ debili aut moribundo animali supervenit.

Sed repugnat omnino, systolen aurium & ventriculorum conjungi posse. Et primo, cum ventriculi robur vim auriculæ contractilem magna ratione superet, frustra in cordis systole laboraret ista, & contraheretur, cum in cor eodem tempore contractum sanguinem suum nullo modo posset expellere *g*. Deinde ex prioribus repetere oportet *h*, cor contractum & sanguinem suum propellens; eum sanguinem contra anulum mem-

d Exp. 473. 474. 482. 591.
492. 494. 510. 514. 537. 540.
543. 555. 556. Repetuntur ista
p. 313.

f Exp. 496. 517. 518. 519.
521.

g De motu sanguin. per cor
n. 13.

e Exp. 517. 540. 541. 545.

h p. 277.

branaceum ostii venosi urgere *i*. In systole ergo *Lancisiana* hic anulus a viribus contrariis premeretur, a sanguine nempe auriculæ contractæ in cor nitente, & a sanguine ventriculi, anulum venosum contra auriculam urgente. Frustra ergo natura vim contractarum auricularum impenderet, & cum noxa aliqua, cum interim renitens ventriculi vis necessariam expansionem anuli valvulosi impediret, ex quo ipso arteriosi ostii adapertioni resisteretur *k*. Iterum, cum ex hypothese, duæ partes diastoles auricularum cum duabus omnino tertiis partibus diastoles ventriculorum in idem tempusculum cadant, toto certe eo tempore, quo cor ad recipiendum sanguinem per suam laxitatem aptissimum foret, nihil ejus muscoli cavæ acciperent, cum auriculæ eo tempore & ipsæ quiescentes nihil ipsis mittere possent. Quare & systole auricularum per duas tertias partes suæ durationis frustra foret, & per eandem portionem sui cordis diastole. Possis etiam *Ill. Morgagni l* rationes consulere, quem amor veri vetuit in amici partes descendere.

§. XXIII. *Et Nicholsiana.*

Alia hypothesis etiam magis iis contraria renititur, quæ proposuimus. *Franciscus Nicholis, Meadii* idem clarissimus & gener & succes-

i De motu sang. &c. ibid. *l* Epist. Anat. XV. n. 13.
k p. 277.

for, aliam a nostra seriem motuum in corde & auriculis constituit. Primo tempusculo ait *m*, aurem dextram pulsare, & sanguinem expellere; altero ventriculum ejus lateris, tertio arteriam pulmonalem; quarto auriculam sinistram: quinto ventriculum sinistrum contrahi. Ita fieret, ut aut constrictio aut dilatatio, nam perinde est, auriculæ dextræ caderet in idem tempusculum, cum dilatatione aut constrictione auriculæ sinistræ; sequente vero temporis momento dexter quidem ventriculus pulsaret, quo ipso sinister thalamus dilataretur: atque adeo semper alio tempore dextra auricula pulsaret, alio sinistra, & perinde neque pulsus, neque remissio utriusque ventriculi, unquam in idem tempusculum incideret.

Facile adparet, fabricam cordis & auricularum cum hac hypothese conciliari non posse. Nam dextra quidem auricula cum sinistra communem parietem habet *n*, qui septum vocatur sinuum. Omnino vero repugnat, diversa tempora esse, quo dextra auricula contrahatur, & quo sinistra, cum fibræ auriculæ dextræ cum sinistræ fibris, in eo septo intricentur & cohæreant, & vel contractæ utramque necessario auriculam constringant, vel laxatæ utramque laxent. Absonum esset, id auricularum septum eodem tempore contrahi, quia sinister sinus contrahitur, & idem laxari tamen, quia

m *Compend. Anat. Oeco-*
nom. p. 27.

n *Vieussens tr. du cœur p.*
41. conf. L. nest. IV. p. 107.

dexter eodem tempore se remittit. Adde in fetu omnino duas aures unicam caveam efficere; imperfecto septo nondum divisam. Adeo connexæ sunt duorum ventriculorum; duarumque aurium carnes; ut quiescens altera cavea; ab altera per stimulum in motum revocata; pariter ad contractionem intermissam redeat.

Sed ventriculorum carnes in septo cordis etiam magis inseparabili nexu miscentur *o*; dextræque ad sinistrum ventriculum transeunt; & vicissim sinistrae ad dextrum: ut omnino iterum, quando dextri cordis carnes constringuntur, una & fibras a sinistro ventriculo eo missas constringi necesse sit; & vicissim sinistri ventriculi eas fibras contrahi, quas dexter ventriculus sinistro tradit. Non ignoro, posse unius musculi fibras aliquas agere, dum aliæ quiescunt. Verum id unice de lacertis illis rectis; parallelis, solo adipe conjunctis verum est; qui magnos musculos conjungere solent.

Deinde observationes, quas maximo numero enarravimus *p*, omnes in eam legem consentiunt, ut eodem omnino tempusculo duæ auriculæ aut constringantur & expallescant, aut vicissim laxentur & rubeant repletæ: ambo ventriculi etiam eodem tempore corrugentur, durescant, apicem recurvent, aut vicissim levigentur, mollescant, extendant apicem.

Neque quidquam fidei horum experimentorum decedit, quod aliquando in languido &

moribundo animale, aut auricula dextra absque sinistra alioque tempore agat *q*, aut ventriculus etiam dexter absque sinistro contrahatur *r*. Hæc enim mortis, & turbatæ naturæ symptomata sunt, quando vel solus dexter ventriculus pulsare pergit *s*, quo tempore sinister, ob causas alibi exponendas, quiescit, aut sinister ex vi conservati stimuli solus operatur, dexter vero inanis, & ab irritatione liber, vitales vires explicare desit *t*: quod quidem phænomenon ægre fere, & plerumque imperfecte, ab arte obtinetur *v*. Neque hoc idem phænomenon cum sententia *Nichollsi* consentit, cum unicus semper nobis ventriculus contrahi visus sit, alter vero immobilis quieverit, neque alternus ordo contractionum unquam in utroque ventriculo obtinuerit.

Supereſt, ut ad eam rationem respondeamus, quæ *Nichollſio* fraudi fuit. Pone adeo, primo tempusculo auriculam dextram pulsare, & sanguinem suum expellere; altero ventriculum dextrum pariter contrahi, & inaniri; tertio pulmonalem arteriam se in venam sodalem deplere; quarto venam pulmoneam in sinum sinistrum suam penum convehere; quinto sinum sinistrum in ventriculum sui lateris se evacuare; sexto eum ventriculum in aortam sanguinem effundere. Ita omnino, uti in recepta senten-

q p. 304.*r* *Harvei* p. 39.*s* *Exp. nostr.* 474. 482. 582. 523.*t* *Exp.* 515. 521. 522.*v* *Exp.* 517. 518. 519. 520.

514. 543. 555.

tia, tempora, quibus auris dextra & sinistra se evacuant, synchrona erunt, cum ea sint 1. & 5. imparium autem numerorum tempuscula semper in unum conveniant; & auricula, quæ primo tempore contrahitur, iterum tertio, & quinto, & septimo contrahetur; & ventriculi pariter eodem tempore agent, nempe momento 2. & 6. Nihil a *Nichollsi* positione diversi nobis summus, præter longiorem sanguinis in pulmone moram, quem *Vir. Cl.* intra unicum minutum secundum (si 60 pulsus in minuto primo fuerint) per arteriam venamque pulmonis in sinum sinistrum ducit, incredibili certe celeritate; nos duobus ejusmodi secundis minutis per pulmonem trajici ponimus. Ita fiet, in venis pulmoneis, quod in venis cavis notissimum est α , ut nimirum repleantur, quo tempore sinus sinister in systole versatur, & paulo post in laxatum sinum se evacuent.

Objicit vir Clarissimus, ex ea nostra solutione, quam facile pro acri suo ingenio prævidebat, sequi, ut vena pulmonalis perinde, uti arteriæ, pulset, cum ex nostra hypothese priori minuto secundo ab arteria sanguinem accipiat, emittat in sinum altero: id autem credit vir Ill. absurdum esse. Verum, quod ipsi sensus demonstrant γ , id quidem absonum esse nequit, & venæ pulmonales omnino conspicuo pulsu agitantur. Neque ideo causa caderet *Harveus*, si nullus in ea vena pulsus oculis se of-

ferret. Posset enim robur ejus venæ ad vim inpellentem arteriæ unice majus esse: & perinde a vena pulmonali pulsus abesse, uti ab animalium frigidorum & arteriis abest, quas tamen ipsa vis proximi cordis replet. Vide, quæ aut similia nostrorum, aut alia, contra Ill. viri sententiam ab *Edimburgensibus Medicis a*, & ab Ill. Archiatrorum comite *b* proposita fuerunt.

Nuper Cl. *Monfils* receptam sententiam impugnare suscepit; negavit enim utrumque ventriculum una contrahi, neque cessit experimentis in animale captis, quæ non vult demonstrare quidquam. Nihil tamen adtulit, cur paradoxam opinionem receptæ præferamus *b**.

§. XXIV. *Finis motuum ventriculorum, aurium, cavæque venæ, & pulmonalis.*

Multa de motu cordis diximus, addenda sunt de quiete aliqua. Nempe animali, sub proximæ mortis vi nunc languenti, sensim debiliores *c* cordis contractiones fiunt, & pro debilitatis modo crebriores *d*, unde ille vermiculatus morientium pulsus, adeo cum minutie creber, ut omnino numerari nequeat. Deinde intervalla inter cordis contractiones nascuntur, quæ & a pulsu

z Fufe de ea re dicitur L. V. Conf. le *Second Memoir. sur le mouvement du sang.* p. 236. n. 4.
a *Essays of society at Edimburgh.* T. III. p. 398.
b *Senac* l. c. p. 297.
*b** *Journ. de medec.* a. 1776. sept.
c *Ens* l. c. n. 14. *Senac* p. 320.
d *Senac* *ibid.*

intermittente adgnoscas, & a respirationibus in moribundis magno sæpe tempusculo interceptis, atque e longinquo redeuntibus. Etiam in vivis animalibus hæc intervalla sunt duorum, & quatuor e secundorum minutorum, & integrorum demum minutorum *f* primorum. In ovo incubato pulsus languido animali primo decem, tum sex, & quatuor, & duos demum in minuto primo fuisse vidi. Vidit in pullo Ill. *Caldanus* pulsus ante mortem ad 25. 21. 12. & 8. in minuto primo rediisse, clar. vero *Whytt* in ranis ad 28. 18. 16, ad 45. 40. 36. 30. ad 15. 6. & 2. & ad 11. 10. In cane *Caldanus* ad 25. 21. 12. 8. in minuto primo *f** vidit reductos.

Demum ventriculus cordis in rana post longam quietem quasi expergiscit, iterumque sopitur, & denuo post 15. minutorum moram pulsum molitur.

Tunc sinistrae cordis caveæ ad quietem se componunt, ventriculus quidem *g* ejus lateris, & paulo post sinus *b*, quarta hora parte, & aliquot ante dextram auriculam horis *i* quiescunt.

e *Tosetti* lettera 2. *esper.* 19.

f In animali rotifero *Baker employment for the microscope* p. 280.

*f** *Lentissimus cordis motus in animale morta. Massini esp.* 11. p. 6.

g *Harvei* p. 39. *Second Memoir. sur les part. sensibl. & irritables Exp.* 471. 474. 482. 512. 513. 514. 543. 555. & in

novis *exp.* in *Oper. min.* T. II. p. 164. editis.

b *Harvei* l. c. *Highbor de generat.* 71. de puncto saliente locutus, *Lancisius* p. 85. *Senac essays de physiq.* p. 479. *Second Memoir. Exp.* 482. 510. 512. 513. 514. 543. 555. *i* Hora dimidia *Exp.* 555. integra, an. 1756. duabus, in iisdem *exp.* & n. 473. 482. septem in *Exp.* 472.

Dextri quidem ventriculi pulsatio diutius *k* superest, ut tamen paulatim longiori intervallo post auriculam ventriculus contrahatur *l*, adeoque ratio pulsationum auriculæ ejus lateris ad pulsationes ventriculi increseat, atque sesqui altera *m*, dupla, demumque multiplex *n* fiat. Sed & ipse ventriculus in principio vehementer pulsatur, & frequenter, inde lentiores fiunt *o* pulsuum recursus, denique ne pulsatur quidem, sed palpitaciones nescio quæ carnum superficiem pererrant *p*, ut circa centra aliqua mobilia excitati tremores, & contractiones vicinarum fibrarum solæ adpareant. Et dextra auricula & dexter thalamus in cane motum suum diutissime conservarunt, in *III.* viri experimento, quem nuper amisimus *p**.

Cordis vero languentis motus frequentiores sunt, quam arteriarum micationes, ut omnino ad aliquot cordis pulsus semel arteria respondeat *p***.

In ventriculo vero dextro, & perinde in sinistro, apex *q* omnium ultimus & sponte contrahitur, & naturam irritabilem conservat. Cum

k Volcher Coiter obs. p. 125. Harvei 1. c. Drelincourt Canicid. V. Vieussens de remot. & prox. p. 87. Second Memoir. &c. Exp. 482. 543. 555. &c. Est tamen, ubi aliqua varietas intercedit. Ita ventriculus dexter ante auriculam sinistram quievit, in Exp. 474. 499. & semel in exp. novis.

l Exp. 473.

m In ventriculo pulsus 180. in auricula 240. in testudine Caldesi 1. c.

n p. 417. Ter, deinde quater, inde sexies Exp. 492.

o Woodward p. 87.

p Exp. 476. 484. 498. 499. 536. 537.

*p** Rat. med. IX. p. 218. 219.

*p*** Portal. apud Colomb. p. 37.

omnia in corde quiescerent, duabus horis elapsis, apicem vidi curvari, & eo irritato cordis motum successisse, cum reliquo toto corde la cessito nullus motus renasceretur. Post apicem septum cordis *r* motus & irritabilitatis tenacissimum fuit. Baseos autem cordis motum diutissime superesse, præter experimentorum fidem scriptum est *s*.

Quando nunc etiam dexter ventriculus elanguit, aut dissectus quievit, aliquamdiu plerumque *t* in auricula dextra motus superest. Vidi dimidia *v* superfuisse hora, vidi integra *x*, vidi duabus *y*, vidi septem *z* horis. Quinque *a* & sex horis in anguilla superfuisse vidi, & sex horis in cane *Wepfer b*. Triginta horis a cordis quiete pulsavit in testudine *c*, & sola absque corde in corpore relicta *d* in rana salit. Cor semel, auricula decies novies micavit *d**. Si particulam auriculæ requiris, quæ pergit moveri, quietis omnibus, aliquando apex *e* fuit appen-

q Morgagn. Epist. XV. n. Second. Memoir. Exp. 474.
54. Senac p. 335, Whytt. Exp. 492. 494. 512. 513. 514. 543.
 nostrum 535. 555. 556.

r Exp. 541. 543.

s Galeno Administ. Anat.
 XV. c. 15. Rioloano p. 415.

t Galenus l. c. Vesalius p.
 745. 824. Harvei p. 26. 27.

28. 39. & de generat. animal.
 p. 151. Drelincourt. Canicid.

V. Bohn circül. Phys. p. 93.
 Vieussens neurograph. p. 93.

J. Jac. Peyer obs. 32. Lan-
 cis. p. 85. Cl. Aug. a Bergen

Comm. lit. nov. 1738. hebdom.
 17. Browne Langrish, Whytt,

v Exp. 555. &c.

x Exp. 556.

y Nuper in fele.

z Exp. 473. in cane.

a Leeuwenhoeck Phil. Transf.
 n. 319.

b Wepfer de cicut. aquat.
 p. 304.

c Caldesi p. 66. 667.

d Exp. 479. 480.

*d** Massini esp. anat. 11.
 exp. 2.

e Exp. 474. 491. 535. 537.

dicis, alias particula aliqua venæ cavæ finctima *f*, & inprimis inferior *g*.

Ergo hæc auricula recte ultimum moriens *Galeno h* dicta est, & *Harveio i*. Eadem & diutissime, & expeditissime a quiete ad motum *k* revocatur, eaque ad motum promptitudine ventriculū superat *l*, quando aqua calida *m*, flatu *n* impulsio, aliisve modis excitatur. Deinde motus ejus vividissimus *o* est, & frequentiores, quam sinistræ, pulsus *p*.

Est tamen, ubi prior quievit, & ante suum ventriculū, & ante sinistras cordis caveas *q*. Verum ea exempla rara sunt, atque ad sanguinis immobilem congestionem, aliasve causas referuntur, quæ minime in corporis fabrica fundantur. Sed & ipsa dextra auricula, aut ea, quæ in animalibus frigidis unica est, sensim longioribus pulsat intervallis *r* prius, quam quiescat.

Non est præterea dissimulandum, partem venæ cavæ, auriculæ dextræ commissam, &

f Exp. 535.

g l. c.

h *Harvei Exerc. I. p. 39. Amstelodamenses in colleg. priv. obs. p. 22.*

i *Senac l. c. Second Mem. Exp. 498. 499. 510.*

l *Tosetti letter II. Esp. 20. in Wepfer cicut. aquat. p.*

304. Woodward suppl. p. 77. 78. Whytt p. 352. 353.

n *Leeuwenhoeck Phil. Transf.*

n. 319. de anguilla locutus.

Zimmermann l. c. p. 58. &

comp. Exp. nostra.

o Exp. 488.

p Exp. 540.

q Exp. 496. 541. 545. *Woodward suppl. p. 87. in vi-*

pera.

r Exp. 474.

diu semper *s*, & nonnunquam omnium ultimam pulsasse *t*, & ipsius auriculæ constantiam superasse. Perinde etiam ea vena in moribundo animale sæpius pulsat, donec semel auricula contrahatur *v*.

In sinistro latere similiter ventriculus ante suam auriculam, finumve cessat: deinde post quietem sinus venæ pulmonales ultimæ pulsant *x*, & alterne sanguinem a pulmone accipiunt, ipsique reddunt. Dum animali robur superest, tota in pulmone venæ longitudo pulsat; quando vero nunc debile est, tunc brevior perpetuo venæ portio micat. Ita dum viget motus, in venis pulmonalibus & cavis synchronus est *y*, quando vero elanguit, tunc superat vena cava, & frequentia pulsuum, qui multo numerosiores sunt, quam venæ pulmonalis *z* pulsus, & diuturnitate.

Finem motus cordis, qui nonnunquam cum contracto statu conjungitur *z*^{*}, alias discernus Ipsa plenitudo contractionis resistit *z*^{**}.

s Walæus Epist. I. p. 399. Nicolaus Stenonis E. in Act. Hafniens. l. c. & in Epist. Barthol. 26. Cent. IV. Muralt vademec anat. p. 385. Lower c. II. p. 49. Wepfer l. c. p. 172. Collegium Amstelod. Priv. obs. p. 22. Lancisius p. 84. 87. ed. fol. Fanton p. 297. 315. Whytt p. 354. 359.

t Fantonus, Walæus, Lancisius, Wepferus. Frequenter in experimentis meis anni 1756. duabus etiam horis, & tribus, & ultra supervixit.

Ultimus sanguis trepidat Harveyus de generat. anim. p. 151. *v* In iisdem exp. Conf. p. 296.

x Hora, post quietem auriculæ elapsa, centum etiam & decem minutis & ultra.

y Ibid.

z Bis & ter, & decies, & duodecies vena cava pulsabat, pulmonalis semel.

z^{*} In pullis Caldan. rifless. p. 253.

z^{**} K. Sw. Wet. Acad. Handl. 1764. Tom. 4.

§. XXV. *Vis cordis penetrat in arterias capillares*

Tempora motus cordis diximus; superest ut vires hujus cavi musculi metiamur, qui dudum plurimus physiologorum labor fuit. Et ingentem quidem vim tantillæ carnis esse, obiter insipienti patet; quæ comprehensa nullo manus robore coerceri, nullo pene pondere elidi possit, pectorique imposita maxima pondera quolibet ictu elevet: quæ præterea sola, & perpetuo, & absque fatigatione laboret, & quin quies millies in una hora, totis centum annis, nullo alterno somno recreata, perenni labore defungatur; cum omnes alii, multo majoris ponderis, musculi intra paucissimas horas ita lassentur; ut invitissimo homini quietem extorqueant. Verum accuratius omnino has miraculo proximas cordis vires metiri oportet.

Virium mensura effectus est, nam motus ipsius, rei quidem notissimæ, naturam tamen nemo philosophorum perspexit. Effectus virium cordis est expulsio sanguinis in arteriam pulmoneam, inque aortam, atque adeo in totius corporis arterias. Verum ejus expulsionis limites alii aliter posuerunt. Principium equidem aortæ, aut pulmonalis arteriæ, a sanguine, quem cor expulit, utique undique dilatatur, & una longius fit, atque adeo pulsus efficitur; atque paulo post eadem aorta in pullo constringitur atque ex pallefcit; quousque vero hæc pulsatio procedat, an in omnes arteriarum ramos vis cordis penetret, an in venas demum

continuetur, & venosum sanguinem promoveat, & humores tenuiores, hoc loco inquirendum est.

Et pulsus quidem, qui cordis effectus est, ostendemus, in calidi sanguinis animale, pervenire, ad eas usque arteriolas, quæ sextam partem lineæ latæ sunt *b*, cum per intestina curvata, ejusmodi arteriolæ pars prior ultra secundam protrudatur. In ea tota sede arteriarum perpetuum est, ut sanguis de percusso vase exsiliens fortiter *c* prorumpat, quo tempore cor contrahitur, & leniter elabatur, quando cor in diastole quiescit.

Deinde ultra hos limites vim cordis penetrare experimenta suadent, quæ lente vitrea admota capiuntur. In minimis ergo ranarum arteriis *d*, unius, paucorumve globulorum latitudinem habentibus, millies adeo, & ultra, uncia minorem diametrum nactis, tamen, quamprimum summa celeritas sanguinis arteriosi elanguit, omnino in arteriis minimis ad singulas cordis contractiones succussio aliqua, atque acceleratio, in globulis cruoris percipitur: singulis etiam pulsibus retrocedens versus cor unda sanguinis in ordinem reducitur, & in legitima directione versus minimos arteriæ *e* ramos impellitur. Ita

a Ibid. ad centum & decem minuta. 84. 85. 91. 126. 163. 173. 189.

b *Memoir. sur le mouv. du sang. Exp.* 44. 46. 52. 55.

c *Senac* p. 338.

d *l. c. Exp.* 67. 71. 81. 82.

e Ibid. p. 62. *Leeuwenhoeck experim. & contemplat.* p. 65. *Baker Philos. Transact.* n. 460. & in *microsc. made easy*, p. 134. 136.

vidi frequentissime, vidit vir acutissimus *Felix Fontana*, vidit Cl. *Spalanzanus*, vidit Cl. *Reichelius*.

§. XXVI. *An in venulas.*

An etiam in venis sanguis vi cordis agatur, dubitatum est *f*. Experimenta quæ accelerationem, a systole cordis factam, in minimis venulis *g*, & demum in grandioribus truncis, suo testimonio confirmant *h* graves, & in experimentis versati Cl. viri; inter eos Cl. *Spalanzanus*. Possem eorum testimonia ad evincendam vim cordis in venas hactenus adhibere, quod ii viri omnino, in suis certe animalibus, eam vim in venas continuatam viderint, atque adeo eadem vis eousque pervenire possit: indeque non absque candore mihi liceret deducere, etsi in aliis exemplis acceleratio venosa non percipiatur, *negativos* tamen eventus iis, qui adfirmant, nunquam suum robur demere. Verum ego quidem nolim eo argumento uti, cum nulla unquam in venis cordis actio mihi adparuerit *i*. Vere tamen in venas hanc actionem pervenire, aliis rationibus evincam. In ranis certe, frigidisque animalibus, pleræque arteriæ contractili vi destituuntur *k*; ut omnino

f Negat vir Cl. *Josias Weitbrecht* Comment. Acad. Petrop. Tom. VII. p. 320. Tom. VIII. p. 339. 340.

g *Stephanus Hales hæmastat*, p. 69.

h *J. Walæus* Epist. I. p. 781. edit. 1674.

i l. c. Exp. 122. 130. 132. 133.

k L. II. p. 140. 141.

præter cor nulla causa ejus motus supersit, quem in venis percipimus: ex ordine enim ostendemus, quam parum reliquæ causæ ad faciendi animalis legitimum circuitum ciendum possint. Sed etiam in calidis animalibus pars magna virium venosi sanguinis a corde manifesto pendet, cum eo tempore perinde fluat, quo arteriæ dilatantur, inque suum adeo sanguinem nihil quidquam agunt. In medias usque venas pulsus non pertinet *Spalanzano* teste.

§. XXVII. *An in vasa minora.*

An etiam liquores minorum generum a corde in motum cieantur, experimento ostendi nequit, cum omnino neque in lymphaticis vasis impulsio alterna percipiatur, neque in decoloribus arteriis experimenta facta sint, aut facile fieri possint. Parem tamen eorum vasorum cum venis rubris naturam, paremque in utramque classem cordis potentiam, ratio suadere videtur. Cum enim venarum sanguinem a corde agi ostenderimus, & æque facile in pleraque vasa minora, quam in venas, humores impellantur *l*, adeoque ad vasa minima motus ex arteriis æque integer perveniat, quam ad venas, pariter etiam cordis vim, ut in venas, ita in vasa minima continuari crediderim. Deinde mihi quidem probabile videtur, omnem humo-

humorum universitatem in corpore animali ab unico motore in circulum agi; cum in homine submerso, aut animale emortuo, cujus omnes humores quiescunt, cor solum ad motum revocasse sufficiat, ut ejus humores, ex longa etiam aliquot horarum quiete, in legitimum motum redeant, & vita integerrima restituatur, nulla alia totius corporis parte murata. Ita alibi quidem fusius experimenta recensentur, citasse interim suffecerit experimentum, toties a *Wepfero m* aliisque Helvetiis incisioribus factum, quo aër per ductum thoracicum inflatus cordi vigorem & humoribus suum motum reddit; aut simplicius alterum, quo aër per venam cavam *n*, eodem effectū, in cor pulsus pariter vitam revocat: aut nuperum illud Basileæ factum, quo avis submersa & emortua, in deplumato uropygio scintilla electrica tacta, a succussu nervoso in vitam reddi dicitur, quod quidem experimentum a me repetitum ad superstitem post mortem motum musculorum reddit, quem sopitum scintilla electrica potenter suscitatur. Huc referas demum notissima alia tentamina, in quibus submersi homines spiritu ammoniaci salis in nares instillato *o*, aut acri clystere subdito *p*, aut aëre per os & asperam arteriam inflato *q*, aut quocunque demum vehe-

m Sect. V. p. 467. ed. 1757. & *Se-* 389. ejusd. libri.
cond Memoir. sur les part. *o* Sect. V. p. 496. ed. 1757.
irrit. & sensib. Exp. 473. *p* Ibid.
n Exp. 378. &c. not. c. p. *q* Ibid.

mente dolore *r* excitato in vitam revocantur. Cum enim in his omnibus experimentis neque arteriarum universus habitus, neque vascula minima mutantur, & unice cor in motum redire cogatur, in corde causam motus humorum esse adparet, non in arteriis, aut magnis, aut minimis.

Evolutiones etiam animalis, maximasque in tota fabrica mutationes, vi cordis urgentis perfici, insecta declarant *s*. Iterum certissimum est, pulsus, & motum adeo sanguinis, ablato cordis motu subito supprimi. In vivo homine, cum cor tangeretur, subita syncope successit *t*. Quiescente aut sublato corde pulsus tollitur *v*, ut innumeris in exemplis vidi. In juvene, cui pars cordis ossea, & pars lapidea fuit, nullus integris 24 horis in carpo pulsus tangi potuit *x*. Frequentia sunt exempla mortis subitæ, cum valvulæ aortæ osseæ factæ denique conniverent, neque sanguini ex corde in aortam aditum concederent.

Deliquium animi, quæ cordis est quies, subito & pulsui finem facit, & hæmorrhagias omnes, adeoque motum arteriosi sanguinis supprimit. Ligata arteria, ut cordis vis ad ejus ramos pervenire nequeat, pulsus trans vinculum subito supprimitur *y* & remoto vin-

r Ibid. scalpello admoto *nac* T. II. p. 344.
Zod. Gall. P. II. p. 264.

s Erucae in chrysalidem mutatio fit vi cordis valide laborantis *Malpighius de bombyce* p. 26.

t La Peyronie apud Ill. Se-

v Exp. 219. 227. 229.

x Obs. Patholog. 52.

y L. III. p. 373. *Second Mémoire &c. Exp.* 192. 201. 204. 206. 207. 217. 220. 227. 228. 230.

culo redditur z , & vulnus denique cordis gravius, aut alia diruptio continuo occidit a : & polypus subito in ventriculum dextrum delapsus a^* , qui suspensus fuerat a^{**} : etsi in his omnibus exemplis arteriarum, minimorumque vasorum vires integræ supersunt.

Denique sæpe pullum contemplatus, qui ovo incubato continetur, comparavi miram vivacitatem & igneam vim corculi, sub finem secundi diei duriusculi, firmi & terminati, cum pigro & diffuente muco, quo reliquum corpusculum constat, & cum summa mollitie arterio-
larum, quæ in eo muco artuum, viscerumve, aut in cerebri aqua cogitari possunt. Facillimum etiam *Harveii* experimentum sæpe repetii, quo languens pulli corculum stimulo, guttave aquæ calida, ad celerrimum, inque omnes arterias etiam membranarum propagatum, motum suscitatur, cum nullo alio modo, nulla irritatione arteriarum, viscerumque, quidquam vel eminus simile, aut minimum motum, excitare liceat, multosque demum post dies in musculis inque intestinis motus aliquis irritationem sequi incipiat. Sed etiam in homine, aut in animale calido, naturam summe irritabilem cordis, ignaviæ vis contractilis arteriarum, & perfectæ in frigidis bestiis inertię, & immobili torpori re-

z Ibid. Exp. 87. 207. *l'Acad. des scienc.* 1732. p.
 a *Mus. Petropolit.* T. I. p. 430. &c.
 313. *Robinson of sudden deaths* a^* *Verschuer Exp.* 1. Spap.
 p. 44. *Morand Memoir. de lanzan. mot. sang.*
 a^{**} *Postel factum* p. 49.

liquarum partium omnium opposui. Aptitudinem denique ad motum, & tenacitatem vitæ expendi, quæ in corde est, & quam, præter intestina, nulla alia pars machinæ animalis attingit *b*. His omnibus consideratis, præcipuam, & parum ab unica distantem, motus omnis in corde scaturiginem in corde reperio. Sic vir mathematicus innutritus *Mdttb. Gabler b**.

§. XXVIII. *Primum movetur & fetui grandius est.*

Merito adeo inter partes animalis primum cor movetur. Nam is ipse motus, qui altero die vertente in pullo, albo *c* hætenus & decolore, conspicitur, ex subsultu alterno agnoscitur cordis efficaciam deberi. Primum etiam viscerum cor figuram conicam, soliditatem, naturam irritabilem, ostendit, & pectus solum replet; quo tempore cerebrum fero lactis simile, pulmo minimus & ad dorsum retractus, neque conspicuus, ventriculus, hepar, intestina, renes, sub albo gelatinæ habitu latent, neque aut brachiorum vestigium est, neque pedum, vasa vero pauca hætenus, & potius viæ aliquæ, quam vasa, per membranam umbili-

b Second Memoir. sur les part. sensibles & irrit. p. 387.

*b** Pressavin recerch. Refer huc locum Aristotelis juvenit. senect.

*b*** De tubul. capill. Ingolstatt. 1774. 4.

c Non recte adeo passim scribitur, cor scrius generari, quando jam vasa sanguinea adparuerunt *Homme physique* p. 100. 101. qualia etiam *R. Whytt* profert inquiry into causes &c. p. 80.

calium vaforum delineantur, reliquæ adeo animalis partes & minores, & imperfectæ sunt. Die demum 14 irritabilis apparuit in intestinis *c**, die vigesimo in musculis, in corde ante secundum *c***.

Ita in deliquio animi, quando & sensuum officium interceptum filet, & cordis pulsus, prius semper cor ad officium redit, tunc demum cerebrum.

Hinc in fetu cordis portio ad reliquum corpus major est, maxima quidem in pullo ratione, cujus cor sub finem diei secundæ capite aliquanto minus, cæterum toto corpusculo crassius, ejusque quinta aut paulo major est portio. In fetu jam maturiori cor ad cor adulti hominis fuit, uti 40. ad 24. *d*: in vitulo vero abortivo ad cor vaccæ, uti 12. $\frac{3}{4}$ ad 9 $\frac{1}{4}$ sive uti 51. ad 37. *e*. In pullo cor primis animalculi diebus multo pulmone majus est, artuve quolibet. Sed etiam, postquam animal in lucem editum fuit, tamen quam in adulto cor majus est *f*, idemque magis irritabile, facilius ad motum revocatur *g*, & diutius in emortuo animale pulsat *h*. Hinc etiam intra datum tempus plus sanguinis per cor pueri, quam per cor hominis adulti fluit, pro molis portione. Contra in

*c** *Form. du poul.* ll. p. 391.

*c*** *Ib.* p. 416.

d *Raïsin Embryolog.* p. 10.

11.

e *Robinson of food and discharges* p. 120.

f *Idem Essay on animal* 14.

economy T. ll. p. 408. *Dis-*
dier anat. raisonnée p. 180.

g *Tosetti Lettera* ll. obs.
XI. XII.

h *Maitre Jean de formation*
du poulet p. 285. *Ens l. c.* p.

ætate adultâ & vergente vires, hominis, uti cordis portio, sensim minores fiunt, & pro portione resistentiarum debilitantur *i*.

Sed etiam in animalium quadrupedum, inque avium genere, cor semper iis animalibus majus est, quibus statura minor *k*, & minus contra, pro portione universi corporis, iis quæ grandiora sunt. Inde fit, ut minutioribus animalibus pulsus numerosiores, vivida vita, & major alimentorum venerisque cupido sit *l*, in grandibus autem bestiis hæc omnia languidiora, & lentiora videantur.

Avibus cor grande *m*, pulsus numerosissimus, incrementum multo celerius *n*, quam quadrupedibus est, & cor magis irritabile *n*^{*}.

Denique inter animalia piscibus cor minimum est *s*, octuplo certe, quam avibus, minus. Et inter pisces, ii qui teretes, iidemque magis agiles sunt, ii quam plani, lenti & reptantes pisces, cor quadruplo grandius habent *t*. Cor canis piscis, germanice *Sèekaze* dicti, exiguo nummo danico (*Schilling*) non majus est *t*^{*}. Calidis porro piscibus, quam frigidis, cor multo majus est, neque in illis cetaceis,

i Berner applicat. mechanis. &c. p. 70.

k Robinson on food and discharges p. 103, 104. Anim. Oecon. T. II. p. 408.

l Cheselden l. c. p. 200.

m Habet se ad cor quadrupedis, ut 168, ad 263. Robinson lib. c.

n Willughby ornitholog. p. 13.

n^{*} Maitre Jean p. 285.

s Idem ibid. p. 107. Essays on animal œconom. T. II. p. 408.

t Idem of food &c. p. 109.

t^{*} Abhandl. der Drontheim. Gesellsch. T. II.

magnitudine quidquam concedit cordi quadrupedum.

Hæc omnia, ni fallor, consentiunt in eam sententiam, quam proposui, omnem nempe & sanguinis, & reliquorum humorum motum ab uno corde pendere; quam etiam sententiam vir *Ill. Spalanzanus* mecum tuetur, cujus consensum plurimi facio. Una declarant, minime recte pronunciari, in omnibus animalibus corda habere vim quadruplicatam diametri homologæ animalis sui x . In aliis enim corda majorem ad sua corpora rationem habent, minorem in aliis.

§. XXIX. *Adversariorum objectiones. Ab animalibus corde destitutis.*

Contra hanc cordis prærogativam plurimi nuperorum argumenta sua protulerunt, atque alias præter cor vires sanguinem moventes proposuerunt; quas cordis potentiaæ aut æquales, aut omnino superiores faciunt. Sed & ego proprio scripto ejusmodi causas y per experimenta mihi cognitæ recensui. Hæc, ut cum nostris placitis concilientur, proximus labor erit.

Et primum, *Ill. viri* ea nobis exempla objiciunt z , quæ de fetubus absque corde vegetantibus, deque hominibus cum gravissimis

x *Jurin* diff. p. 83.

tot.

y *Second Memoir. sur le mouvement du sang, Sect. VIII.*

z *Whytt physiological essays* p. 45.

cordis morbis tamen victitantibus, passim descripto exstant. Et illorum quidem fetuum non valde rara exempla sunt. Proprium descriptum est a *Winslowo* a. Aliud cum vasis absque corde in thorace quasi solutis recenset Ill. Archiater *Gerardus* v. *Swieten* b. Aliud Cl. *Curtius* egregie descripsit, aliud Cl. *Henkel*. Fetus capite destitutus & corde b*; fetus absque pulmone, corde b**; sic absque corde apud Cl. *Azzoguidum* b***. Cl. *Cooper* nuper fetum descripsit, cui neque caput, neque cor, sed umbilicalis vena motus principium fuit b††. Cl. *Sabatier* de corde refert, de quo ad *Boerhaavium* a. 1720. Edimburgo rescriptum fuerit. In eo nihil de corde supererat præter auriculam dextram, ut pulmonis arteriæ ex aorta prodicunt b†††.

Morborum, qui cor pene totum lenta vi destruxerunt, etiam aliquot exstant narrationes c. Inflammati cordis c*, &

a *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1740, p. 594. 595. *Transf.* T. LXV. P. 11.

b l. c. T. I. p. 256. Alia exempla habet *Everardus*, *Voglius* in *hist. fluid. nerv.* *Valisnerius* Oper. T. II. p. 302. *Schelhammer* Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 9. obs. 148. *Monrous* apud *Cheselden*. Birch. I. p. 393.

b* Birch. I. p. 393.

b** Guil. Cooper. Phil.

b*** *Observ.* p. 55.

b†† *Phil. Transf.* T. LXV.

b††† *Sabatier* II. p. 62.

c Ut leviores cordis extimi corruptiones omittamus, & vulnera cordis fero funesta, quorum historiæ omnino vulgo prostant.

c* *Buttner* *Zweyköpf.* *Kind.* *Treconat* *Memoir.* inde pus in pericardio.

ulcerosi & laceri *c***. A fistula thoracis pene tota cordis caro consumpta *d*. Cordis caro pene excusa, ut exsuccum aliquid, rugosumque, & piri tosti simile de corde superesset *e*. Plusquam dimidia pars cordis putredine absumpta *f*, post frequentia animi deliquia. A febre quartana cor flaccidum & pene deletum *g*. Pulmo & cor ipsum ab abscessu consumptum, pericardio connatum, vesicæ simile *h*. Cor tabefactum, ut solæ tunicæ superessent *i*. Cor post pleuritidem sæpe pene totum destructum reperitur. Idem gangrænosum, & ventriculus sinister ossis *k*. Cor consumptum, ut solum fere sinistri ventriculi vestigium reliquum esset *l*. In peripneumonico cor omnino nullum repertum *m*. Cordis loco nihil nisi putrida caro *m**. In tabidis cor erosum passim lego *m***. Ulcera in corde & post syncopen mors *m****.

Vulnera etiam cordis non rara sunt, quæ aut fero valde, & quarto, nono, decimo octavo demum die mortem intulerunt, aut omnino sanationem admiserunt. Nam de globo plum-

*c*** Haen rat. med. IX, c. 1. in hydropse pectoris.

d Dom. de Marchettis observ. 47.

e Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 65.

f M. Cornax enchirid. p. 206.

g Klaunig. nosodoch. obs. 69.

h Lud. Leodigar. Gouey le véritable chirurgien p. 269, 270.

i Martinez de corde p. 20. ex Telefio, Linden select. p. 261.

k Senac T.I. p. 483. T. II. p. 222. 223. 381. 389.

l Idem T. II. p. 390.

m Georg. Aug. Langguth de sensor. commun. p. 14.

*m** Euth. E. N. C. Dec. III. ann. 2. obs. 9.

*m*** Fanton. obs. 14.

*m**** Fernol pathol. V. p. 288.

beo in corde cervi reperto *Bartholini* est testimonium, & de sagitta *Caspari* a *Reyes*, de bacillo *Henrici* ab *Heers*. Cervos etiam qui vulnere cordis superfuerunt, recenset *C. a Reyes*.

§. XXX. *A motu sanguinis, qui cordi evulso supereft.*

Sed etiam in nostris experimentis, in animalibus frigidi sanguinis, & inprimis ranis, & piscibus *n*, sanguis evulso corde *n*^{*}, aut resectis magnis arteriis, per viginti *o*, viginti septem *p*, triginta *q*, & triginta sex *r* horæ minuta, in arteriis *s* & in venis *t* etiam manifestius, oscillavit, varieque motus est, ex microscopii testimonio. Aliqua etiam, ejusdem fere sensus, exempla passim apud alios scriptores exstant. Nam & testudines biduo absque corde vivunt, procul dubio, non absque humorum vitalium motu *v*, & in pisciculo, cui cor quieverat, motus sanguinis per caudæ vasa ab aliis *Cl. viris* descriptus est *x*, & arteriæ, corde destructo, sanguinem suum paulatim omnem expulerunt *y*, aliaque exempla vitæ sine

-
- | | |
|--|---|
| <i>n</i> Exp. 196. | 222. 225. 226. 228. 234. 235. |
| <i>n</i> [*] Nempe vivit animal | <i>t</i> Exp. 195. 196. 204. 206. |
| tardigradum ai <i>Hist. nat.</i> | 217. 218. 221. 223. 224. 225. |
| <i>Brasil. L. I.</i> | 226. 227. 228. 229. 233. 234. |
| <i>o</i> Exp. 235. | <i>v</i> <i>Caldest l. c. p. 76.</i> |
| <i>p</i> Exp. 226. | <i>x</i> <i>Woodward Supplement p.</i> |
| <i>q</i> Exp. 194. 222. 225. | 101. 102. |
| <i>r</i> Exp. 229. | <i>y</i> <i>J. Alphons. Borell de mo-</i> |
| <i>s</i> Exp. 194. 195. 196. 221. | <i>tu anim. L. II. prop. 31.</i> |

corde alias repetentur 2. Dudum *Stablius* negat, corde quiescente mortem contemplo adesse 2*, nec animal corde evulso mori vult, dum venas ligaveris 2**.

Per hæc experimenta videtur ostendi, absque cordis auxilio sanguinis motum continuari, alias adeo causas esse, quæ eum humorem per vasa circumvehant.

§. XXXI. *A necessariarum virium defectu.*

Ostenderunt adeo Cl. viri, cor ad motum sanguinis non requiri: proximum erat, ut demonstrarent, ad eum motum producendum idem non sufficere. Quare alii *a* quidem brevius, undam sanguinis a corde propulsam negarunt totam humorum massam promovere posse: alii *b* experimentum produxerunt, ex quo constet, ad liquorem per minima mortui animalis vasa transigendum requiri lapsum ab altitudine ejus dupla, quæ cordis potentiam exprimit. Alii *c* omnino negarunt, cordis impulsiones alternas in minimis arteriis percipi, ut ne ad vascula quidem rubra ejus organi vis penetret. Sed & alia protulerunt alii *d*.

2 L. VI. p. 105. seqq.

2* *Theor. mort.*

2** *Glos ad J. Fragosi chirurgiam.*

a Alexander Thomson diss. med. 1.

b Job. de Gorter Exercit. V. n. 2.

c Hales hæmæstatiks p. 23.

ll. Baker microscope made easy p. 121. F. de Sauvages in comment ad hæmæstatica p. 250.

d Nicol. Andry in remarques de medecine, Ill. Senac, Jos. Brun otia physiolog. p. 15.

Argumento vero multo numerosiora, magna cum animi contentione collegit *Robertus Whytt* e, cujus intererat, ne cordis potentia movendo sanguini sufficeret, ut aliam nempe huic potentiae vim, a se ipso noviter detectam, stabiliret. Ergo primum, calculis ad *Keiliana* principia positis, reperit, globuli quidem rubri pondus esse *f* ad granum uti 1. ad 50. 000. 000. inde construxit, momentum cordis, globulum in arteriolam capillarem urgentis, non esse majus duplo pondere ejus *g* globuli: detracta vero frictione, aliisque causis impetum sanguinis frangentibus, ne tertiam quidem partem ejus ponderis æquare *h*, nempe eum globulum omnino promovere non posse. Inde omiſſis, quæ contra vim nerveam opponit, & quæ ab inmensis ponderibus refutantur, a convulso exiguo nervo superatis, *Idem* a *Stephano Hales* recipit, vim cordis esse 60 librarum *i*: cum vero area ventriculi sinistri cordis quindecies major sit, quam aortæ est area, omnino vim cordis, que sanguinem in aortam propellit, ne quidem duarum librarum esse *k*. Et tamen sanguinem ad cor redire, vix cum decima parte ejus momenti, cum quo in aortam exiit, atque adeo, in hypothefi recepta, novem de-

e *An inquiry into the causes which promote the circulation of the fluids in the very small vessels of the animals* Edinburgh, 1755. 8.

p p. 10.

g p. 10. 11.

h p. 19.

i Liberaliter, loco 51. quas *Halesius* numerat p. 30.

k p. 31.

cimas fui momenti a corde omnino pendere *l* idem tamen admittit. Neque posse *Borellianam* illam *m* virium percussionis pene infinitarum hypothesin locum habere credit, cum vis cordis premens sit, neque ad percutientes pertineat *n*. Cordis vires non majores esse, quam $\frac{250}{864}$ intra minutum secundum elevatis, cum voluntariæ vires sint $\equiv 70$. *l*. intra idem tempus *n**. Aliam etiam causam motus in finibus venarum umbilicalium positam esse, cum cor non ante finem secundæ diei pulset *o*.

§. XXXII. *Adjungitur cordi arteriarum contractio.*

Si vis cordis neque requiritur ad motum sanguinis, neque sufficit, sequitur, ut alia aliqua vis sit, a qua in circulum urgeatur. Contractionem arteriarum plerique *p* produxerunt, quæ viribus cordis aut æqualis sit, aut major. Nam æqualem faciunt, qui cordis & arteriarum officia partiuntur, ut sanguis a corde in minimas arterias urgeatur, ab arteriarum contractione vero in venas *q* prematur. Præferunt ar-

l p. 34.

m *l. c.* prop. 78.

n Aliquid simile, sed de sanguinis venosi motu, ante Cl. virum in Germania proposuit *Ern. Ant. Nicolai vom pulsschlage*.

*n** *Sauvages inflamm.* p. 229.

o p. 80.

p *Thomson l. c.* *Audry l. c.*

q *Pechlin de corde n. 22.*

Thomson p. 26. 28. 35. Scaramuzzi in Giornale di Parma 1689. n. 8. Vieussens de corde p. 77. Andry l. c. C. Gottl. Ludwig physiolog. p. 203 J. de Gorter l. c.

terias cordi, qui & majorem arteriarum irritationem esse, quam cordis *r*, a solis venis sollicitati, & demum vim cordis ab arteriarum reactione multiplicari docent *s*.

Addunt, arteriam obstructam omnino vi sua contractili sanguinem suum repellere *t*, hinc arterias umbilicales evacuari; & in vivo homine pallorem, qui extremæ debilitati supervenit, manifesto ostendere, sanguinem ex minimis vasis versus cor redire *v*. Eamdem vim aut per ea experimenta demonstrant, quæ recensuimus *x*, aut per ea mala, quæ superveniunt, quoties arteriarum constrictio nulla est. Nempe natura ossea non infrequens malum est. Ab ea causa sanguinem aiunt in venas quidem colligi, collectum vero stagnare *y*, altero quasi embolo ablato, cujus focia cum corde potentia sanguinem in sano homine movet, & quo sublato dimidia vis circuitus perit.

Sed etiam pulsum in arteriis ab ossea natura obrepente debilitari *z*, indeque gangrænas fieri monent *a*. Ita in gangrænoso corpore omnes arteriæ dilatatae *b* fuerunt.

Multum existimarunt contra cordis prærogativam experimentum valere, per quod constat, in singula parte corporis humani, inque ea sola,

r Senac l. c. T. II. p. 200.

s Ibid. T. II. p. 166. 224. 225. 226.

t Idem ib. p. 173.

v Idem p. 174.

x p. 174. seqq. hujus operis.

y In vena cava Santorin de nutrit. n. 15.

z Vieussens du cœur p. 107.

108. Senac T. II. p. 224.

a Philos. Transact. n. 280.

Becket. obs. 27.

b Philos. Transact. n. 335.

posse inflammationem cieri, adeoque in eam solam partem sanguinis fluentum invitari. Nunc id fieri non posse, si ponas, solum cor sanguinei motus fontem esse & causam: cor enim æqua vi in omnes corporis animalis partes sanguinem didere.

Alii Cl. viri in minimis vasculis auxiliarem vim quæsierunt, quæ cordis debilitati subveniat. Eorum aliqui adtractoriam vim *c*, aut suctionem, illi analogam, quæ in vitreis tubulis notissima est, in tenuissimis vasculis ponunt, quæ, dum sanguinis iter in minima accelerat, cordi subsidio sit. Inde explicant; quare in cadaveribus majores arteriarum trunci fere inanes, minimi ramuli cruore pleni reperiantur *d*.

Ita porro vulgare est visu, quod ex *Dinkleri* relatione repeto, quiescentibus arteriis cor porro moveri *d**.

§. XXXIII. *Et Oscillatio Vasorum minimorum.*

Deinde nuperi aliqui microscopicarum observationum scriptores repellentem vim arteriarum etiam oculis usurparunt *e*, ut modo sanguis a trunco ad ramos pergat, modo vicissim a

c J. Gottl. Kruger *physiologie* n. 125. Franc. Boissier in *Halesii hæmæstatiks* p. 9. Jos. Brun de *suctione vasorum capillariem in corpore humano*, Roederer C. G. T. IV. p. 212.

d Jos. Brun l. c. *d** Ap. Sandyfors *bibl.* II. *e* Boerhaave in *Praxi Med.* T. I. p. 298. & olim de *util. ratioc. mech.* p. 34.

ramis in truncum retrogrediatur. Ita in bombyce motum sanguinis antiperistalticum olim *Malpighius* contemplatus est *f.* Globulos liquidi vitalis in mytulis alterne ad arteriolarum oscula adtrahi, & alterne repelli, testis est *Stephanus Hales g.* Alternas contractiones vasorum minimorum in crure cimicis vidit *H. Baker h.*

His phænomenis superstruxit *J. de Gorter i.*, deinde *Cl. Robertus Whytt k.*, vim *oscillantem* aut *vibratilem* vasorum minimorum, quæ, præter cordis & arteriarum vires, ad promovendum humorum per minima vascula motum suum conferat. A stimulo nempe sanguinis aut humorum vitalium, irritata vascula alternis vicibus contrahi, eosque humores promovere, persuadetur uterque *Vir Clar.* Adducit *Cl. Whytt* exempla motus peristaltici intestinorum, adeo manifesto a stimulo nati *l.*: lacrumarum a stimulo fluxum *m.*, aut salivæ: inflammationem, sanguinis nempe acceleratum iter ad loca irritata, dolentia *n.*: irritationis etiam procul a loco adfecto continuatum effectum in calculo renali, in extima urethra sensum sui excitantem *o.* Obviam it *Idem* expectatæ objectioni, & negat, oculum, microscopiorum vi armatum con-

f p. 38. edit. Lond. in fol. 96. & in libello nuper citato *Hamastatiks* p. 96. *T.* tato Sect. II.
Schwenke p. 27. *l* p. 43.
h Lib. c. *m* p. 46. 49. 50.
i l. c. *n* p. 49.
k *Of vital motions* p. 95. *o* p. 51.

contractionem vasorum minimorum posse percipere, cum ea contractio in vasculo $\frac{1}{2000}$ pollicem lato, non sit major una $\frac{1}{150}$ maius diametri sui vasculi, atque adeo $\frac{1}{300000}$ pollicis, neque adeo oculo obvia esse possit *p.* Sed & aliam objectionem occupat *Vir Eruditus.* Cum enim vascula minima valvulis destituantur, potest objici, eorum contractiones perinde nocere circuitui humorum, dum eos repellunt, uti profunt, dum eos promovent *q.* Respondet, & a cordis & a magnarum arteriarum resistantia hunc regressum coerceri, & forte ab ordine peristaltico, quo prima pars cordi proxima vasculi contrahitur, tunc subinde reliqua ejus longitudo. Evictum adeo credit esse, in minore genere vasorum, fere per solam eorum vibrationem circuitum peragi *r.* & in universum in tota universitate vasorum causam motus sanguinis residere.

§. XXXIV. *Et vis expansi aëris.*

Dudum *J. Sophronius Kozak* a vaporibus sanguinis motum derivavit *r**; inde *Cl. Hutchinson* s. vaporem pro primaria causa motus animalis habuit, eandemque fere sententiam *Cl. Huberus* t. secutus est, calorem nempe, qui succos plantarum solus incitat, etiam in ani-

p Si æque magna sit dilata-
tio, adeoque contractio, ac
quidem in aorta *p.* 56. 57.
58.

q *p.* 59. 60.

r *p.* 60.

*r** *De hæmorrhagia.*

s In libro *Oeconomy of hu-
man frame.*

t *De aëre electro &c.*

malibus principem causam esse motus, quo vitales humores circum aguntur. Nempe ostendimus a calore hæmorrhagias fuscitari, quæ conquieverant *v*; calore cor ad pulsum optime irritari; pulsum, jam abolitum, pullo incubato, & animalibus hiberna quiete sepultis reddi, & increbescere *x*; cor exemptum in tepida multis horis pulsare *y*; infecta *z*, fetum humanum nuper in lucem editum, feminasque demum hystericas *a*, solo externo calore ad vitam revocari. Contra frigore pulsum numerum ad octavam fere partem *b*, & demum adeo potenter minui, ut in cochlea aquatili semel in octo horæ minutis cor pulset *c*, atque omnino frigeant animalia, simillimumque mortis somnum edormiant, nullo humorum vitalium conspicuo motu superstitite *d*. Eum veterum verno tepore resolvi, nullaque in animale parte mutata, totam torpentem machinam a solo aëris calore in motum reddi *e*. Esseque evidentissimum, quam promte infecta frigore langueant, cibique amittant adpetitum, calore vero ad motus validos,

v L. IV. p. 467.

x A 28. ad 87. in vipera
B. *Langrish on muscul. mot.*
ad fin.

y *Charleton three lectures* p. 577.
79.

z Tepore manus *Swammer-*
dam de respir. p. 101. Conf. *Follius recreat. ment.* p. 60.

a Pannis circumjectis pul-
sus redditur *Smellie cases in*
midwifry p. 308.

b Decem in. minuto primo
pulsibus *Floyer pulsewatch* p.
78. 350. Conf. L. VI. p. 163.

c *Hanov Seltenheiten* I. p.
577. *Lyonnet theol. des insect.*
p. 135.

d Cochleæ cor hiene non
pulsat *Harvei* p. 46.

e *Whytt* p. 42. De hiru-
dinibus *Phys. Oecon. Patriot.*
T. I. n. 49.

ad cibum capiendum, adque venerem incitentur. Sed etiam in perfectioribus animalibus, & puncti salientis pulsum frigida adfusa deleri *f*, & in meo experimento, cor felis evulsum, vivideque pulsans, subito ad quietem cogi. Veterum ergo huc revocarunt numerosis animalibus familiarem, meli, erinaceo, muribus montanis aliisque calidissimis etiam bestiolis, cum certum sit, hirundines, & magna sæpe copia, in arundinetis atque fluviorum ripis a frigore hiberno constrictas & exanimis proximas repertas, aut aëreo calore aut igne suppeditato revixisse. Pulsus, & calor, & cordis motus in his animalibus frigore tolluntur, a calore restituntur.

§. XXXV. *Alia de aëris vi hypothesis.*

Aliquantum diversa est hypothesis Cl. *Bèr-tier g*. Aërem in vasa sanguinea receptum, & calefactum, se dilatare docuit, ut in tubo vitreo calefacto solet, ita sanguinem propellere, & esse principem causam motus sanguinis. Dilatari vero parte quinta *h*, & sufficere propellendis 25 libris sanguinis *i*, cum id omne, quo ejus liquoris massa plus ponderat, ob tubi bicruris naturam, possit pro nullo haberi: celeritate vero majori sanguinem eo ab aëre incitari, quam quæ sit pedis in minuto secundo percurssi *k*, eoque

f Floyer l. c.

g *Physique des corps animés*
p. 197. 200. 202. & L. V. tot.

h Per experimentum in balneo maris factum p. 206.

i p. 206. 207.

k p. 210.

pertinere eum sanguinis motum, quem absque corde superesse nos ostendimus *l*, & eum, qui in vena cava moribundi animalis viget *m*. Neque cor primariam causam motus in sanguine esse, cum is liquor etiam eo tempore moveatur, quo cor in diastole est *n*. Ovi etiam incubati exemplum adducit, in quo equidem vix negari potest, rarefacti aëris pressionem suas in promovendis ovi humoribus partes tueri. Dedit tamen vir Clar., & dederat Cl. *Hutchinson*, cordis esse secundariam in motu sanguinis potentiam; moderari enim motum humorum, alias nimis præcipitem futurum *n*^{*}; deinde augere vires circuitum humorum facientes, cum eas in dilatatione reservet, quo in breviori contractionis tempore validius operentur *n*^{**}.

§. XXXVI. *Ad eas objectiones respondetur.*

Hæc clarorum virorum placita, experimenta & argumenta, candidus produxi, nulla, quantum in meo ingenio fuit, parte sui roboris exfuta. Superest ut ostendam, quare his omnibus perpensis in sententia maneam.

De motu quidem humorum primum dicam, & de vita, quæ aut absque corde in fetu superest, aut eo vehementer violato in adultis sustentatur. In priori quidem exemplo humo-

l p. 222.

m p. 233.

n p. 239.

n^{*} l. c. p. 359. Eadem fue-

rat opinio *Hutchinsonii* in
Oeconomy off human frame.

n^{**} l. c. p. 360.

rum lenta impulsio a matre advenisse potuit o ; in altero sensim pariter procul dubio vires vitæ debilitatæ fuerunt. Exiguam & imperfectam vitam pars superstes cordis, aut auriculæ nihil passæ p sustinuerunt. Accurate *Azzoguidius*, quoties cor nullum adfuisset p*, analogum aliquid superfuisse. Neque hæc morborum patientia ab aliis visceribus abest, neque eorum functionem refutat, neque cerebri gravissima mala, cum superstitæ vita aliquamdiu tolerata, cerebri, nervorumque in movendo corpore vim destruunt. Sed imprimis lenti morbi lentus effectus minime iis, adeo evidentibus, experimentis suam auctoritatem demere potest, quæ proposui q.

Ea vero experimenta, per quæ didici, aliquem motum & oscillationem aliquam in sanguine superesse, postquam cor quievit, motum ni fallor adtractionis evincunt, quo sanguis se ad sanguinem adgregat r. Verum is motus ita debilis est, & lenis, & incertus, ut nullo modo cum eo comparari mereatur, quo sanguis per vasa vivi animalis circumagitur. Testudinis absque corde vita, cujus simile in ranis existat exemplum, id solum ostendit, absque sanguinis arteriosi motu nerveam vim, & musculorum adagendum aptitudinem, aliquamdiu superesse.

o Conf. *J. B. Bianchi de due mostri*. p. 97. *Riderer Comm. Gott.* IV. p. 212.

p *Senac* l. c. T. II. p. 483.

p* p. 16.

q p. 317. 318. 319. 320.

r L. VI. p. 107. *Second Mem.*

sur le mouv. du sang. p. 341.

s *Exp.* 203. 204. 208. 210.

210. 210. 223. 228. 232.

Qui negarunt cordis vim & impellentem in arteriolaris minimis percipi, experimentum fecerunt in animale vivido v. Nam in languente, cujus sanguis paulo laboriosius circumit, utique singuli cordis pulsus arteriolarum sanguinem paulum promovent v*. Ipse *Leeuwenhoeckius* x & *Bakerus* y eo in animalis statu hanc accelerationem vidit, & *Steph. Hales* z, qui in arteriolaris negaverat percipi, in ipsis venulis alibi voluit observasse. Qui vero possit in venulas cordis vis continuari, si in arteriolaris nulla est?

Quæ *Cel. Whyttius* proposuit, minus nos movere debent, quæ ad propriam hypothesein ornandam pertineant. Quæ de globulis sanguineis sumit, a corde non majus habentibus momentum, quam quod tertia parte sui ponderis minus sit, ea refelluntur omnino ab experimento, siquidem celerrime per vascula minima, & immobilia, frigidorum animalium sanguis a solo corde promovetur, & eo resecto quiescit a, & eo ad motum redeunte ad motum redit, & evidentibus succussionibus, quas modo recensuimus, ostendit se a corde moveri.

Qui ad duas libras cordis vim reducit,

t A. de Heyde exp. p. 6.

H. Baker l. c. p. 121. G.

Adams p. 45. A. v. Leeuwen-

hoeck exp. & contempl. p. 167.

&c.

v Conf. Second Memoir. p. 39.

v* p. 317.

x Exper. & contempl. p.

175. & T. III. oper. p. 114.

y l. c. p. 136.

z Hamast. p. 69.

a Exp. sur le mouvement

du sang n. 192. 205. 207. 217.

220. 227. 228. 230.

quæ 51 libras adeo manifesto elevat, is inponat cordi, pectori, popliti vivi hominis pondus, & observet, quot libræ a pulsantis cordis apice recurvato, aut a sanguine in arteriam impulsio eleventur. Quinquaginta certe libræ, de extremo pede suspensæ, in singulo cordis pulsu sursum pelluntur *b*.

Calculi etiam illi, quibus Cl. viri ostendere voverunt, non posse magnam cordis potestatem esse, omnino nihil evincunt, cum eorum auctores vim irritabilitatis ignoraverint, quæ nullis legibus ponderum regatur, & cujus ope pondera multo corde majora ab eo moto subleventur, quæ a resistentiis augeatur, quæ potentiam vulgarem minuunt.

Premere cor, neque percutere, id quidem mihi mera videtur subtilitas. Musculus est, quem cor vocamus, musculorum est, si arctissime voce uti placet, percutere; neque video, cur cor omnium musculorum facile mobilissimum, inque motu suo constantissimum, a communi musculorum officio Vir Cl. releget? Embolo percutienti confert Cl. *Fournier b**.

§. XXXVII. *Quid verum sit in vi arteriarum contractili.*

Ostendi alibi, arterias contrahi & mortua vi *c* & procul dubio insita, quatenus in iis fi-

b Senac T. II. p. 153.

c Conf. L. II. p. 94. 136.

*b** Journ. de medec. 1774. seqq. ed. 1777. & L. VI. p. 79. seq.

bræ musculares sunt, *d* quam vim præter nos Cl. aliqui incisores in vivo animale viderunt. Id volo, vim mortuam non plurimum quidem posse, insitam, ut aliqua sit, debilem videri, quam neque sponte agentem unquam viderim *e*, neque irritatio mechanica fuscitet. Cum *Boerhaavius* sales volatiles in venas animalis syncopen patientis infudisset, nullus inde motus successit, continuo vero rediit, cum cor irritasset *h*.

Verum, si aliquod utique in propellendo sanguine arteriarum officium est, multo tamen superat cordis efficacia. Nam saltus sanguinis, quem arteria in sua systole propellit, manifesto debilior & minor est eo saltu, qui fit ab impellente cordis vi *i*. Et tamen in eo saltu & vis cordis, nondum utique amissa, & vis arteriarum contractilis conjungitur, & demum, fatente Cl. *Whyttio*, vis arteriarum minorum; ut manifesto debilior summa sit omnium virium, quæ præter cor sanguinem inpellunt. Debilis etiam est pressio, quam arteria in digitum immisum exferit: debilis motus systolicus, quem arteriæ se contrahenti idem digitus impositus percipit.

d Apud Cl. *Stæbelin* de pulsu p. 21.

e *Procopé* *Analise de la trituration* p. 64. 79. Argumentum Cl. viri est ejusmodi. Si vis fibrarum longitudinem arteriæ sequentium superat, nunquam poterit arteria con-

trahi, si major est vis circularium fibrarum, nunquam poterit dilatari.

h *Prax. Med.* Ultraj. edita T. I. p. 211. 212.

i p. 208. 209. *Exp.* 48. *Remus* l. c. *Exp.* 2. *Whytt* obs. p. 45.

Deinde manifestum est, multis omnino in exemplis, cor totam humorum universitatem solum emovere. Et primo in deliquio animi, quando cordis irritatio vitam restituit, totam eam massam quiescentem prius in motum cieri necesse est, quam arteriæ per eam dilatationem ad contractionem stimulatae se constringant. Quæ vero vis sola, dum quiescunt arteriæ, sanguinem, & reliquos humores impellit, de ea fieri oportet, parem esse utique elevando toti ponderi, & superandæ toti resistentiæ conjunctæ, cui sanguis suo motu resistit.

Porro in animalibus frigidi sanguinis monuimus *h*, nullam arteriarum paullo minorum vim contractilem esse: superest, ut absque eo auxilio cor circuitus sanguinei unica causa possit esse. Dudum *Caldesius* testudinis arteriam magnam immotam cordi unice obsequi, & in galeo pisce *Cl. Goyeau* aortam immotam vidit. Hoc argumentum eo valentius est, quod ea animalia cor minus nacta sint, quam calida animalia, & quadruplo minus, si cum quadrupedis vivipari corde comparaveris *l*.

Verum etiam in his animalibus vita diu superest, quibus arteriæ vim suam contractilem amiserunt. Ossea arteriarum natura fre-

h L. VI. p. 86. seqq. *Exp.* *l* *Robinson* l. c. p. 101. 120. *sur le mouv. du sang.* p. 236. *Sed vide* L. VI. p. 236. seqq. n. 4.

quens omnino senum vitium est *m*. Et tamen senes, iique homines, in quibus arteriæ a morte ossæ visæ sunt, diu cum ejusmodi rigidis, & ab omni contractione alienis, arteriis vixerunt. Exempla ejusmodi senum, in quibus a morte arteriæ ossæ apparuerunt, passim collegi, & *Vesalius* olim habet *m*^{*}, & nuper *C. Lucas* *m*^{**}, interque senii symptomata *Fischerus* ossæ arterias retulit. Neque enim hoc vitium subito opprimit: lentum est temporis opus, & succus *n*, qui induratus in ossæ arteriarum squamas abit, per varios gradus callosæ, cartilagineæ, ossæque naturæ, per longam proculdubio tenuiorum molecularum expressionem & exhalationem migrat. Oportuisset autem, in hypothesi, hominem periisse, quam primum arteria naturam non ossæ, sed callosam, & ad contractionem ineptam induit. Nunc deposito in senio, & centesimo aliquando anno, demum funestæ illæ gangrænæ superveniunt *o*. Contra ea etiam, quæ ex adversariis repetimus, ingens testis existat *Harveius* *p*, qui arterias sub sede ossæ pulsasse vidit.

Denique si viceris arterias, & potentissime, contrahi, nihil certe de cordis prærogativa de-

m *Harvei* l. c. p. 218. *Cowper* *Phil. Transf.* n. 280. 299. *Fischer de senio* p. 76. *Opusc. mea pathol. obs.* 47. 51. Adde, si placet, historias *Vieussenii* l. c. p. 107. 108. 109. *Naish Phil. Transf.* 369. tum n. 483. & *Bass Dec.* III. *obs.* 4. aliasque numerosas ossæ arteriarum observationes. *m*^{*} *Exam. obs. Fall.* p. 36. *m*^{**} *Of Waters* T. I. *n* *Opusc. Patholog.* 47. *o* *Conf. Cowper Phil. Transf.* n. 299. *p* p. 218. 219.

mes. Quo potentius arteriæ conſtrahuntur, eo major erit reſiſtentia, quam cordi univerſum arterioſum ſyſtema una unda ſanguinis impulſa dilataturō opponit. Da in cordis diaſtole ſanguinem novum motum a contractis arteriis accipere, ut non ſubſultorie, ſed perpetuo utique fluento progrediatur, primo tempuſculo a corde impulſus, altero ab arteriis. Poſſet inde progreſſivus motus ſanguinis adjuvari, cordi nihil accedet, quod contractum nunc ex hac hypotheſi & ſanguinis univerſum pondus ſuperandum habet, & nova velocitate propel- lendum, & præterea inſignem partem, dimi- diam fere virium, ſuper illam priorem reſiſten- tiam, in vincenda arteriarum reſiſtentia impen- dere debet; nempe cordis nunc dupla potentia requiritur ejus, qua egeret, ſi arteriæ omni- no vi contractili deſtituerentur.

§. XXXVIII. *Rejicitur adtractio vaſorum mi- norum.*

Aliquam humorum ad vaſorum parietes ad- tractionem *p** non penitus repudiaverim, cum ipſe viderim, globulos ſanguineos, inter la- minas meſenterii effuſos, ſatis celeriter ad ex- teriores parietes vaſorum majorum adtrahi *q*: & ad membranas etiam corporis animalis ad- hæreſcere, ut nihil quidquam per foramen me-

*p** L. VI. p. 107. Ei mul- 212.
tum tribuit Röderer Uter. p. *q* Second Memoir. p. 340.

fenterii effluere queat, quando una cum arteria mesenterium dissecatur *r*. Neque de vasis lacteis, de vasis ex cellulosa tela, ex magnis caveis, ex cute humorem sorbentibus, de vasis fetus in utero radicatis adtractionem exclufero.

Verum inter causas motus sanguinis legitimi eam adtractionem utique non recipio. Omitto, quod vascula capillaria plena non trahant *s*; & ostendam, ejusmodi vim in minimis arteriis positam, circuitui sanguinis potius obstaculo futuram, quam quidem adjumento.

Trahent utique ea vascula de truncis arteriosis sanguinem. Cum enim plus habeant materiei *t*, quam magna vasa, superabunt utique horum vim adtrahentem, sibi que sanguinem vindicabunt. Verum arteriæ in universum *v*, quam venæ, crassiores sunt, & plus habent solidæ materiei. Ergo arteriæ minimæ de venulis capillaribus sanguinem majori vi retrahent, quam quidem eæ venulæ sibi sumunt. Sed etiam venulæ minimæ perinde plus habent materiei solidæ, quam majores venæ; quare & ipsæ de truncis venosis sanguinem ad se retrahent, majori vi, quam ea est, qua hi trunci sanguinem ad se rapiunt. Ergo vis attractilis vasorum minimorum sanguinem in minimis arteriis & venulis congregabit, & re-

r Exp. 200. 211. 212. 213. T. VII. p. 330.
 214. *t* Clifton Wintringham inquiry p. 206.
s Josias Weitbrecht Comment. Acad. scient. Petropol. *v* L. II. p. 238. 239.

sistet impulsioni legitimæ, qua ex iis vasculis in truncos venosos propellitur, eritque circuitui sanguinis pro obstaculo.

Quare in plantis quidem vis vasorum attractilis locum habere poterit, non ita in animalibus. In stirpibus enim nullum arteriarum a venis discrimen est, neque vasa aut conica, aut aliam partem alia densiorem nacta sunt, neque alia causa directionem succorum determinat, præter pondus & calorem aëris. Ab quidem interdiu rarefacto aëre herbarum humores in tepentem auram evocantur; noctu vero a frigore densati, ab ipso pondere, ad terram reducuntur z*.

Cum præterea post cordis quietem, humores vitales animalium perinde in truncos arteriarum x & venarum deducantur y, manifesto adparet, arteriosum & venosum sanguinem a suctione aliqua capillarium arteriolarum & venularum minime regi.

§. XXXIX. *De eorum oscillans vis.*

Experimenta, quæ oscillationem sanguinis demonstrant, solam languentem z animalis vitam evincunt, in qua cor alterne resistentias sibi oppositas vincit, & alterne ab iis resistentiis superatur. Nulla in sano & robusto ani-

x *Exp.* 82. 205. &c.

y* *Hales veget. stat.* IV. p. 122.

y *Exp.* 126. 218. 226. 238.
230. 234. 236.

z *Ibid.* *Premier Memoire*
p. 60.

male oscillatio percipitur, certo superventura, quam primum cordis vires debilitatæ sunt, neque unquam animal vires vitales integras recuperat, nisi prius sanguis ab oscillatione convaluerit, atque unicum legitimum suum iter cepssiverit *a*. Ad sanguinis circuitum efficiendum ejusmodi vis requiritur, quæ secundam unicam & perpetuam directionem sanguinem a corde in arterias minimas, inde in venulas, ab istis in truncos venosos, & in dextram cordis auriculam, urgeat. Quæcunque vis secundum incertam & alternam directionem agit, ea perinde nocet circuitui, uti prodest.

Vim minimorum vasorum vibratilem protinus quidem oculorum testimonium refutat, quibus vasa in frigidis animalibus constanter immota adparent *b*. Neque posset, vel minima, contractio oculos fugere, uti quidem Cl. adversarius fugere docuit. In arteria enim minima non solum diametri in universum mutationes, sed longe subtiliores mutationes crassitie membranarum auctæ aut diminutæ, luminisve arteriosi aut aucti, aut diminuti, oculus armatus facile percipit. Denique fissuram arteriolæ venæve minimæ, capillarem *c*, longe angustiores, quam globuli rubri diameter est, non mutari, neque a vi contractili labiorum suorum dilatari, manifesto experimenta mea docent. Non poterat non, vel debi-

a p. 61, 62.

b *Second Memoire* p. 236.

c Exp. 180. 200. L. VI. p.

liffima, vis contractilis vasis fiffi eam rimam conspicuo modo auxiffe, eamque mutationem microscopio armatus oculus percepiffet, etiam fi ea multo globulo fanguineo minor fuiffet. Pulsus, & arteriæ dilatatæ fubfidentia, abfque microscopio in vafculo fextam partem lineæ lato adparet. Sed rima, qualem diximus, microscopio adhibito multo, quam ejufmodi vafculum, major adparet.

Porro immobilitas vaforum majorum minorumve, etiam ad acerrimos ftimulos *d*, per pericula noftra confirmata, non videtur admittere, lenem illam fanguinis impulfi irritationem arterias ad motum follicitare, cum aer, aqua, alcohol, & venenum chemicum nihil fimile præftet.

Inflammationes, quas adducit vir Cl. non videntur ejus opinioni favere. Pone alternam quidem, fed celeriozem & potentiozem, arteriolarum contractionem in eo morbo effe, non ideo in vasis minimis fanguis retineri debet; nifi velit vir Cl. caufam circuitus, fibi quidem primariam, circuitui refiftere, quando potentius operatur, totum nempe parte minus effe: aucta enim vi contractili, a qua fanguinem ait promoveri, celerius per vafcula irritata fanguinem utique tranfire oportet, non ftagnare. Si perpetuam contractionem feceris, faceret, quod facit perennis compressio, & exinaniret

d L. II. p. 138. &c. *Exp.* n. 277. 278. 283. &c.
fur les parties irreitables &c.

utique vasa minima, pallidaque pro rubris redderet.

Demum peristalticam contractionem arteriarum equidem probabilem oportere demonstrasse. Intestina cylindrica sunt, terminantur in latius receptaculum, initium habent a ventriculo magis irritabili. Ita intelligitur, aerem, aut cibariam massam, debere necessario ultimo in amplius, & minus irritabile receptaculum congregari. Eo tamen ea massa post varios motus prorsum retrorsumve volutata, fero advenit. Si comparationem ad arterias transtuleris, adparebit in minora magis & minora vascula sanguinem urgeri, apprime per sententiam Cl. viri, irritabilia. Quare pone exemplum duorum ramorum, longe cylindricorum, angustorum, qui ex uno trunculo nascantur. Fac in iis vasculis esse vim contractilem, motumque oscillantem, prævalebit idem ob crassitiem *e*, & densitatem *f*, & majorem superficiem *g* irritatam trunculi, ex quo hi rami nascuntur, illi motui, quem vas majus, contractum, cavam superficiem minorem habens, minusque densum, ei inpressit. Ergo repelletur sanguis ab ea contractione arteriarum minimarum, quam sumsit vir Cl. & retrocedet, donec a nova unda sanguinis ex corde submissa superetur. Erit adeo ea vis, quam pro causa auxiliari circuitus sanguinei posuit vir Cl. omnino

e L. II. p. 147.

f L. II. p. 144.

g L. II. p. 158. &c.

omnino causa, quæ eum circuitum remoratur. Quo magis irritabilia feceris vascula minima, eo majus erit obstaculum, quod circuitui opponunt.

Quare mihi quidem potius videtur, minima vascula, calidorum etiam animalium, vi contractili aut destitui, aut debilissima pollere, uti nullo hactenus experimento aut pulsus in iis ostensus est, aut vis irritabilis: & ob eam ipsam rationem pulsus in vasculis minimis nullum percipi. Eadem enim eorum vasculorum ratio est, quæ vasorum, certo non contractilium, animalium frigidorum, in quibus pulsus nullus adparet. Totam illam oscillantem vasorum vim *Math. Gabler* mecum reject g*, & vir Cl. *J. C. Schreber* g**.

§. XL. *Et caloris aut aëris vis.*

Qui a calore motum sanguinis derivant, eos oportet ostendere, unde calor in animale nascatur: & videntur certe vitiose quæstionem invertere. Animal syncopticum perfecte friget; redditur ei undecunque motus, irritatione facta, quæ cor pulsare cogat, reddetur utique calor, sed postquam motus redditus est. Non ideo movetur animal, quia is sanguis calet, sed incalescit, quia sanguis ad motum rediit.

g* De tub. capill. diversis vasis velocitate Tu-
g** Atque *J. Leonh. Mack* bing. 1771. 4.
de comparata sanguinis in

Id argumentum, uti alioquin certum, ita evidentissimum est in summo frigore, quo aër ad glaciale temperiem riget. Tantum tunc frigus est, ut Jeniseæ infra punctum nascentis glaciei 120 Fahrenheitianis gradibus *b* argentum vivum deprimatur. & tamen in eo frigore, aut majori *i*, vigent balænæ, & phocæ, & homines demum, quos vitæ munia cogunt liberum per aërem venari, & itinera sua urgere. Nullus ergo hic ab aëre in sanguinem calor venit: extrahitur contra, qui inest sanguini calor, inque aërem transit, id enim vocamus refrigerari. Et tamen in eo aëre vivit homo, & calet, quamdiu movetur, omnem amissurus cum vita calorem, quam primum quieverit. Suum adeo ab aëre calorem sanguis non habet.

In Cl. *Bertier* hypothesei omnino debuit ostendi causa, quare aër in sanguinem receptus incalescat. Non debet de homine solo quæri, cui calor jam innatus insidet, sed de piscibus, quadrupedibus, insectis, vastissima nempe classe animantium. His omnibus sanguis est ejus temperiei, aut ejus proximæ, quæ in aëre obtinet *k*. Gratis ergo fumitur, eum aërem in sanguinem receptum dilatari. Eo fundamento subruto omnia cadunt. Sed experimento præterea factò a Cl. viro *Samuele Au-*

b Vide *Gmelini* olim nostri præf. ad flor. sibiric T. I. p. LXXIII.

i Id enim frigus fuit sub 58. gradu. Sed ad octogesi-

mum usque & balænæ reperiuntur, & gentes Grœnlandiæ occidentalis piscatum veniunt.

k L. V. p. 50.

vivillio l, sanguis in tubo vitreo a frigore aut nullo, aut adeo certe exiguo gradu, promovetur, cujus ad movendam sanguinis massam nulla portio sit: verum si frigore non regitur, neque a calore valde expanditur. Nimum in experimento suo calorem adhibuit Cl. *Bertier*.

Adde iterum, hic valere, quæ diximus de arteriarum contractione, & valere etiam magis. Calor cæca causa est, quæ liquores utrinque dilatat, & sanguini vivi animalis admotus calor, huc & illuc, in contraria, eum sanguinem cogit fugere *m*. Ejusmodi vero causa tantumdem noceret circulationi humorum, quantum adjuvaret. Promoveret ad minima sanguinem is calor, qui inter causam caloris est & ea minima vasa: sed perinde resisteret sanguini a corde advenienti. Hinc suppone calorem systemati vasorum vitreo, & videbis, rarefactionem, & ebullitionem, motumque intestinum quidem inde nasci, nunquam vero fluidi progressionem, qualis in sanguine est.

Denique quam parum calor in promovendis humoribus animalis possit, manifestum est ex pullo, qui ovo continetur. Cor si destruxeris, si id alioquin quieverit, in eodem calore incubantis gallinæ nulla pars animalis crescit, nullus sanguinis per sua vasa motus est. Et contra pergit cordis

l In disp. inaug. de inæ- stræ.
quali ampliat. vasor. pulm. re- m Exp. sur le mouvement
cusa in T. VII. collect. no- du sang. 6, 7.

motus & sanguinis, ut certo vidi, multis horis in ipsa circumfusa frigida.

§. XLI. *Ad Cl. Wilsoni objectiones.*

Non ideo nulla foret cordis vis, etsi aliqua auxilia ei accederent. De motu musculari ostendetur, accelerari inde utique sanguinem. De cibo sumto, utcunque id fiat, ipsum phænomenon certum est, & ab eo incalescimus. In venas portarum non nulla erit cordis potestas, cum ejus musculi vis in venas usque penetret *m**. Verum in universum vir. Cl. motum intestinum cum progressivo confundit, iste enim ab intestino motu minime juvatur, neque aqua stagnans ab evaporatione influentum concitatur, neque fermentatio magis versus partes externas, quam contra cor sanguinem ungeret. Musculos interque eos, sphincteres, ab irritatione laxari omni experimento adversatur. Vacuum spatium a corde parari, quo se sanguis venosus recipiat, hætenus potest admitti, ut credas, si cor plenum maneret, nullum ei sanguini de vena exitum fore, qui nunc sit aliquis, quod auricula se in ventriculum depleat.

§. XLII. *Vis cordis est primaria causa motus sanguinis.*

Ergo in animalibus frigidis a solo corde, in calidis ab eodem musculo, cum aliquo non satis certo ab arteriis majoribus subsidentibus alterno adju-

mento, promovetur sanguis, magna certe massa, & multarum librarum, ut suo loco *n* ostendatur. Negavit utique totam moveri, *Keilius Borellianorum* miraculorum destructor o: negavit, vim cordis motui sanguinis suscitando parem esse, si quando subpressus fuerit: negavit, undam sanguinis antecedentem subsequenti resistere: atque adeo a cordis potentia unicum biuncem sanguinis impelli posuit, quod pondus est unius undæ, uno cordis pulsu de ventriculo sinistro egestæ *p*.

Facile se tueretur *Borellus*. Diximus in animale, cujus sanguis quiescit, totam massam a solo corde contracto manifesto propelli *q*: vidimus etiam, neque semel, antecedentem undam a subsequente percuti & promovere *r*.

Nobiscum sentit, quem honoris causa citamus *Lazarus Spalanzanus*.

§. XLIII. *Mensura virium cordis magna est.*

Si magnum pondus est, quod a corde movetur, magna etiam celeritas est, qua motum circumit. Declarant vulnera, per quæ intra exiguum tempus plurimæ libræ sanguinis, per vulnus etiamvis angustum, expelluntur *s*. Ostendit vehementissimus vortex *t*, quo in ani-

n L. V. p. 8.

o De vi cordis Tentamen

III, p. 58. edit. Lat.

p Conf. *Morisson Lettres*

sur le choix des saignées p. 26.

q p. 342.

r Second Memoir, sur le

mouv. du sang. Exp. 93. 180.

s Plurima experimenta di-

ximus L. V. p. 6. 17.

t Exp. 153, 170, 172. 180.

male etiam frigido, sanguis arteriosus de vulnere arteriæ se præcipitat, & quem oculus sequi non potest. Ipse etiam sanguini per integram ejusmodi animalculi v arteriam motus manifesto velocissimus est. Sed etiam in homine, si manum dextram cordis sedi opposueris, manum sinistram arteriæ temporali, labiali, radiali, popliteæ adplicueris, manifesto percipies, eodem omnino tempore & cordis recurvatum apicem costas ferire, & sanguinem in omnibus arteriis, quas nominavi, pulsum efficere. Experimentum sæpe feci, & in me, & in vivis animalibus; fecit *Harveius* x, fecerunt primi circuitus sanguinis statores y, fecerunt nuperi Cl. viri z, *Jos. Duverney*, *Th. Schwenke* *Jadelot*, *Arthaud* & Cl. *Lamure*: fecit in equo Cl. *Bourgelat* a. Cl. etiam *Spalanzanus* in vivo animale nunquam potuit in sanguinis motu successionem aliquam percipere. Unicus contrarius testis est Cl. olim vir *Josias Weitbrecht* b, qui alio tempusculo in carotide, alio vero in carpi arteria pulsum percepit, quem virum in singularem certe, & a recepta naturæ lege aberrantem, eventum incidisse necesse est.

Nunc autem intra minutum primum faci-

v Ibid. Exp. 67. 71. 88. re locutus, *Thomas Schwenke*
183. &c. l. c. p. 82.

x Exercit. I. c. 3.

a *Hippiatrique* T. II. p.

y *J. Walæus* Epist. cit. p. 346.
406. ed. I.

b *Comment. Acad. scient.*

z *Josephus Duverney* de *Petrop.* T. VII. p. 317. 318.
Pouie p. 207. de pulsu in au-

le fatis multas voces pronuncio, quæ mille literas contineant: & facile anima tempusculum distinguit, quo prima litera pronunciatur, ab altero, quo secundam exprimo: millesimam ergo partem minuti primi distinguit anima. Sed arteria poplitis, tribus minimum pedibus ab aortæ de corde prodeuntis ostio distat, anima vero tempusculum non distinguit, quo cor pulsatur, & quo arteria poplitis, in exemplo. Oportet adeo breviori tempore vim cordis c sanguinem per tres pedes promovere, quam quidem tempusculum est, millesies minuto primo minus: & per conversam, vim cordis necesse est, ad sanguinem ter millibus pedibus remotum pervenire breviori tempore, quam minutum primum est, si nihil interim ei velocitate decederet, qua per truncos arteriarum majores movetur.

In animalibus frigidis, longum illud cor erucæ, monoculi, nereidis, utique peristaltice conspicua movetur: ut sanguis in primum nodulum veniat, tunc iste contrahatur, ita secundus nodulus repleatur, paulo post secundus arctetur, sic ex ordine ad ultimum. Conspicua autem successionem reddit longitudo arteriæ, & motus minus velox humoris vitalis.

c Vim cordis aio ad popliteabile sit, undam sanguinem pervenire: non ideo ad am a corde ad poplitem profirmo sanguinis definitos globos a corde ad poplitem ventriculo protrusa, uno ictu usque fluere; cum valde promovetur.

S. XLIV. *Mensura Borelli.*

Hæc obiter rem consideranti se facillima offerunt; alii clari viri minutius rem considerant. Et primus quidem Iatromathematicorum *Johannes Alphonsus Borellus* vires cordis ad numeros revocare admissus est. Eas ponderi 180,000 librarum æquales fecit: solebat autem eo suum studium convertere, ut miraculo proximos numeros inveniret.

Verum, ut brevis sim, ejusmodi fundamentum suorum calculorum posuit, quod manifesto falsum esse agnoscas. Musculorum nempe vires comparatas in eadem ratione esse sibi sumsit, in qua eorum pondera sunt. Verum possunt certe in diversis musculis fibrarum diversissimæ portiones esse, ut alius alio plus veræ carnis, minus vero tendinum, adipis, vasorum habeat, quæ quidem muscoli accessiones ad vim contractilem nihil faciunt, & pondus interim augment. Hactenus tamen recte poscit vir Clarissimas sibi vires dari, quas alius quicunque musculus exerceat, cum cordis natura irritabilis plerorumque, aut omnium musculorum vim irritabilem superet. Posse vero diversos musculos diversam irritabilis naturæ quasi dosin possidere, manifesto adparet, cum alii a lumine, ab aëre alii, ab aqua nonnulli, alii a fortioribus demum stimulis in motum ducantur. Cæterum *Borellus* d resistentiæ, quæ

cordis functioni obstat, rationem habuit, eamque resistantiam sexagesies multiplicatam pro mensura virium cordis sumsit. *Zendrinus* vim cordis facit ad resistantias ut $58\frac{2}{4}$ ad 1. Vide ut in Cl. virum *Jurinus e*, & alii *f*, & *Carolus Malouin g* animadverterint, & quæ pro excusandis ejus calculis adtulerit Cel. *Franciscus Boissier h*,

§. XLV. *Keilii.*

Penitus contrarium *Keilii* studium fuit. Uti enim *Borellus* infinitam fere cordis vim fecit, ita ad uncias eam Cl. iste Britannus deprimere studuit. *Newtonianum* theorema pro fundamento suorum calculorum posuit, ex quo ostenditur, vim quamcunque moventem æquari ponderi cylindri ejusdem fluidi, cujus basis sit æqualis orificio fluidum emittenti, & altitudo sit dupla ejus altitudinis, à qua cadens idem liquor eam acquirit velocitatem, qua ex orificio effluit *i*. Ergo ut hæc elementa definiret, quæsiuit velocitatem, cum qua sanguis ex corde prodit *k*. Sanguinem quidem, qui unico pulsu ex sinistro ventricu-

e *Physico-mathemat. diss.* p. 67.

f *Leyserus prim. lin. nov. system. med.* n. 7. *J. God. de Hahn de aëris inspirati effectū* p. 84.

g *Traité des corps solides où l'on examine le mouvement du cœur.* Inter resistantias

numerari objicit, quas omnino inter Cl. vires numerasse oportuerit p. 57.

h *Introduct.* p. XIX. Vires per numerum rugarum cordis multiplicare jubet.

i *De vi cordis sanguinem per corpus pellente* p. 51.

k *De velocitate sanguinis.*

lo pellitur, æstimavit ad unciam, quæ spatium replet æquale I. 659. pollicis. Porro numeravit in minuto primo pulsus octoginta, invenit adeo, in eo tempore de corde expelli sanguinis digitos 132. 72. Inde aortæ ostium dimensus, reperit esse O. 4187. pollicis. Cylindrum adeo, cujus basis ostio aortæ æqualis sit, & quam repleant sanguinis pollices 132 72. longam facit digitos 316. sive pedes 26. quæ eadem est longitudo itineris, quod sanguis intra minutum primum percurrit. Ut velocitatem denique determinet Idem Vir Cl., facit diastolen, & tempusculum quietis huic interjectum & systolæ cordis, æqualem duplo tempori systoles, sive contractionis cordis, sive uni $\frac{1}{140}$ mæ minuti primi l. Ita, cum intra tertiam partem minuti primi, cor contractum sanguinem per pedes 26 projiciat, ibidem percurrent 78 pedes in minuto primo, si sanguinem ponas cum ea semper velocitate procurrere, quam a corde primo tempusculo accepit. Cum demum non una, sed duæ, uncia sanguinis *m* ex corde projiciantur, & cylindrum adeo repleant duplo ea longiorem, quæ sumta est, percurrent adeo sanguis, ex sinistro corde propulsus, intra minutum primum pedes 156. Memor tamen Vir Clar. non absque resistantia sanguinem per systema vasorum corporis animati moveri, & venosi sanguinis velocitatem ad celeritatem sanguinis arteriosi, esse uti 3 ad $7\frac{1}{2}$, denuo consti-

l Ibid. p. 42.

m p. 54.

tuit 390 pedes, quos unda a cordis sinistro ventriculo impulsæ in minuto primo percurreret, si nihil omnino ejus fluento resisteret.

Hanc celeritatem retulit in theorema *Newtonianum* *n*, & quæsit altitudinem, a qua oportet sanguinem cadere, ut ea celeritate de corde profluat, quam invenerat. Eam altitudinem reperit 17 digitorum & 76 centesimarum. Nam corpus grave cadendo a 15 pedibus acquirit velocitatem, qua intra minutum secundum triginta pedes & ultra percurrit, quintuplo majorem ea velocitate, quæ sanguini in aortam expulso adsignata est. Facile nunc est cylindri pondus metiri, quæ pondus exprimit, quod a corde sinistro superatur. Ejus enim basis est aortæ lumen, altitudo per modo dictos 17, 76. Solidum adeo fiet 7". 436112, cujus pondus est quinque unciarum 0, quæ vim cordis sinistri metiuntur.

Alio etiam modo eosdem calculos posuit, aliquanto faciliori. Sanguis nempe de iliaca arteria vivi animalis saliens percurrit parabolam, quæ horizontem fecat ad distantiam trium pedum a perpendiculari linea *p* ex cor-

n In omni nempe corpore quam idem corpus cadens in sursum projecto tempus adscensus est æquale illi, quo corpus cadens acquirit velocitatem æqualem ei, qua corpus, de quo quæritur, in principio sui adscensus sursum motum est. Et altitudo, ad quam idem corpus adscendit, est æqualis illi, per quam idem corpus cadens in fine sui lapsus acquirit eam velocitatem, cum qua primum adscendit *Helsham lectures* p. 29.
 o Ibid. p. 55.
 p p. 56. Aliter III. Vir D. *Bernoullius* determinavit. Sit linea verticalis A. B. sit horizontalis B. D. sit corpus

de ducta. Inde conficit Idem Vir Cl. sanguinem, ab altitudine II digitorum cum dimidio cadentem, adquirere eam velocitatem, cum qua ex corde propellitur. Eadem altitudo bis sumpta dat longitudinem cylindri, cujus basis est aortæ ostium, & cujus pondus est vis cordis, non major certe, quam quatuor tertiarum partium unciae in cane, ut & in homine ad octo uncias, ex æqua comparatione cum minori animali, æstimari possit.

Expofui *Keilii* rationes. Et in posterioribus quidem calculis Vir Cl. saltum sanguinis omnino non recte metitur. Nam ex iliaca quidem arteria minori celeritate sanguis propellitur, quam ex corde: & experimenta mea aliorumque virorum longe majores saltus, atque adeo majorem etiam vim sanguinis exhibent. *Georgius Martine* saltum ex cane, ad hominem traductum, decem æstimavit pedum *q*. Ego vero exiguum ramum, quem arteria mammaria ad musculos intercostales in cane parvæ staturæ mittit, vidi exsiluisse alias ad tres pedes, uncias quatuor *r*, alias ad sex pedum, & sex pollicum *s* distantiam. Multis adeo vicibus saltum in homine majorem sumi debere adparet,

projectum ex A. in D. Dico
altitudinem debitam velocita-
ti, qua corpus ex A. pro-
jectum est, esse, fere $\frac{B C^2}{4 A B}$

hydrodynamic. p. 53.

q De animalih. similib. p. 35.

r Second Memoir. sur le

mouvement du sang. Exp. 43.

s Ibid. Exp. 42.

quam fecit *Keilius* ^t, qui in majori arteria minorem fecit ^v.

Ad priores calculo multa etiam recte monentur. *Jurinus* primum corollarium *Newtonianum* recte adhibitum esse negat, neque probat, quod velocitas toto tempore systoles æquælis ponatur. Sed etiam ipsum *Newtoni* corollarium *Petrus Antonius Michellottus* ^x rejecit, neque duplicem altitudinem, sed simplicem omnino, cum *Bernoullio* ^s *Gravezandio*, *Muschenbroeckio*, aliisque claris viris ^y sumi vult, quæ quidem difficilis quæstio hic definiri nequit. Porro alius vir Ill. monuit, ignorari copiam sanguinis ^z, quam cor sinistrum projicit, atque adeo velocitatem accurate definiri non posse: neque demum de sanguine, viscido & pene solido humore, ea omnia recte dici, quæ de aqua dicta vera sunt, neque dubium illud *Newtoni* theorema recte pro calculorum fundamento poni. Ill. demum vir *Franciscus Boissier* notat ^a, *Keilium* non invenire nisi eum cordis effectum, qui super omnes resistentias exercetur, atque adeo minimam partem effectus totius definire, quem cor exferit, cum procul dubio maxima pars velocitatis sanguini im-

^t Etiam minus recte vidit *G. Cheselden*, qui ex aorta canis ne quidem ad pedem profiliisse auctor est l. c. p. 197.

^v *Diff. physico-mathem.* p. 69.

^x *De separat. fluidor* p. III.

^y *Muschenbroeck essays* p. 384. Defendit vero id corollarium *Jacobus Jurin Phil. Transf.* n. 452. & *Richardus Helsham* in append ad prælectiones suas.

^z *Senac* l. c. p. 465.

^a *Introduct.* p. XIX.

pressæ in resistentia superanda consumatur. Enorme v. c. discrimen fit, si contra *Keilium* undæ cordis ponas resistere antecedentem sanguinis columnam, eamque quiescentem, aut lentius motam posueris. Sed etiam suarum retardationum, adeo abnormium, debuerat *Keilius* meminisse, qui celeritatem ad partem primæ velocitatis $\frac{1}{5233}$, in arteria capillari diminutam, in vena iterum ad partes primæ velocitatis $\frac{2}{5}$ restituit. A corde enim hujus certe celeritatis maximam partem pendere, vel facile illud experimentum ostendit, ex quo constat, duplo & ultra altius sanguinem de arteria salire, dum cor contrahitur. Non immoror calculis, sed resistentia prior est centum librarum & ultra, ipso teste *Keilio*, quæ a duabus uncis novæ undæ sanguinis inpelluntur, ea celeritate, ut cum ea ad partem sui $\frac{1}{5233}$ diminuta fuerit, iterum ad $\frac{2}{5}$ redeat *b*.

Aortæ diametrum a *Keilio* nimis parvum fumi Cl. de *Sauvages* objicit. Sed alia facillima experimenta supersunt. Non recte certe *Guilielmus Cheselden c* parvam vim cordis esse ex eo deducit, quod exigua vi totum animal injecto liquore repleri queat. Rectius *Stephanus Hales d* lapsum undecim pedum, *Keiliano* septuplo majorem, requiri expertus est, ut aqua arteriæ injecta totum corpus animale repleat, &

b Retardationes omissæ jam *Michelottus* monuit l. c. p. 115.

c l. c.

d *Philos. exper.* p. 84. 91.

per venas ex arteriis redeat. Ego vero tot in experimentis, & vidi, & expertus sum, siphonem non sola vi manus, ducentas libras facile propulsuræ, sed innixi præterea corporis, maximum saxum provoluturi, impendi, ut embolus per politissimam faciem siphonis progredia-
tur: & tamen liquorem, sanguine potius fluidiorem, qualis ichthyocolla est in aqua soluta, lentissime, multo quam sanguis lentius, & omnino valde imperfecte, corpus exigui pueri replere. Cor enim & rubra vasa omnia, & ductus excretorios, humor ex corde expulsus celerime replet: siphonem unice in arterias rubras venasque & cellulosa[m] telam, liquorem pellit, in decolora vasa paucissima, in minima, quibus viscera constant, omnino vix ulla suum pigmentum urget. Adparet, rudi experimento, vim, quæ aliquoties centenas libras inpellit, minimam partem movere ejus ponderis, quod a corde adeo facile, & perenniter, & celerissime circumagitur.

§. XLVI. *Jurini.*

Jacobus Jurin, nuper collegii medici Londinensis Præses, alia methodo *e* vim cordis definire conatus est: quam proponemus, etsi ipsi auctori non satis certa visa est *f*.

e In *Philos. Transact.* n. 358. 359. *dissert. physico-mathemat.*

f In defensione hujus dissertationis contra Ill. *Senacum*. edita Lond. 1750. p. 20.

Nempe totum motum, a machina carnea cordis productum, æquat summæ factorum, natorum ex omnibus sectionibus transversis omnium filamentorum sanguineorum, ductis in suas velocitates & longitudines. Summa harum sectionem, sive superficies interna cordis tota, Cl. viro est decem pollicum quadratorum. Longitudinem filamentorum facit duorum digitorum, quæ non plena quidem cordis est longitudo. Quantitatem sanguinis a corde sinistro ejecti æquat duabus uncis: aream ostii aortæ ex *Keilio* sumit \equiv 0. 4185. tempus quo sanguis ex corde exprimitur \equiv minuto secundo, massam cordis sinistri unciarum octo. Ex his elementis conficit, vim sinistri ventriculi æqualem esse novem libris & uncia uni, vim dextri ventriculi librarum sex & unciarum trium, vim cordis totius librarum 15. unciarum 4: totamque vim, quam cor in sanguinem exferit, æqualem tribus libris in minuto secundo pollicem percurrentibus g. Addit, hanc esse mensuram non summæ quidem potentia cordis, sed mediocris, & quam diu absque fatigue nobilissimus musculus exercent.

Velocitatem quidem recte credo a Cl. viro variabilem poni, quam in principio contractionis ventriculi sinistri 14 pedum cum $\frac{1}{4}$, in fine 4. pedum cum $\frac{1}{4}$ facit. Contra superficiem internam cordis nimis parcam sumfisse videtur,

detur, filamentorum sanguinis longitudinem perinde nimis exiguum. Plura non moneo, cum certum sit, centum sanguinis & aliorum humorum sanguini continuorum libras, ex plena quiete, a solis cordis ictibus, in perfectum iterum motum incitari, neque adeo 15. libras sanguinis vim cordis digne exprimere.

§. XLVII. *Morlandi, Tabori.*

Josephus Morland *h* calculos quidem nullos posuit, varia tamen eo facientia protulit. Ad resistantiam cordi oppositam longitudinem arteriæ nihil facere, neque vim cordis adeo magnam videri putat. Si enim vel centum librarum momentum sanguini aortæ inpressum facias, tamen sequi credit, ut celeritas sanguinis sit 9600 pedum in minuto primo, id autem incredibile videri. Verum is quidem vir Cl. manifesto in eo erravit, quod vim cordis unice per resistantiam arteriarum metiatur, cui cordis robur æquale ponit. Nam evidenter, supra eam resistantiam, sanguini aortæ magna celeritas imprimitur *i*, & vim cordis utique in duas partes oportet dividere, quarum prior in aortæ dilatationem impenditur, altera in sanguinis protrusionem *k*.

Johannes Tabor cordis vim æstimat per eam potentiam, quæ requiritur ad rumpeudas

h Of the force of the heart.

k Idem in diff. cit. p. 71.

i Monuit *Jacobus Jurlu* in 7^a.
Philos. Transf. n. 358.

valvulas femilunares, ostio aortæ præpositas. Per experimentum vero invenit, eam vim æquiparari 63 libris *l*. Huic theoremati analogiam superstruit, facitque, vim valvulas constringentem ad resistantiam esse, ut area baseos ventriculi ad aream aortæ, nempe uti 4. ad 1. atque ita reperit, vim sinistri cordis ventriculi esse omnino librarum centum & quinquaginta. Iterum facile adparet, vim, quam sanguis aortæ in valvulas exercere ponitur, esse ad summum dimidiam *m* partem momenti, quo is sanguis movetur, atque adeo totos hunc calculos a vero alienos esse.

§. XLVIII. *Stephani Hales.*

Succedit in partem laboris *Stephanus Hales*, vir in experimentis solertissimus. Ergo pondus quærit, quod contra cor nititur, quoties is musculus sanguinem projicit, id enim pondus est ipsa vis cordis. Quare in altitudines sanguinis, ex incisa arteria carotide variorum animalium salientis, per experimenta inquisivit. Eam altitudinem reperit, in cane quidem, pedum sex, pollicum octo *n*: in ariete pedum totidem, pollicum quinque cum semisse *o*: in equo pedum novem, pollicum octo *p*. In homine, medio quodam numero sumto, eandem

l Exercit. Medic. cap. 5.
n. 7.

m Conf. Micellottum de separat. fluidor. p. 95.

n Hæmæstatics exp. 8. p. 38.

o Exp. 5. p. 27.
p p. 16.

altitudinem æstimat ad septem pedes cum semisse *q*. Porro, cum P. *Antonius Michelottus* & monuisset, habendam esse rationem areæ ventriculi sinistri cordis, metitus eam superficiem, reperit quindecim esse pollicum quadratorum. Ea superficies, ducta in altitudinem saltus, siue 7'. 6". mensura est columnæ sanguineæ, quæ, ex notissimo theoremate hydrostatico, in ventriculum cordis sinistri premit, & quam is ventriculus contractus elevat. Pondus autem istius columnæ est librarum 51, unciarum quinque.

Velocitatem fere eandem constituit, quam *Keilius*, pedum 149 in minuto primo, cum systolem cordis peragi ponat in tertia parte totius pulsus.

In his non improbabiler positis calculis varia varii monuerunt, inprimis *Franciscus de Sauvages*. Et primo quidem *Stephanus* perinde solum effectum cordis metitur *s*, qui supra omnes resistantias exercetur. Deinde negat *t* vir Cl. recte tempus impensum systoles haberi pro dimidio ejus temporis, quo diastole peragitur, & persuadetur, utraque tempora æqualia esse: ex ea vero correctione tota illa celeritas sanguinis ad dimidiam reducitur, nempe ad pedes 74, uncias 6. Contra Idem Vir Cel. ex alio saltu in cane observato, cum sola vis lapsus ex

q p. 40.*r* l. c. p. 115.*s* *Sauvages* introduct, p, tices.

XIX.

t p. 32. versionis hæmasta-

14 pedibus det velocitatem, qua liquor 28 pedes intra minutum primum motu uniformi percurrere potest, ponendo velocitates in ratione radicum altitudinum, invenit sanguinis velocitatem aliquanto majorem, & 22'. 4". intra minutum secundum, atque adeo 136'. in minuto primo, qui calculi a *Keilianis* non valde dissentiunt v.

Ego vero fateor, tempusculum systolæ impensum vix recte definiri posse: crediderim tamen duplex illud, & ante quietem & post eam, etsi breve tempusculum, ipsamque diastolen, tempus; quam systole, majus requirere. Deinde saltus nondum satis certus est. *Georgius* quidem *Martine* x non valde ab *Halesianis* diversos saltus obtinet. Si vero primum saltum sumferis, qui utique sequentium y altitudinem insigniter superat, majores habebis saltus, quam vulgo creditur. Ex arteria enim mesenterii, una de multis, quam cum aorta non recte comparaveris, tamen saltus sanguinis in aërem sex pedes altus fuit, in ove z, miti animale, quod robore pariter & statura homini cedit. Et Ill. *Senac* saltum ex canis aorta, quam equidem ligaverat, duodecim pedum reperit a.

v Ibid. p. 2.

x De animalib. similib. p. 41.

y In cane cono cordis resecto primum multum sanguinis profluxit, inde quavis systole tantum drachma una vel altera *Drelincourt* Cani-

cid. z. Saltus ex anguillæ resectæ aorta primus fuit duorum pollicum, sequentes multo humiliores *Second Mem. sur les part. irrit. exp. 526.* z *Second Memoir. sur le mouv. du sang. exp. 46.* a l. c. p. 484.

Denique omnino vera est observatio Cel. Boissier, quam primo loco recensuimus.

§. XLIX. *Morganæ, Robinson.*

Thomæ Morgan calculi ab *Halesiano* non valde dissentiunt, si tempus idem feceris, in quo cordis contractio absolvitur. Facit enim celeritatem sanguinis ejusmodi, ut intra minutum primum quinquaginta & quinque pedes percurreret, si ea celeritate uniformi moveretur, quo per aortæ principium fluit. Pulsus autem in minuto primo numerat octoginta, sed totam hanc octogesimam minuti primi partem pro tempore habet, in quo cordis systole peragitur. Quare si pro systole tertiam partem hujus octogesimæ sumseris, celeritas sanguinis erit 165 pedum in minuto primo, parum ab *Halesiano* diversa. Cæterum undam sanguinis in aortam projecti *Morganus* duabus unciiis æstimat, ostium autem aortæ septem linearum quadratarum, & 160 demum uncias sanguinis, quem intra minutum primum cor expellit, atque 264 pollices sanguinis, qui aortam replet *b*.

Clarissimus olim vir *Bryan Robinson* systoles cordis tempus, ut *Keilius*, æquale fecit dimidiæ parte temporis, quod pro diastole requiritur: tres veros uncias in aortam uno pulsu projici ponit; hujus arteriæ diametrum æstimat ad unciam cum $\frac{1}{100}$, pulsus autem non supra

b Philosophic. princip. of medic. p. 122.

54 numerat: ex his elementis eam facit celeritatem sanguinis, ut 15. pollices & $\frac{48}{100}$ pollicis intra secundum minutum perfluat. Numerus pulsuum utique nimis parvus est, hinc tempus, quo systole perficitur, potius nimis longum: nimia etiam unda sanguinis, quam cor sinistrum projicit *c.*

§. L. *Francisci Boissier.*

Ipse Cl. *Franciscus Boissier* alios calculos proposuit *d*, quos auctoritate probantis suum laborem *Danielis Bernoulli*, summi mathematici, hactenus confirmat. Ergo inter elementa recipit saltum sanguinis a *Stephano Hales* per experimenta demonstratum: deinde celeritatem, quæ hunc saltum producit, æqualem facit celeritati, qua 20 pedes, in linea horizonti parallela, intra minutum secundum percurruntur. Vim vero cordis æqualem reperit unciis decem cum dimidia, intra minutum secundum per unum pedem elevatis: cumque denique in omni machina plus motus requiratur, quam quidem producitur effectus, in ratione 27 ad 4, auget in ea ratione vim cordis, & æqualem reperit 71 unciis intra idem minutum secundum ad pedis altitudinem elevatis. Utique vero saltus *Halesianus* non est 3 pedum, sed 7 cum di-

c Og food and discharges *d* l. c. p. 301.
p. 5. 6. 7.

midio, & ne iste quidem saltus naturæ vigori respondet; inde vero celeritas major sequitur *d**.

§. LI. *Danielis Bernoulli.*

Ipse vir Cl. *Daniel Bernoulli* in discipuli sui *Danielis Passavant* disputatione inaugurali *e Halefii* experimentis ita utitur, ut effectus cordis sit projectio fescuncis (aut duarum potius unciarum) ad pedes octo; cum vero is effectus 4000ies intra horam repetatur (fumendi autem fuerant pulsus 4500 vel 4800) vis cordis erit 6000 unciarum, aut librarum trecentarum septuaginta quinque, per horam ad octo pedes elevatarum. Recte vero docet Vir Clar. vim cordis se habere ad celeritatem mediam sanguinis per aortam fluentis, uti tempus totius pulsus ($\frac{1}{36}$ minuti primi) ad tempus, quo cor contrahitur. Celeritatem vero facit ejusmodi, ut sanguis 22' in minuto secundo percurreret, si motu fluere uniformi *f*. Ex calculis vero suis credit ostendi, dari utique alios musculos, quorum robur potius cordis potentiam superet. Ita aquilam, quæ tota triginta librarum sit, intra horam 648. 000. libras elevare, & in homine musculos, qui in gradiendo laborant, totum corpus 160 libris æquale intra horam ad 4000 pedes adtollere monet, quæ vis potentiæ cordis sit ducentupla.

*d** *Mem. de l'Acad. de Berlin* 1755. 11. A. N. C. obs. I.

e *De vi cordis* Basileæ 1748.
f *Ibid.* p. 8.

Verum ista quidem manifesto nimia sunt. Egregium certe curforem esse crediderim, qui montem quater mille pedes altum, non in hora, sed intra unum diem conscenderit, cum ipse altitudinem 5000 pedum intra unum diem non absque labore superari, multis itineribus expertus sim. Deinde eorum musculorum, qui corpus humanum promóvent, nullus omnino vel quatuor horis integris perpetuo officio suo fungi potest, absque summa debilitate, & dolore fere intolerabili. Id incommodum fatis memini, me nimis certum percepisse: cum ne ad mille quidem pedes per scalas ex cuniculis Claufthaliensibus, & montis Rammelii visceribus adscendissem. Saltus etiam biuncis sanguinis, qui de ventriculo sinistro pulsus ad perpendiculum ad octo pedes exsilit, omnino calculos superat, quos Vir Clarissimus posuit.

§. LII. *Senaci monita.*

Nuperior demum & Ill. de corde auctor *Petrus Senac* potius quæ diruat reperit, ipse ad ædificia elevanda minime facilis. In *Jurini* & *Stephani Hales* g calculis reprehendit, quod probasi cylindri non aortæ aream, sed cordis superficiem adhibuerint, atque eo modo pondus sanguinis auxerint, qui a corde sustentatur. Negat cor esse solidum *h*, sanguinem percutiens, quale facit *Jurinus*, negat ejus massam per pon-

dus recte exprimi, negat recte duas uncias sumi pro undæ sanguinis pondere, quam ventriculus sinister expellit, negat eum ventriculum totum inaniri. Apud *Halesium* reprehendit, quod saltum sanguinis non in aorta, sed in carotide canis dimetitus sit, adque adeo nimis exiguum fecerit *i*; concludit denique, vim cordis incertam, sed ingentem esse, ut ex saltu ipso pateat, & ex arteriis aneurysmaticis, quarum crassissimæ membranæ a cordis potentia rumpuntur, & ex pondere 50 librarum pedi appenso, quod in singulo pulsu adscendit. Ex hoc ipso experimento, cum pondus ad tantam ab hypomochlio distantiam adpendatur, & elevetur a corde hypomochlio propiori, vim cordis sanguinem per arteriam cruralem pellentis, æstimat ad quadringentas libras *k*. Harum cæterum rationum ego quidem multas, ex pari persuasione, jam inter nostras retuli.

§. LIII. *Nostra dubio.*

Verum, ut aliqua de mea addam sententia, numeros equidem certos librarum pedumque vix crediderim inveniri posse. Et primum non intelligo, quomodo de tempusculo, quo cor sua contractione defungitur, accurate definiri possit. Sed neque copiam sanguinis ejecti credo

i p. 474. 482. 484. Eam *J. Rudolphus Stæbelin* in accusationem habet etiam *Cl. disp. de pulsibus* p. 5.
k T. II. p. 153.

fatis fideliter ad pondus revocari. Deest ergo utrumque elementum, ex quo celeritas constat, tempus, & lineæ longitudo, quæ percurritur. Si præterea communem vim cordis requiras, necesse erit inter primum saltum, altissimum, ultimumque, humillimum, mediam altitudinem sumere: sed etiam id arbitrarium medium in hominem absque experimento, atque adeo absque certitudine, transfertur.

Simplicissima equidem methodus videtur, quam *Bernoullius* ex *Halesianis* recepit. Sed in iis tamen calculis summum vitium est, quod Vir Cl. enormis resistentiæ rationem non habeat, quam cordis vis in sanguinem exercita offendit. Ergo harum resistentiarum aliquas addemus.

Omnes arteriæ corporis animalis, adeo numerosæ, adeo firmæ, ab uno ictu cordis dilatantur, figuram flexionum suarum mutant, & in majorem longitudinem producuntur. Id, quam difficulter fiat, facile experiuntur, qui in replendis vasis cadaverum operam ponunt. Neque replentur unice arteriæ, sed & ipsæ non raro, a sola vi cordis *l* rumpuntur, & venæ *m* a cordis adeo jam debilitato impulsu, franguntur, & tanta denique vi aorta dilatatur, ut costæ a palpitante corde extrorsum preman-
tur *n*, & non raro omnino rumpantur *o*. Por-

l In L. II. p. 145. 146.

m Ib. p. 242.

n R. de Graaf de succo fractura absque causa externa.

pancreatico p. 87.

o Waldschmidt in disp.

ro in aneurysmatibus magnæ arteriæ costæ de sede motæ leguntur *p*, & ruptæ *q*, & sternum perforatum *r*, & claviculæ altera fracta, altera luxata *s*. Ab auricula distenta etiam costæ fractæ fuerunt *t*.

Porro ducentæ, quæ corporis humani pondus non raro efficiunt, libræ omnino a singula pulsatione arteriarum undique elewantur. Rari sunt homines, qui pondera de manu adeo firmiter sustinere norint, quin ea singulo in pulsu eleventur, & in proxima arteriæ systole subsideant. Omnes enim totius corporis partes undique eodem ictu oculi distenduntur, & corpus totum latius una, longiusque fit, & altius. Si præterea toties centenas libras, quot homo absque destructione ferre potest, pectori inposueris, eadem ab ictu cordis absque renixu elewantur. Denique cum fere 40.000 libræ aëris atmospherici nos ambeant, & eadem vi premant, qua urgeremur in lacu argenti vivi, undique totum corpus submersum tenente, & alto pollices viginti & septem *v*, hoc totum adeo enorme pondus nihil impedit, quin pectus a corde percutiente elevetur. Si enim hæc pondera vires circuitum sanguinis promoventes non minuunt *x*, si ipsæ inter eas

p Ant. de Heyde Centur. obs. n. 34.

q Angelus Victorius in historia morbi & mortis Philippi Neri. Frequenter omnino id fieri Fernelius in Patholog. L. V. c. 12.

r Fischer de modo quo se ossa accomodant &c. p. 32.

s Henr. Franc. le Dran obs. serv. de chir. 40.

t Manne in obs. post Dionisii cours de chirurgie.

v Libro VIII. L. IV. p. 18.

x Malouin l. c.

vires sunt, quæ eum circuitum juvant, & arteriarum contractionem augent, dum cor remissum quiescit, certe tamen non debuerunt de numero obstaculorum demi, quæ cordi, dum sanguinem in arterias expellit, easque dilatat, utique resistunt, & a corde superantur α^* .

Hæc de ponderibus, quæ a corde elevantur. Ostenduntur autem α^{**} plurima alia obstacula, quæ cordis vires absumunt aut frangunt. Eo pertinet augmentum luminum, quæ in ramis arteriarum continuo trunco suo majora sunt, & eundem videntur effectum cum vasto lacu habere, in quem sanguis se diffundat: frictiones variæ; coagulabilis sanguinis natura, qui continuo in placentam aut polypum cogitur, quando quievit. Super hæc omnia obstacula adparebit, sanguinem cum quam minimo velocitatis decremento, per minima vasa urgeri, ut fere æque rapide per eas angustias, celeritate a tot obstaculis diminuta, agatur, ac quidem per truncos arteriarum motus est. Neque unquam machina inventa est, quæ vel e longinquo cordis vires imitaretur, aut ullum liquorem per vasa corporis animalis omnia urgeret, qualis quidem in corde machina est.

Cæterum harum virium iniqua inter cordis ventriculos est distributio, & major omnino pars ad sinistrum ventriculum, minor, non ideo tamen valde debilis, ad dextrum pertinet. Nam & crassior ille est, & in arterias duriores,

α^* L. VI. p. 18.

α^{**} L. VI. p. 17. seq. L. IV. p. 358. seq.

atque numerosiores, & longiores, sanguinem expellit. Num præterea a sanguine per aëris efficacem pressionem celerius suppeditato γ , melius irritetur, nondum locus est inquirendi.

S E C T I O V.

C A U S Æ M O T U S C O R D I S.

§. I. *Fibræ carneæ.*

PROXIMA omnino causa motus, quem hactenus in corde descripsimus, est in fibris carneis ejus musculi. Et septum quidem cordis, utroque ventriculo crassius & durius, totius cordis motui est pro fundamento, idemque superius, quam versus mucronem, majorem diametrum habet, cum dextræ inprimis carnes diminuantur, quo ad apicem propius accedunt. Deinde, cum fibræ cordis in universum cum aliqua obliquitate transversæ sint z , possunt pro dimidiis circulis oblique positæ haberi, quorum duo puncta fixa, superius, & inferius, in septo thalamorum cordis ponuntur, medius arcus summam convexitatem aut dextri ventriculi efficit, aut sinistri. Quando hæ adeo fibræ breviores redduntur, adducunt mediam convexitatem sui arcus ad septum cordis, &

γ Quæ Roberti Whytt est 73.
 conjectura of vital motions p. α Sect. III. p. 176. 177.

eum arcum rectæ lineæ propiorem reddunt, atque adeo ventriculum arctant.

Porro, cum mucro cordis utique basi debilior sit, fibræ vero cordis carneæ oblique a basi in apicem descendant, sequitur, ut eædem fibræ, dum utrumque suum finem ad medium ventrem adducunt *a*, basin etiam cordis aliquantum ad mucronem, hunc multo magis ad basin adducant *b*, atque adeo in ratione firmitudinum inversa, basis & mucro sibi viciniore fiant. Ita mucro ad basin recurvatur. Simplicissima hæc enarratio actionis cordis, eadem cum phænomenis dudum expositis undique convenit.

Quæ ad auriculas pertinent, non difficiliora sunt. Dextra nempe auris, perinde ut dexter ventriculus, fit fibris in arcum flexis, quarum finis anterior est in carneo firmoque ambitu ostii venosi dextri cordis *c*: posterior *d* in musculo alio circulari, opposito, orto ab isthmi, sive anuli ovalis, parte suprema, qui idem posteriorem partem radice appendicis auriculæ, & auris anteriorem lineam terminat, & in occursum valvulæ *Eustachianæ* tendit, inque maxime priori parte auriculæ dextræ sensim evanescit. Inter hos duos circulos fibræ, auriculam dextram complexæ, in arcus convexos

a Hæc enim omnium fibrarum musculosarum communis natura est. *Second Mémoire sur les part. irritabl.*

& *sensibl.* Exp. 226. 229. 231.

b Sect. IV. p. 246. seq.

c Sect. III. p. 102. seq.

d Ibid.

exeunt, quorum arcuum vertex est in auriculæ parte maxime anteriori. Quando nunc hæ fibræ breviores fiunt, tunc utique eum sui arcus verticem deprimunt, parietem convexum & anteriorem auriculæ ad planitiem reducunt, atque adeo de angustata auricula sanguinem exprimunt *e*. Sed etiam alius musculus *f*, in fede acuti marginis natus, fibras radiatas educit, & in auriculam, & in ejus appendicem, atque adeo utramque detrahit & arcuat.

Porro appendix auriculæ deorsum ducitur ope musculi *g*, qui ex tendineo cordis ostio adscendens, eo quem modo diximus, superior, recta in appendicem surgit, & per eam radiatas fibras sursum mittit, quas versus ostium venosum detrahit *h*.

Sinistra auricula utrumque terminum suæ latitudinis *i* per fibras in arcum flexas adducit, ut ipsa minus lata fiat, & retrorsum repressa sanguinem exprimat *k*. Aliæ fibræ *l* apicem ejus auriculæ detrahunt, & ejus caveam breviorē reddunt.

Sinum sinistrum fibræ pene transversæ arcuant, quas *m* descripsimus. Earum motum suo loco exposui *n*.

e Sect. IV. p. 256.

f Sect. III. p. 245.

g Sect. III. p. 245.

h Sect. IV. p. 103. 104. 256. 257.

i Sect. III. p. 124.

k Sect. IV. p. 257. & 124.

l Sect. Ib. p. 124.

m Ibid. p. 123. 124.

n Sect. IV. p. 124. 256. 257.

§. II. *Fibrarum motus an a Nervis.*

Cum cor omnino musculus sit *o*, communem videtur cum aliis musculis naturam habere, ut & vim contractilem propriam habeat *p*, & aliam a nervis accedentem. In omnibus enim musculis experimenta confirmarunt, laceffito alicujus musculi nervo, eum musculum vehementer & celerrime contrahi *q*, id *convelli* vocant: nervo vero ligato vim suam amittere *r*, qua artum regebat. Neque tamen in analogia professorum industria requievit, inque ipso corde pericula facta sunt, ut ostenderetur, etiam huic musculorum principi suam vim a nervis esse. In octavo vero nervorum pare plerique experimenta fecerunt aut in recurrente: procul dubio, quod & ab eo pare nonnulli in homine cordis nervi proveniant *s*, & reliqui, a sympathico magno trunco missi rami, ab antiquioribus incisoribus, & a principe *Fallopio t*, ad octavum nervum referantur. Eum ergo nervum in vivis animalibus ligarunt, dissecuerunt, & cordis inde quietem, sive mortem expectarunt.

Par ergo vagum in vivi animalis
cer-

o Sect. III. p. 172.

p Second Memoir. sur les parties irritables & sensibles.

Exp. 226. ad 248.

q Ibid. *Exp.* 194. ad 209.

r *Exp.* 177. 178. 179. 180.

183. 187. 189. 190. 191. 192.

s Sect. III. p. 186.

t Vide, quæ de eo errore monui de vera nervi intercostalis origine n. 4.

cervice vinculo *Riolanus* interceptit, tam exiguo cum effectu, ut animal ne a cursu quidem abstinere v. Sed neque *Vopiscus Fortunatus Plempius* x ab eo nervo aut victo, aut præfecto, cor quiescere vidit. Successit labori industrius in ejusmodi periculis vir, *Richardus Lower*, repetiit idem amicus viri *Thomas Willis*. *Loweriano* cani y cor palpitavit, anhelitus suspiriosus fuit, atque mors post unum alterumve diem secuta est: *Willisianus* z obmutuit, convulsus est, & post aliquot dies perinde periit, cum nullum interea cibum admisisset. Denique *Robertus Boyle* a ligato pare vago pulsus intermittente successisse vidit, ut tamen ea bestia, non absque ægrimonia, ad quartum diem superesset a. Uterque vir Clar. ab intercostalis trunci ramis causam lentæ mortis repetiit, quam subitam exspectassent, si omnes omnino cordis nervi ab eodem vago pare prodirent.

Inde *Petrus Chirac*, Archiatrorum Gallicorum olim comes, debilem quidem, sed tamen totis 10 horis superfuisse cordis motum auctor est, cum eundem nervum ligasset b. Alius canis biduo periit, cui idem par vagum lino *Courtenius* interceptit c, apositiam passus, & vomitum, & difficilem respirationem. Tertio quartove die exspiravit, cui *Bergerus* d eum-

v *Anthropograph. L. VII. p. 114.*

x *Fundament. Medicin. p. 112.*

z *De cerebro & nervis p. 172.*

n *Birch history of the Roy. Society T. I. p. 504.*

b *Advers. Anat. p. 65.*

c *Philos. Transact. n. 335.*

d *De natura humana p. 63.*

dem nervum vinxit. Septimo demum & decimo die extincti sunt, in quibus idem experimentum *Baglivius e* instituit. Etiam ferius decesserunt de vita ii canes, quibus verissimus auctor *Morgagnius f* usus est. Eorum nempe, qui prior periit, decimo demum die, post destructam ventriculi coctionem, vocemque ablatam, denique periit: alter fuspiciosus, corde tremulo, octavo demum decimoque die vitam amisit. Intra triduum canis vitalis esse desiit, cui *Cl. Heuermann g* idem par vagum ligaverat, idemque anxietatem, & delirium prius passus est, aliaque mala. Ill. *Senacus* eodem vinculo cordis vires debilitatas vidit *h*. Sic *Cl. Laghi*.

Multa & ego experimenta feci, comite generoso nepote Ill. *Brunneri i*. In cuniculis & canibus ligavi alterius primo lateris, deinde utriusque, nervum, quem toties nominavi, vagum. Supervenerunt vomitus, aut certe ad vomendum conatus, putredo eorum, quæ ventriculo continebantur, respiratio difficilis, aphonia *k*. Perierunt animalia, prima post experimentum nocte *l*, postridie *m*, die tertio *n*.

Alii clari viri intercostalibus nervis vincula injecerunt, non abs re, cum ab eo trunco

e Diff. in qua experiment. vorum in variis animalibus anatom. pract. Sc. n. VIII. instituta Gotting. 1753.

f Epist. Anat. VIII. n. 26. *k* Second Memoir. &c. Exp. 182. 185. 186. 188.

g Physiologie T. I. p. 300. *l* Exp. 182.

h l. c. T. II. p. 224. *m* Exp. 185.

i In diff. qua continentur *n* Exp. 186.
experimenta circa ligaturas ner-

cor plus nervorum, quam ab octavo pare habeat. Etiam ab eo vinculo vigesima demum quarta *x*, & trigesima hora *y* animal periit. In his periculis vagi paris integritas animalis vitam conservasse potuit.

Alii denique incisores, difficillimo experimento, & octavi paris nervum, & sympatheticum magnum, utrumque refecerunt. Sed etiam tunc periit quidem animal *z*, non tamen satis continuo *a*, uti periisse oportuisset, si vis cordis ab his nervis penderet.

Non dissimulandum est, alios eventus aliis ab incisoribus visos in *Bohnii o*, *Bergeri p*, & *Varrignonii q* experimento, animal ligato utriusque lateris vago nervo subito periit, aut certe post cordis debilitatem arteriis venisque turgidis cito exspiravit *r*. Nam & mihi *s* similes eventus acciderunt, quos vero contrarii illi, quos recensui, non sinunt demonstrare, octavi paris nervis destructis cordis motum intercipi. Cum enim in plerisque exemplis, absque eorum nervorum usu, cordis vigor supersit,

x *Vieussens tr. du cœur* p. 30. 122. Obmutuerat, forte ob ejus trunci cum recurrente nexum.

y *Heuermann l. c.*

z *Petit Memoir. de l'Acad. Roy. des scienc.* 1727. p. 6. *Brunner de pancreate* p. 101. 102.

a Septima hora in *Petiti* experimento. *Brunnerus* tem-

pus non addit, quo animal periit.

o In *circulo anat. physiolog.* p. 96.

p In alio exemplo *l. c.*

q Testem nempe se dat *vir Cl. Histoir. de l'Acad. des scienc.* 1706. n. 3. p. 23.

r *Cl. Ens de causa vires cord. altern.* n. 4.

s *Exp.* 181.

ostenditur, eam vim ad cordis functionem non esse necessariam.

Sed etiam Cl. *Massimi* experimenta sua producit, quæ his nostris placitis, si nostra dicere licet, undique contraria obnituntur. Nervis nempe irritatis motum cordis accelerari a^* , & cor a quiete ad motum redire a^{**} . Medulla spinali irritata cor quietum ad motum rediisse, aliisve nervis irritatis a^{***} . Sed etiam tunc cor ad motum reversum irritato nervo, cum ipsam irritatum nihil mutaretur a^\dagger . Resectis vero nervis recurrentibus irritabilitatem cordi subtractam fuisse $a^{\dagger\dagger}$: cordis etiam evulsi motum recurrentibus nervis irritatis accelerari $a^{\dagger\dagger\dagger}$.

Verum abunde est testium, irritato octavi paris t aliove nervo, cordis motum nunquam acceleratum fuisse, neque pulsum vehementiorem successisse, aut sanguinem validius erupisse. Ita ego vidi, neque ab octavo pare irritato cordis motum suscitari vidit Ill. *Senac v.*

A convulsione per irritatam medullam spinalem excitata aliquantum quidem sanguinis motum turbari, sed cito in ordinem redire vidit accuratior *L. Spalanzanus*: ne-

a^* *Massimi* ll. *esper* 15. recusum octavo & bronchialibus.

a^{**} Id. *Esper* 4.

a^{***} *Esper* 14.

a^\dagger *Esp.* 2.

$a^{\dagger\dagger}$ *Obs.* 3.

$a^{\dagger\dagger\dagger}$ *Esp.* 13.

t De nervo octavo *Ens* l. c. n. 10. de cardiacis nervis *Robertus Whytt* l. c. p. 355. v l. c. p. 319.

que irritamenta nervorum , neque resectam medullam spinalem, neque cerebrum resectum motum cordis interrupisse. Vidit *Monrous* junior, destructa medulla spinali tamen pulsum superesse. Nuper Cl. *Johnson* medullam spinalem irritatam negavit quidquam in cordis motu mutare. In repetitis experimentis *Caldanus* nervorum irritationem convulsionem fecisse, cor immotum ad motum non revocasse reperit. Perinde in Ill. *Fontana* experimentis octavus nervus, & medulla spinalis, & cerebrum, stimulo suo motum cordis neque accelerant, neque fuscitant, quando conquievit *n**, ut omnino is motus voluntati non obediat *n***. Qui minime mecum amat sentire Cl. *Trabucchi*, ligatis nervis pulsum cordis potius augeri vidit. In experimento Ill. *Swietenii*, a Cl. *Marherr* relato, & intercostalibus & vagis nervis ligatis animal vitale superfuit. Resectis nervis octavi paris pulsus cordis per 50 horas superfuit, testibus Cl. viris *Boniolo* & *Pagano*. Demum ipse Cl. *Massimi* vidit, nervis irritatis & medulla spinali laceffita cor nihil mutatum, & ab effectu *v** ut puto, opii *v*** & absque opio in plusculis experimentis.

Poterat motus cordis ligatis nervis superstes ab iis majoribus omnino truncis nervosis repeti, qui a ganglio cervicali *b* infimo ad cor veniunt. Ejus enim ganglii unica ra-

*n** *Ricerche* p. 90.

*n*** p. 98.

*v** *Esp.* ll. p. 15. Lente se

contraxit esp. 22. 39. 19. 20.

*v*** *Esp.* 23.

b p. 193.

dix a trunco intercostali est, aliæ, multo & grandiores & numero potiores. a nervis cervicis, sexto, septimo, octavo, dorsi vero primo & secundo, qui ad idem ganglion efficiendum conveniunt, & quos omnino nulla fere incisoris industria in vivo animale refecerit, quin simul arteria aliqua grandior, subclavia, vertebralis, thyreoidea inferior, funesto eventu aperiatur. Ergo magnæ nervosæ suppetiæ cordi supersunt, etiam quando crudeliter diligens anatomica manus utrumque grandem truncum, octavum, & intercostalem, in cervice abruptit.

Verum aliud experimentum superest, in quo tota fere nervorum ad cor venientium classis una detruncatur: quando nempe medulla spinalis altius in collo violatur. Ab ea enim medulla nervus intercostalis totus nascitur, exiguis ramis exceptis, qui a secundo quinti paris ramo, & a sexto nati descendunt, & quorum forte pars major in nervos illos molles transit, qui de ganglio cervicali superiori prodeunt. Superest equidem nervus octavi paris, sed ab eo trunco in homine pauci, & in sinistro latere pauciores, nervuli cor adeunt.

Cum adeo medulla spinalis præcipua nervorum cordis scaturigo sit, ea in summo collo dissecta, destructo ergo nervosi systematis ortu, quod infra eam sedem ex medulla spinali prodit, animalia subito extinguere legimus. Verum his experimentis enarrandis suus erit locus c,

& ostendendum, etiam hic vulnerum medullæ spinalis vim in occidendo animale nimium ornata fuisse *d.*

Cerebellum pro nervorum cordis scaturigine habitum non multis adhuc paginis accuratius contemplabimur. Verum omnibus denique nervis cordis resectis cor etiam celerius pulsavit *r.* Sed demum ostendetur *r*^{*} truncato capite motum cordis superfuisse.

Collectis omnibus adparet, nervos cordis destructos, ubicunque destructi fuerint, mortem quidem inferre, cæterum esse in corde aliquam motricem causam, quæ ejus muscoli motum aliquamdiu sustentet, etiam quando nervorum præsidium amisit. Adesse vero causam ejusmodi, ea, quæ nunc proponimus experimenta, manifestissime ostendunt. Ea causa est *natura irritabilis* *r*^{**}, quæ in omni musculo aliqua, in corde super omnes alias carnes potentissima habitat. Ordinem autem rerum sequemur.

Video etiam pro nervosa in cor potestate opii vim produci, quod in aqua solutum infusum cor celerrime ad quietem reducat *r*^{***}, in ipsum cor impulsus promte motus finem faciat. Verum experimenta hæc partim nondum satis firma sunt, partim aliam admittunt interpretationem. Cl. *Trabucchi*, scriptor rebus meis potius infensus, opiatam aquam

d Ib. n. 37.

r Chirac *Eph. nat. cur.* 24, 26.

Vol. IV. obs. 33.

r^{*} n. 12.

r^{**} *Massimi* ll. esp. 20. 22.

r^{***} *Albin. nat. hom.* p. 33

34.

cordis motum accelerare reperit, cicutæ extractum & hyoscyami nihil omnino mutare. Ill. *Fontana* opium extus musculis admotum nunquam vim insitam minuisse vidit, Cl. *Carminati* nuper in plurimis experimentis ab opio cordis actionem vidit $r†††$ aut augeri, aut certe conservari. Denique ex insigni effectu, quem opium in ventriculum atque in intestinum edit, locus est suspicioni, non nerveam solum vim ab opio imminui, sed pariter etiam vim insitam.

Quare puto, libratis contrariis experimentis, me iis quæ ipse vidi, quæ summi in experiundo viri constanter viderunt, omnino adfensum debere. Cor nempe ab aliis musculis hæctenus diffidere, quod nervorum vis in ejus motu producendo non ea sit, quæ experimento possit demonstrari. Posse ad integritatem cordis, ad vim fibrarum sustentandam, nervorum aliquam esse potentiam. Alia tamen potentior cordi est causa motrix, quæ absque nervis omnino excitari nequit. Is, qui integro libro me refutare suscepit, fatetur tamen vim voluntatis & nervorum in cordis motum comparatam cum vi stimuli pene nullam esse $r****$.

Supereſt aliud dignum ingenio *F. Fontanæ* experimentum. Vidimus in experimento $r†$ ventriculum dextrum ante sinistrum quiescere, si prior vacuetur; sinistrum ante dextrum, si, ut vulgo fit, prior inanis fuerit. Sed iidem nervi utrumque ventriculum adeunt. Quiescit ergo alter subtracto stimulo, etsi nervi vis

$r†††$ *De Anim. in mephit. interit.* p. 134. 135. 137. 139. 143. 144. 145. 147. 149. 150. 151. $r****$ *Observ.* p. 140. $r†$ *In propr. diff. Comm.* Götting. T. I.

præsto est, dum alter pergit operari; ergo iidem & motum producant, & nullum producant *r††*.

Eodem pertinet, quod irritatis nervis recurrentibus etiam solus ventriculus dexter ad motum incitatus fuerit, absque sinistro *r†††*.

Ex *Fontanae* porro experimentis sequitur irritationem admotam necessariam esse, neque ea si absit, etiam integros nervos operari. In altero experimento *Massimi* adparet, posse partem musculi ad motum inidoneam esse, dum altera integram facultatem motricem conservat.

§. III. Cl. D. A. *Wilson* objectiones.

Qui nuperrime ad vim cordis refutandam accessit, *Andreas Wilson*, non ille quidem per experimenta ad hanc litem præparatus, ingenio tamen non vulgari vir, alias vires esse objecit, quæ omnino ad cor referri nequeant, qualis vis est resorbens vasorum lacteorum aut lymphaticorum, vis etiam sanguinis venosi, qui portarum venam perfluit. Cordis motui nihil a corde accedere, neque enim plus in sanguine arteriarum motus esse, quam in venarum cavarum sanguine, cujus momentum potius majus sit. Neque sanguinem fetus venosum a corde fetus suum motum accipere. Non debere vires cordis ita æstimari,

ut sint ultima ejus musculi exserta potestas, quam nullus musculus diu ferre possit. Principia motus in sanguine multa esse, quæ cordi non tribuas, ut evaporabilis elementi ad avolandum agilitatem, ut fermentationem certe inchoatam, ut conatum ad extricandum aërem fixum. Accedere præcipuam systematis nervosi potentiam, quæ tam violenta cum sit in animi passionibus, non possit in homine tranquilli animi nulla esse. In ipsis fluidis habitare vitam & activitatem propriam. Irritabilitatem *Idem* adgreditur, quod per irritationem musculi aliqui & potissimum sphincteres relaxentur. Videri cordis effectum potius esse depletionem primo venarum, ut sanguini redeunti vacuum spatium præparetur, quo tendere possit: tunc sanguinis in partes solidas impulsus, quo stimulentur & earum robur augeatur: sed etiam vitam partium fluidarum a cordis impulsu suscitari, & chylum cum sanguine, cum eodem aërem in pulmone resorbtum misceri: effluvia dissipari, ne in massas coalescant.

Hinc *Rödererus* in fetu quidem non a corde, sed a calore, aut a vi adtractili, motum sanguinis derivabat 15.

§. IV. *Irritabile est causa motus cordis.*

Et primo cor & sponte movetur, & ex quiete ad motum ab aëre, a calore, a liquore impulsio, a scalpello, a liquore acri quocunque, a salibus, a venenis per ignem paratis facillime revocatur, eamque proprietatem reti-

net, quando omnes in corpore animali musculi frigent, & languent *s*, & quiescunt, & nulla vi ad motum revocari possunt *t*. In frigido animale nullum dubium superest *v*, cujus cor decem horis ab inciso pectore saliat, quo tempore & intestina, & reliqui in toto animale musculi, æternum quieverunt. In torpedine corpus universum tribus horis palpitat, cor vero ad octavam usque nonamque pulsum continuat *v*: in anguilla ad quadragesimam. In testudine cor diutius quam carnes, est irritabile *y*. Cum in fele cor frigida eluisssem, tamen irritabile fuit, quo tempore nulla vis motum in femoris musculis suscitabat *y**.

In calidi sanguinis bestiis intestina quidem cum corde de eo privilegio contendunt, & non raro diutius, quam cor ipsum, peristalticum motum & irritabilem naturam *z* retinent: alias ta-

s Habet aliqua eo pertinentia jam *Plinius* L. XI. p. 621. In felis corde motus superfuit, cum reliquis musculis reddi non posset *Murali Vademecum anatom.* p. 449. Cor suscitabile manet, quando principium vitale in reliquis musculis destructum est *Senac* p. 328.

t Conf. experimenta nostra l. c. 470. 472. 473. 493. 498. 515. 520. Sermon II. p. 32. exp. 420. 421. 438. 372. 364. *Carminati*, lib. cit.

v *Exp.* 528. 529. 531. 546. Cl. *Brocklesby* in *Phil. Trans.* 1755. p. 243.

x *Lorenzini anat. of the Crampfish.* p. 58.

y *Oexmelin hist. des aventuriers.* p. 87.

*y** *Oper. min.* p. 263.

z *Exp.* 400. 401. 419. 420. 422. 424. 427. 428. 429. 435. 400. 443. 445. 464. 467. & in experimentis *Cel. Zinnii* medicum communicatis, tum apud *Zimmermannum* p. 63. *Johannem Woodward* in *supplement.* p. 76. *Urbanum Tosetti Lettera* II. *esper.* 17. *Stablium* in *theoria vit. & mort.* *Tulpium* L. II. c. 41. *Carminati* p. 9. a fumo sulfuris incensi, tum p. 18. 19.

men & in hoc ordine animalium prima *a* in æternam quietem transeunt, & etiam si superant, multum videntur calori superstiti *b*, & minori copię adipis, & aeris perpetuo stimulo debere *c*. Quando enim aer in cordis caveas receptus est, tunc utique sæpe etiam intestinis supervivit, quod parem cum ipsis stimulum secum *c**** habeat *d*. Fere semper superare *Cigna*, ut in experimentis *van den Bos d***.

Sed etiam multo serius in fetu naturam irritabilem induunt intestina, quæ cordi primæva inest. Neque ullo modo cum naturæ constantia convenit, ut in frigidis animalibus res cordis potiores sint, neque perinde in calidis superent.

De reliquis musculis res extra controversiam est, qui aliquamdiu equidem post sensum, & voluntarii motus perfectam destructionem, palpitant *e*, cæterum dudum frigent, & ad omnes irritationes furdi quiescunt, quo

a Exp. 469. 470. 472. 473. 493. 498. 503. 504. 533. 535. *Zimmermann* p. 65. *Carminati* p. 121. 124. 116. 118. 183. 62. 63. 64. 171. 169. 151. 150. 149. 147. 144. 139. 137.

b Superat cordis irritabilitas, quando pericardium integrum relinquitur. *Oeder de irritabilit.* p. 4. Confer *Zimmermann* p. 62. Hinc animalia calore ad vitam revocantur.

c Exp. 1. c. p. 397. 398.

*c**** p. 4.

d Exp. 473. 479. 490.

*d** *Vir. corp. solid. exp.* 12.

*d*** *Phil. Transf.* Vol. 11. P. 11. p. 404. Non ideo neges, vehementiorem fumi carbonum efficaciam demum animal occidere, & cordis irritabilitatem destruere *Fontana ricercb.* p. 131.

e L. IX.

tempore cor aut pergit pulsare *e*^{*}, aut certe ab irritatione amissum motum recuperat. Inter eos musculos etiam septum transversum est, cui tamen mobilitas pertinacior insidet *f*. Adde nunc multo violentiorem, quam ullius alterius musculi, cordis motum esse.

In his experimentis consentiunt nobiscum alienissimi alias a rebus nostris scriptores, ut *Cl. van den Bos*. Sesequi hora aliorum musculorum irritabilitati naturam cordis irritabilem superfuisse vidit vir *Cl*.

Pauca equidem experimenta passim lego, in quibus cor irritabilitatem amisisse dicitur, dum ea potestas in musculis *f*^{*}, in oesophago, in ventriculo, in lingua supererat. Nihil equidem unquam simile vidi. Si alii *Cl*. viri viderunt, putem pectus ante abdomen apertum fuisse, & aëri expositum adipem ejus coivisse: frigidum autem cor & adipe coacto tectum utique ad motum ineptum fit, dum interim musculi, oesophagus & ventriculus, suis tecti velamentis, calorem & necessariam mollitiem conser-
varunt. Manifesto *Ill. Fontana*, quo cor pinguius est, eo citius desinere moveri, & eo diutius ejus motum superesse, quo magis in

e^{*} A tabaci fumo *Carminati* p. 169. 175. A camphora p. 181. 183. ab aëre non renovato p. 90. 105. 106. a pulvere pyrio p. 30. a vapore ferri in spir. nitri soluti p. 43.44. ab arsenici vapore p. 62.

a putrido aëre p. 116. 118. a carbonum fumo *Pressav. rechcrch. f Exp.* 230. 239. 240.

f^{*} *Massimi* 11. esp. XI. ad quadraginta minuta. *Fontana* p. 153. de bobus. *Carminati* a tabaci fumo p. 115. & sulfuris p. 8. 9. 18. 19. 14. 15.

calida fervatur *f***. Demum etiam ideo fate-
tur cordis irritabilitatem superare, quod in-
terna facies cordis ab aëre tutior sit *f****.
Nos in solo experimento nos continemus.

Nunc, cum omnes muscoli nervos perin-
de uti cor suos accipiant, etiam magis conspi-
cuos, etiam numerosiores, sequitur musculos
cordi supervicturos, si a sola vi nervea motus
musculorum esset. Cum vero reliqui muscoli
minime cordi supervivant, adparet aliam præ-
ter nervos causam motus in corde esse.

§. V. *Stimuli varii, qui cordis motum excitant.*

Liceat de causa irritante non inutilia ex-
perimenta subjunxisse. Ab omni utique stimu-
lo cor irritatum motum concipit. Pericardio
solo tacto motum cordis acceleratum fuisse,
nondum tangente musculum instrumento *ft*.
Id mihi nimium videtur, qui cor, ut irritetur,
contingi deberi expertus sim. Minimum sti-
mulum sufficere Cl. viris credo & mihi, ut
ab aquæ guttula, a contactu capilli ad motum
revocetur *ft†*. Cor irritatur ab externo aëris
frigidi tactu *g*. Inde fit, ut animali, cui nul-
lus in corde pulsus superest, pectus apertum
cordi motum reddat: quod idem phænomenon
etiam in intestinis videmus. In animalibus

*f*** *Ricerche* p. 151. 152.
etiam evulsum p. 154.

*f**** p. 155.

ft *Massimi* II. exp. 30.

ft† *Fontana ricerche* p. 93.

g *Whytt on vital motion* p.
360.

simplicissimis, quorum summa est irritabilitas, sola aqua sufficit, ut in rotifero animale, quod in aridum pollinem dilapsum, humectatum ad motum vitamque redit^{g*}.

Longe potentior calor *h* est, & solo digito calido aut adpersa calida, cor quietum facile ad motum revocatur, etiam in echino *i*, vipera *k*, anguilla *l*, in mure demum marmota, aliisque animalibus per totum hyemen sopitis & frigentibus, quibus solus veris gratus tepor pulsus vitamque reddit. Subito etiam latentem vitam adfusa fervida suscitatur; elegantissime vero in puncto saliente sive corde pulli, qui ovo continetur. In eo enim animalculo sæpissime, post *Harveium m*, aliosque *n* claros viros spectaculo fruor insignis potentiae, quam ad suscitandam vitam cor exercet. Sive enim tenerrimum corculum penitus quieverit, sive languidum fuerit, raroque & debiliter pulsaverit, acceleratur pulsus, novusque vigor cordi redit, quoties integrum ovum in

^{g*} *Roffredi* apud *Rozier Journ.* 1775. Janv. *Spalanzan.* ad Bonnet II. p. 118.

h *Senac* l. c. p. 328. *essays de physique* p. 473. *Deidier traité des tumeurs* p. 99. *Lancet*, p. 68. 81. *Whytt* p. 82. 350. 352. &c. *physiological essays* p. 42.

i *Templer Philos. Transact.* n. 93.

k *Woodward* l. c. p. 87. *Browne Langrish of muscular motion* ad fin.

l *Cartesius* ad *Plempium* in *fundam. medic.* p. 159. *Boyle Philos. Trans.* n. 62. *Woodward* p. 80. *Caldan.*

m *De generatione animalium* p. 52. 151.

n *Schrader Observ. anat.* p. 173. *Boyle de etil. philos. experim.* p. 114. *Harder exercit. anat.* p. 236. *Maitre Jean de la format. du poulet.* p. 88. 122. 140. *Swammerdam de respir.* p. 101. *Ent. apolog.* p. 245.

calidam dimittitur, aut calida animalculo superfunditur. Sed etiam animalculum de ovo exemptum, & in tepidam projectum, aliquamdiu vivit, isque optimus modus est, quo possis ex omni situ cordis motum contemplari. Cuniculi languidi a calore focī tamen refocillantur, etsi paralyſis in musculis superest *n**. A fervida idem vehementer palpitat, ut brevi quiescat o. Audiendi vero sunt hic potissimum Cl. *Martin* & *Poitevin*, qui adnotarunt, quot pulsibus quisque gradus caloris aucti, aut diminuti, pulsum priorem augeat vel minuat.

Ita in experimentis D. *Poitevin*, cum medius calor esset 29. gr. *Reaumurii*, duos pulsus legas accessisse ad gradum 30. sex ad 31½, quindecim ad gradum 32, septemdecim ad gr. 33½, triginta duos ad gr. 35, quadraginta & unum cum palpitationibus ad gr. 36. Vicissim detracti duo gradus demserunt pulsus duos: ad gradum 26 fuerunt diminuti senis, gradubus ad gr. 25 reductis defecerunt pulsus 12, ad 22 gr. pulsus 17, ad 16 gr. caloris pulsus 25.

Cl. *Martin* demtis gradubus caloris 15 reduxit pulsus a 78 ad 64½.

Auxit 33½ gradu ad 94 cum sudore, tum gradu 35 ad 107 cum vehemente sudore, & gradu 36 ad 117 pulsus cum palpitatione.

Rationem aucti a calore pulsus, aut a pulsu

*n** Caverhill heat.
o Whytt l. c. & exp. no-
stra in pullo incub.

*o** In propr. lit.
*o*** Sw. Wet. Acad. handl.
1773,

fu caloris, non constantem esse alias ostendemus, cujus anomalix multæ causæ sunt.

Porro mechanica irritatio, quæ scalpello fit aut acu, aut alio quocunque acuto instrumento o*, corda quæta animalium p & calidorum, ut canis q aut felis r & frigidorum s ad motum revocat, aut ipsa denique distractio t.

Pares vires sunt acrium salium v, aut butyri antimonii x, aut spiritus vitrioli y, sp. salis ammoniaci y*, aut aliorum ejus generis venenorum z. Ab eorum enim tactu carnes cordis contrahuntur, foveaque a decurtatis fibris relicta a nascitur. Sed etiam scintilla electrica, quæ de ejus carne extrahitur, quietum cor ad motum revocat b, & moribunda animalia suscitatur b* certatamen cum mediocritate, violentior enim necat.

Externæ irritationes, quæcunque demum

- o* Punetura acus auriculam in anguilla.
ad vehementem constrictionem t Whytt p. 354.
incitat Caldân. *risless*. p. 245. v In cyprino *Tralles exam.*
p Conf. N. Stenonis F. in *terreor* p. 317.
act. *hafniens*. T. II, p. 142. x *Second Memoir. sur les*
Borell. L. II. *Prrp.* 28. Ber- *part. irritabl. & sensibles Exp.*
tin Thes. sæpe cit. *Whytt* l. 486. 520.
c. p. 349. 355. *Rolsink de*
corde p. 32. *Lower* l. c. p. 495. 498.
46. *Caldani* Epist. ad me da- y* Conf. *Tosetti letter* 2.
ta p. 325. *Lancisius* p. 83. p. 191.
q *Drelincourt Cunicid.* V. z *Santanelli lucubrat* III. p.
Wepfer de circuit. aquat. p. 125.
195. a *Exp.* 486. *Zimmermann*
r J. *Muralt in vademecum* p. 56.
anatom. p. 449. *Second. Me-*
moir. &c. Exp. 490. 495. b *Shebbeare practice* p. 192.
s *Denys conference* XIV. in ranis. b* *Bosch febr. epid.* p. 366.

fuerint, brevem effectum producunt, & post paucas palpitationes quies duratura redit, maxime si veneno usus fueris *c*. Si una in sede cor irritaveris, ea sedes post contractionem irritabilitatem amittit; cum alia particula cordis irritata motum recuperet *c**.

Multum tempore, & perfectione, & bono ordine, superat is cordis motus, qui ab interna irritatione succedit. Ejusmodi sunt pulsationes, quæ a calore omnia penetrante *d*, & sanguinem forte venosum rarefactum in cordis caveam pellente, adeo durabiles superveniunt. Sed etiam aqua cordi *e* inmissa, aut vasis *f*, eam potentiam exercet, sanguis vero etiam magis, cujus vis stimulans ad cordis naturam commensurata fuisse videtur. Accuratius quidem de hac causa, cordis motum producente, alias dicetur: suffecerit interim notissimum experimentum citasse, quando post auriculæ duas tresve palpitationes, sanguinis sufficiens unda cor quiescens ad motum revocat *g*; & alterum, a Roberto Hooke vulgo nominatum *h*, cujus vis

c Exp. 514. Conf. 498. *Massimi* esp. 28. P. II.

*c** *Massimi* ib.

d p. 437. 467. *Langley* de incub. p. 148. *Stenonis* act. *Hafn.* T. II. p. 87. 89. 90.

e *Lower* l. c. p. 47. *Cowper* in introductione, *Harder* apiar. obs. 2. & 25. *Berger* de natur. human. p. 62. *Loescher Anthropol.* exp. p. 15. *Bertin* Thes. cit.

f *Ens* l. c. n. 19.

g *Plemp* fundament. medicin. p. 204. &c.

h Conf. *Sècond Memoire*

Exp. 476. 478. 482. 491

Browne Croonian lectures p.

141. seqq. *Hooke Phil. Transf.*

n. 29. aliosque in *Comment.*

ad *Prælect.* *Boerh.* T. II. p.

176. 221. T. V. P. I. p. 12.

excitatos. Verus Auctor om-

nino fuit *Andreas Vesalius*

L. VII. ad fin.

omnino plerumque a sanguine est, quem aër in pulmones impulsus in sinistrum ventriculum inpellit.

In experimentis tamen meis non alius stimulus, quam aëris, potentior fuit, sive per venas *i* simplici modo inpellatur, sive aliquanto artificiosius per ductum thoracicum *k*. Nam & in rana circa aëris bullam corde & auricula receptam, cumque viscido sanguinis fero subactam, novem & decem integris horis, & in multam noctem cor contrahitur *m*, & alterne laxatur, optimi & vitalis simillimo ordine: & in cane septem integris horis ab eodem elemento inmisso cordis pulsationem superfuisse vidi *n*, & in universum aëre impulsso cor a quiete revocavi, quando ad omnes alios stimulos surdum erat *o*. Ita duodecim a mor-

i Muralt colleg. anat. p. 320. Comper l. c. Wepfer de cicut. aquat. p. 156. Malachias Thruston de respirat. diatrib. p. 141. J. B. Caldesi l. c. p. 70. in taxo, trichorio a morte, & in experimentis nostris, Cald. rifl. p. 253. Second Memoir. sur les part. irrit. & sensibl. Exp. 479. 480. 482. 583. 489. 491. 596. 498. 499. 500. 504. 514. 520. 541. Zimmermann, Exp. 12. Per venam cruralem Physique des corps animés. p. 242. *k* Wepfer de cicut. aquat. p. 90. 181. 223. 297. 303. 304. J. C. Peyer parerg. anat. sept. tot G. Needham apud Thruston de respirat. p. 63. Col-
lins l. c. p. 836. Brunner de pancreate p. 21. & sub fin. de glandul. duoden. p. 73. 74. J. Bohn de aëris influxu p. 436. Vater physic experim. p. 17. Senac l. c. p. 326. Franciscus Job. Hunauld apud eundem Ill. virum ibid. quod experimentum in homine factum est. Porro Heuermann physiol. p. 303. Second Memoire &c. Exp. 473. Huc referas experimentum, quo aër in asperam arteriam impulsus cordis silentem motum revocavit. Portal apud Colomb p. 15. *m* Exp. 479. 480. *n* Exp. 473. *o* Exp. 473. 482. 489. 496. 498. 512. 513. 514.

te horis *p*, & integris diebus, ab aliis claris viris *q*, aëris vim cor ex quiete fuscitasse legimus, etsi ejusmodi quidem experimentum ego nunquam tentavi.

Demum accurate adparet, aërem in cor quiescens impulsus, ex ordine, venam cavam, auriculam, ventriculum ad motum revocasse. Sic pueros a partu pene inanimos obstetrices fuscitare norunt stricto funiculo umbilicali, ut aliqua sanguinis penus in cor quiescens repellatur. Evidentius etiam in corde longo, quod diximus, erucæ, naidis aliorumque vermium, humor vitalis primum nodulum replet & distendit; tunc idem evacuat, & alterum nodulum sanguine inundat. Is nodulus, uti sanguinem accepit, ita irritatus se contrahit & evacuat. Ita sanguis ad tertium & sequentes nodulos venit, & dilatationi contractio in quoque nodulo succedit.

Video contra ista Cl. *Mezgerum* objicere, has successiones in cordis motu antagonismo regi, non stimulo. Auriculam enim extractam de corpore, ventriculum extractum, vicibus alternis laxari & contrahi, licet eodem tempore stimulus adveniat *b**. Mihi, si hæc recte intelligo, hæc contraria videntur experimentis dudum productis *b***, quibus uterque simul ventriculus, utraque simul auris, uno tempore, sed quæque auris ante ventriculum contrahitur. Cæterum ex his peri-

p Senac l. c.

q Heuermann l. c.

*b** *Advers.* p. 134.

*b*** p. 299, 301. &c.

culis adparet, uti totum quidem cor, omnesque ejus carnes *r* irritabiles sunt, ita tamen internam faciem cordis plus de ea vi possidere *s*, & iterum videri, internam faciem auriculæ dextræ eadem vi potentiori pollere *t*.

Quare cum natura irritabilis cordi propria sit, poterat expectari, quod etiam experimento confirmatur, cor primum inter omnia corporis humani organa irritabilem vim conspicuam demonstrare. Ita in pullo incubato cor altero die vividissime micat, & stimuli impatientissimum est, quo tempore serum pro cerebro est, pro musculis iners gelatina, pro intestinis furdæ ad stimulos chordulæ. Ita ut primum irritabilitatem expedit, ita ultimum eam deponit.

Addi oportet, corda juniorum animalium evidenter magis irritabilia esse, facilius ad motum ex quiete revocari, eoque motu constantiori defungi *v*, quando externorum sensuum usus amissus est. Maxime irritabiles fuerunt feles 20 dierum *x*: contra canis vetuli cor *y*, cum omnia viscera calerent, ad motum revocari nequirit. Inde multa sequuntur, & ma-

r Exp. 495.

s Conf. Zimmermann l. c. *setti lettera* ll. *esper.* 20.
p. 57. Inprimis diutissime irritabiles manere columnas *jean du poulet* *p.* 285. *Ens.*
 cordis carneas auctor est Cl. n. 14. *Whytt* *p.* 358.
Broklesby Phil. Transf. 1755. *x* *Tosetti* L. ll. obs. 12.
p. 243. Ob aëris contactum *esper.* 21. 22.
 hanc esse diuturnam irritabilitatem *Fontana ricerche* *p.* *esper.* 13.
 155.

t Exp. 473. 494. &c. *To-*

setti lettera ll. *esper.* 20.

v *Lower* *p.* 46. *Maitre-*

jean du poulet *p.* 285. *Ens.*

n. 14. *Whytt* *p.* 358.

x *Tosetti* L. ll. obs. 12.

esper. 21. 22.

y *Tosetti* *ibid.* obs. 11.

Fontana ricerche *p.* *esper.* 13.

155.

gni momenti corollaria, ad theoriam incrementi, adfectuum animi, febrium, adque curationes morborum acutorum. Hinc illa vivacissima cordis tenerrimi pulsatio, quæ puncti salientis nomen meruit, quo tempore totum animal, præter cor, iners gelatina est. Hinc multo frequentiores pulsus animalium juniorum. Hinc in fetu & puero multo plus in dato tempore sanguinis per cor circulum obit, quam quidem in adulto homine *z*. Cæterum multum superat natura irritabilis cordium unius ventriculi, & debiliora sunt calidorum animalium corda *a*. Diutius *a** pulsat cor cati quam canis, sed minus diu quam ranæ.

§. VI. *Causæ, quæ irritabilitatem destruunt : in corde potissimum.*

In universum, quæcunque necant, ea putes cordis irritabilitatem aut ipsam destruere, aut certe ita statum hujus musculi vitare, ut motum producere ineptus sit.

Ita agit sulfuris vapor *a*, & nux vomica *a2*; ita morsus viperæ *a3*; ita electrica vis auctior, qualis est in fulgure, & quæ facit, ut cor irritatum non nisi tremores aliquos cieat.

Ita frigus irritabilitatem aufert, etiam adi-

z Robinson on food and discharges p. 13.

a Viperis cor valde irritabile Morgagn. Ep. XV. n. 54.

a Carminati p.9. &c. & pene a fælore putrido.*

a2 Stralsf. Magazin I.

a3 Ricerche sub finem.

pis circumpositi *a4*. Sic nimius fervor, qui post breves tremores quietem facit irrevocabilem *a5*. Sic, ut multa omittam, nimia plenitudo; ad certum enim gradum distenta auris, aut ventriculus cordis, vim irritabilem amittit *a6*. Porro rigor tonicus, ut in universum musculos aliquamdiu ad novas contractiones ineptos reddit, ita & cor ipsum *a7*. Hunc in pullis ultimum cordis statum esse *Caldanus* adnotavit *a8*,

Sed potissimum ipsa contractio vim irritabilem exhaurit. Accuratus propria experimenta contemplati Cl. viri invenerunt, in frigidis etiam potissimum animalibus, unam irritationem *a9* unam contractionem ciere: mallet ego *a10* ad mea pericula aliquot contractiones. Verum Ill. viri docent, succedere, etiam præsente stimulo, quietem *a11*, & videri, irritabilem vim reparari debere, & sensim quasi accumulari *a12*, quoad in novam contractionem perfici possit: ita ex quiete cor sponte videri ad motum redire, quod in ranis frequenter vidi *a13*. Junioribus animalibus eam vim celerius reparari *a14*.

a4 p. 397.

a5 p. 400.

a6 Sw. Wet. Acad. 1764. trim. 4.

a7 In experimentis *Caldan. riflesf.* p. 241. 243. 249. *Fontana leg. irritab. diff. II.*

a8 *Rifless.* p. 283.

a9 *Caldan. riflesf.* p. 249. *Fontan. leg.* p. 13.

a10 Id. p. 14. *Caldan. ib. subinde.*

a11 *Fontan. ib.*

a12 *Idem ricerch.* p. 129.

a13 *Fontan.* p. 10.

a14 *Fontan.*

§. VII. *Ea vis non excitetur a nervis.*

Sed redeundum est ad phænomena, quæ ostendunt, motum cordis aliam a nervis causam habere. Rejicit undique *Fontana*, ut in nervis non solum non sit efficax causa motus cordis, quod ostensum est *a15*, sed ne excitans quidem. Neque enim in ratione vis irritabilis esse effectum, levemque stimulum, qualis est in aëre adflato, cor melius ad motum excitare, quam graves acrimonias; pressamque vehementissime cutem vix sensum sui facere, cum titillatio animam pene ad desperationem agat *a16*. Frequentissimum nempe est & vulgatissimum, cordis motum in animalibus superesse, quo tempore nullus sensus *b* exercetur, neque ad ullum dolorem, ullamve irritationem, animal se movet: & idem motus renovari potest tot a morte horis diebusve, ut omnino genus nerveum totum siccum, callosum, inmeabile & inutile esse necesse sit. Ita in serpente quarto die motus cordis revocari potuit *c*, & cor catuli cæsarei altero adhuc die pulsavit *d*, ut alia exempla, jam citata, supersedeamus repetere *e*. Adparet adeo, cum in his phænomenis causa motus, quæ a nervis advenit, a corde omnino absit, aliam superesse efficecem ejus motus

a15 p. 384. seqq.

a16 *Ricerche* p. 88. 89. de spiritu animali, sed de nervis perinde verum est.

b *Exp.* 472. 473. 496.

c *Muralt colleg. colleg.* p.

321.

d *Hooke* apud *Birch hist. of the Royal soc.* T. II. p. 184.

e n. 14.

causam. Neque hic ullum in objectione robur est; in experimentis, paucis equidem, tamen certis, cor irritabilem naturam deposuisse, quo tempore musculi, & œsophagus, & ventriculus vim insitam & impatientiam stimuli demonstrabant. Id enim phænomenon, quod ego quidem nunquam vidi, frigido aëri tribuo, qui cor in aperto pectore nudatum percusserit, dum clauso in abdomine, velatisque per cutem & adipem musculis, calor aliquis superfuit: frigidum enim cor, & adipe coacto tectum, utique ad motum ineptum est.

Accuratus denique hæc a nervea vi diversa cordis potentia adparet ex iis exemplis, in quibus cor penitus de corpore evulsum, ab omni cum cerebro commercio remotum, nervis destructis, tamen bono ordine & perenni motu micavit. In frigidis, & unicum cordis ventriculum habentibus, animalibus hæc experimenta optime instituuntur, quibus & in universum vis irritabilis perennior insidet, & visceribus exemptis vita toto die & ultra superest *f*, & causa, quæ periculosos morsus diu a morte infligit *g*, & demum cor inprimis pertinacius mobile est *h*.

Dudum *Cleonthes* *i* cor animantis evulsum miris modis palpitare, ut ignem imitetur,

f Severin viper. pythia p. 118. 119. Charas de theriaca &c. p. 6. 43.
g Alibi de viperis ostenditur, *h* Lister de humoribus c. 2. *i* Apud Ciceronem de Natura Deor. L. 11. p. 561.

scriptum reliquit. Ranæ cor evulsum, plusculis horis perfecta systole & diastole pergit agitari *k*, & perinde etiam sola auris alternum contractionis & laxationis rhythmum observat, si solum in corpore relictum fuerit *l*.

In salmone 24 horis *m* cor evulsum pulsatur: in cane pisce non tribus solum aut quatuor *n* horis, sed ad alteram omnino diem *o*. Pertinax etiam in pisce carassio *p*, in sturione *p*^{*}, & in universum in piscibus *q* cordis est mobilitas. Torpedini tribus *r*, & octo demum, & novem horis *s*, & decem, cor evulsum pulsatur *t*. Anguillæ cor evulsum *v* ipse per integram horam pulsasse vidi, trihorio Woodward *x*, sex horis Antonius v. Leeuwenhoeck *y*; & pluribus a morte horis *z*, aut motum suum continuasse, aut certe potuisse suscitari, alii clari viri,

k Borrichius apud Bartholinum Epist. 76. Centur. IV. p. 447. Colleg. privat. Amstelod. obs. p. 29. (corde ligato) Bagliv. anat. fibr. p. 401. Browne Langrish l. c. p. 21. Zimmehmann l. c. p. 55. 56. 57. Whytt l. c. p. 349. Second Memoir. sur les part. sensibl. & irritabl. Exp. 479. 480.

l Exp. 579. 480.

m Arn. Montanus in legatione Chinenfi.

n Lettres edifiantes & curieuses T. XV. p. 342.

o Merolla in histoir. gener. des voyages L. XII.

p Zimmermann p. 55.

p^{*} Andrioli febr. p. 72.

q Rudbek insid. struct. p. 67. Ducenties pulsare & trecenties

r Redi esperienze p. 29.

s Lorenzini anatomy of the Crampfish. p. 58.

t Lister de humor. p. 38.

v Exp. 525. Conf. Woodward suppl. p. 80. seqq. Bradley mater med. p. 151. Frank satyr. medic. VIII. p.

148. Boyle Phil. Trans. n. 62. Harvei l. c. p. 41. Peyer

apud Muralt p. 385.

x Phil. Trans. n. 319.

y Supplem. p. 80.

z Lower l. c. p. 46. Lister l. c.

quadragenis *Caldan* *z*^{*}. Testudinis corevulsum duodecim *a*, & lucii *a*^{*}, tum octodecim *b*, & triginta *c* horis moveri pergit. Serpenti *d* viperæve horis duabus, tribus, quatuor *e*, sex *f*, duodecim *g*, viginti quatuor *h*, quinquaginta *i* aut multis *k* in universum horis pulsus superest, & tertio quartove die, natura cordis irritabilis persistit *l*, ut stimulatam ad pulsus redeat. Salamandræ aquaticæ ad octo & novem horas cor micat. In rana eadem ad pulsandum constantia in corde notissima residet *m*. Solebat in nostris experimentis mane factis multam in noctem a cordis micatio superesse, ut altero demum mane siccum jam cor irritabilem naturam deposuisset. Similes de cochlea *n*, deque pectine *o* exstant clarorum virorum observationes.

- z*^{*} *Risless*. p. 70.
a *Ligon* journey to Barbados p. 72. *Ovington* voyage de Suratte T. II. p. 2.
a^{*} *Valeriol* loc. comm. I. c. 15.
b *Oexmelin* l. c. ni fallor, neque enim ad manus est.
c *Caldesi* p. 66.
d *Conf. Woodward* l. c. p. 87. seqq. *Morgagni* *Epist. Anat.* XV. n. 54.
e *Severin* *viper. pyth.* p. 118. 119. 261. *Peyer* *obs.* 43.
f *Phil. Transact.* n. 466.
g *Bagliv.* in *viperis de fibra motrice principio*.
h *Charas de theriaca* p. 43.
i *Fabricius* p. 210.
k *Charas de la vipere* p. 6. *Charleton three lectures* p. 79. in tepida.
l *Muralt* *colleg. anat.* p. 321.
m *Observ. colleg. priv. Amst.* p. 29. *Chirac. advers.* p. 122.
n *Baker microscope made easy* p. 138. Duodecim horis pulsat *Lister de cochlea* p. 38. 39.
o *Boyle de utilit. philos. experim.* p. 122.

Etiamſi aliquanto minor in animalibus calidi ſanguinis conſtantia eſt, atque cor refrigeratum fere quieſcit, quam primum adeps coactus obrigit: non deſunt tamen experimenta, in quibus cor de corpore revulſum aliquamdiu pulſavit, aque quiete ad motum irritatione aliqua revocari potuit. Id in mureviſum *p*, in erinaceo *q*, cui bihorio & ultra cor de corde remotum alterna tripudia *r* continuavit, inque ſele *s*, etiam meo experimento. Sed etiam in canis corde *t* numerosas contractions & laxationes alii *v* viderunt, & humaniſſimus vir *Urbanus Toſetti* cor 7 minutis *x* & ultra, & demum 26 minutis cum quadraginta ſecundis *y* pulſaſſe vidit, Cl. vero vir *Johannes Oſterdyck Schacht* omnino triginta minutis *z*. Similes de corvo *a*, deque pullo gallinaceo *b* obſervationes reperiuntur, & in iſto quidem tenero animalculo multarum horarum conſtantiam ſæpe ſum admiratus, quam olim angli philoſophi quatuor horis ſuperfuiſſe viderunt. Sed in hominis denique, omnibus animalibus teneriori genere, cor proditoris evulſum, inque ignem projectum, primo ſaltu ad ſeſcuncem

p Zimmermann p. 56.

q J. Jac. Peyer obſ. p. 81.

r Templer Philoſ. Tranſ. n. 93.

s Woodward ſupplem. p. 77.

Zimmermann p. 57.

t Schneider de corde p. 37. (cum ligatum & inflatum eſſet) *Enſ* l. c. n. 14. *Mafſini* II, eſp. 11.

v Pecquet diff. p. 5.

x Lettera II. *Eſper*. 17. ad duodecimum minutum primum moveri pergit, quando irritando ſuſcitatum fuit.

y Letter II. *Eſper*. 16.

z Diff. de mot. muſcul. p. 54.

a Peyer obſ. p. 47.

b Whytt p. 352.

exsiluit, deinde sensim ad minorem altitudinem, per octo tamen horæ minuta prima motum aliquem conservavit, ex oculati & clarissimi testis *Francisci Bacon* c observatione. Non recufabo evulsum citius quiescere, quam suo loco relictum c*.

Denique, vis irritabilis adeo profunde naturæ cordis insidet, ut etiam solitariæ particulæ dissecti muscoli seorsim moveantur, & alterne & constringantur & laxentur. Testium d abunde est in anguilla e, torpedine f, fele g, cane rana g*, aliisque animalibus, & ipse in musculo papillari ventriculi dextri aliisque cordis particulis similia vidi. Inter coquorum manus de sartagine, in qua frangebatur, cor salmonis exsiliiit *Houttuyn*.

Iterum ex his phænomenis liquet, cordis motum naturalem & alternum quidem, exque contractionis & relaxationis vicibus compositum, superesse, quando nullus a cerebro ad cor spirituum commeatus superest, quando nulla sensationis in cordis superstitis suspicio remanet; adde in iis animalibus rhythmos cordis legitimos continuari, in quibus neque caput, neque cerebrum, neque nervea fibra certa fide

c *Hist. vit. & mort.* p. 390.

c* *Massimi* ll. p. 7.

d *Harvei* p. 27. 41. *Lower* p. 46. *Waleus Epist.* I. p.

403. *Drelincourt canicid.* p. 7.

Bagliv. de fibr. motr. p. 7.

e *Harvei* p. 41. *Morland on the force of the heart* p. 67.

f *Lorenzini crampfish* p. 58.

g *Tosetti letter.* ll. *Esper.* 22.

g* *Trabucchi respir.* p. 106.

demonstrata fuit, ut in vermium acephalorum genere.

§. VIII. *Quæ causa sit perennis & constantis in corde motus.*

Sequitur, ut in eam latentem causam cordis inquiramus. Poscitur autem ejusmodi causa, quæ faciat, ut cor magis, quam ullus alius musculus sui motus tenax sit: ut alternas vices contractionis & laxationis perenniter sibi succedentes observet: ut in somno, & in apoplexia, & in submersis aut strangulatis, pergat eas vices sequi, quando animal nullum sensus, nullum alterius motus exemplum edit, aliquot nempe a morte apparente horis. Eadem, si eam detexeris, causa videtur etiam revelatura, quare adeo magna ratione omnium aliorum musculorum vim cor superet.

§. IX. *An ignis innatus.*

Unico verbo tangemus antiquatam opinionem, ignem in corde innatum residere *b*: invisibilem equidem, cum tenuis lucula aperto animale continuo exstinguatur *i*. Olim *Aristoteles* pulsum cordis fieri scripsit a calore, qui sanguinem elevet, & alternis vicibus subsideat. Deinde *Cartesius* ab eo igne aiebat, sanguinis ex dextra auricula in ventriculum illapsi

b Hippocr. de dieta L. I.

i Ent. Apolog. p. 204.

guttulam rarefieri *k*, ut spumæ ad modum de fervida aqua exuberantis, in apertam arteriam effluat: ita in cor inane secundam guttulam sanguinis illabi, & pariter effervesce, & dilatari, atque eo modo ab igne innato, & a sanguine, cordis motum nasci. Hanc hypothesein caloris natura refutat, qui frustra cordis hospes nullis limitibus includi posset, quin in ambitum diffusus evanesceret: & sanguinis ex corde exitus, qui contracto corde fit, dum arctissimi sunt ventriculi; & frigidorum animalium vivida corcula, & aliæ abunde rationes.

Fermentatione aliqua cordis motum continuari equidem *Newtoni* fuit conjectura, quam omittimus: neque *Sylvii* theoriâ pluribus refellemus, clari viri, nimis autem soliti ab effervescentia omnes animalium motus deducere. Ergo a sanguine vetusto, indigena, alcalescente, & acido chylo, acidaque lymphâ pancreatis fervorem in corde excitari *l* docuit, quæ causa motus in nobilissimo organo sit. Verum dudum, & fuse, hos fervores refutavit *Præceptor* optimus *m*, cum neque bilis lixiviosa sit, neque acida lymphâ, neque conmixtæ confligant, neque in corde conmiscantur.

k *Cartes de format. fet.* p. 236. *de homine* c. 5. ed. n. 58.
l *Diff. VIII. n. 63. diff. X.*
Schuil. Ent. apolog. p. 93. *m* *Inst. rei med.* in cap. H. *Regius. Craanen. Darti-*
guelongue apograph. p. 47. *de circulat sang.*

§. X. *Num dentur nervi peculiariter vitales.*

Multo subtilius *Willisii* n systema fuit, & multo plures & constantiores plausus consecutum est. Et motum quidem cordis in universum, perinde ut in aliis musculis, a nervis deduxit: deinde nervorum duplex fecit satellitium. Eorum prius animæ nutus exsequi, adque musculos, quos voluntas regit, mentis imperia causamque motus adferre, & vicissim ad animam eas impressiones reddere scripsit, quas organa sensuum externorum a circumpositis corporibus passa essent; id nunc genus nervorum a cerebro majori solo oriri, atque ejus conditionis esse posuit, ut minus perpetuo operetur. *Idem* docuit, quid cerebrum a cerebello distinguat: varietate nempe plicarum, fabricæ in aliis & aliis animalibus diversitate cerebrum differre: cerebellum vero simplicius, in omnibus animalium generibus sui simile a natura factum esse. Addebat *Idem*, nervos cordis, partiumque nullius alternæ quietis indigarum, manifesto a cerebello oriri: calamitates, quæ posteriorem partem capitis adfligunt, vitam gravius lædere, animi deliquia facere, & cerebelli vulnera læsiones cerebri periculo superare; quod argumentum a recentioribus physiologis ita ornatum est, ut subitarum mortium exempla producere soleant, quæ post ejus cerebelli vulnera

nera fecutæ sint. Eorum aliqua repetemus. Verum rationes Cl. viri, & ad seclas ejus late patentis opinionis, & nostras, quæ fecerunt, ne in ea parte manerem, dicam libro X.

§. XI. *Neque aliæ hypotheses experimentis respondent.*

Quæ vero Ill. *Lancisius* proposuit, & alter vir clar. ea omnia a tota anatome dissident. Et ganglia quidem non in vitalibus nervis, a medulla spinali natis, solis reperiuntur: alia exstant, minus quidem nota, in nervis sensui & arbitrario motu famulantibus: in ophthalmico nempe plexu ex tertio pare *b* & prima quinti propagine coalescente, in secundo quinti paris ramo *c* atque sphenomaxillari rima, in ramis denique a tertio ramo quinti paris oriundis, inque maxillari glandula *d*.

Contra etsi vitalium nervorum plexus utique frequentes reperiuntur, non ideo nulli sunt in nervis animæ servientibus. Notissimi sunt, & maximi, plexus nervorum ischiadicorum, cruralium, brachialium; deinde minus noti, & mire tamen intricati, plexus nervorum pharyngeorum, & durorum a septimo pare natorum, cum quaque quinti propaginum coalescentium.

b Depictum dedi in icone 74. *d* Idem vir Ill. *Memoire*
baseos cranii, Fascic. Icon. I. & in *Fascic. VII. t. I.* de l'Acad. des scienc. de Ber-
c Ill. *Mekel* l. c. T. I. n. lin. 1750.

Sed ab aliis etiam causis hanc vitalium motuum perennitatem alii derivarunt. Et insignis olim profector *Johannes Swammerdam* e ad eam prærogativam sufficere docuit, quod vitales muscoli antagonists, quos vocant, destituantur: ita fieri sibi persuasit, ut ejusmodi muscoli a minori spirituum penu moveantur, quam animales illi, quibus alii muscoli contrarii obnituntur. Eam interpretationem recipit *Archibaldus Pitcairn* f, & *Joh. Freind* g.

Iterum anatome non finit hæc vera esse. Vitales enim muscoli aliqui movenda pondera, aut elateres sibi obpositos, nacti sunt, cordis exemplo, aut intercostalium musculorum, si ii vitales sunt: alii omnino veros musculos sibi contrarios acceperunt; uti fibræ intestinorum anulares & rectæ. Sed etiam inter animales musculos sunt, quibus non alius laceratus resistit. Erectores, qui vocantur, penis, a sensu certe gubernati, nullum elevatorem contrarium habent: musculus stapedis unicus est, neque adeo adversarium agnoscit.

Iterum aliter vir olim eleganter doctus *J. Godofredus de Berger* h, cum in organis vitalibus fibras spirales & concatenatas deprehenderet, eas cum iis machinis comparavit, in quibus multæ rotæ dentatæ se invicem impellunt: immemor nempe musculorum respira-

e *De respirat.* p. 65.

f *De circul. sang. in anim. gentl. & non genitis* p. 128. Edit. Edimb.

g *In histor. medic. ad Guilielmum de Saliceto* p. 311. edit. Parisinæ ann. 1735.

h *De natur. human.* p. 305.

tioni dicatorum, & transversi imprimis septi, in quibus nihil quidquam reperitur, quod a communi musculorum, voluntati obnoxiorum, fabrica diffideat.

Aliquanto subtilius Ill. Archiater Russicus *Johannes de Gorter* *i* fibris omnibus vasorum *k*, viscerum *l*, & muscalorum vitalium, cordis adeo & pulmonis *m*, & ossium *n* denique, motum vitalem inesse docuit, irritabilem nempe naturam, *Stahliive tonum*, Deinde conjecturam proposuit: & alternam perpetuamque in motu constantiam nasci suspicatus est, quoties fibra contracta nervum suum comprimit, atque adeo musculoform villorum contractio sibi ipsi vim nervosam subripit, a qua efficacia musculorum pendet. Contra relaxata fibra nervo libertatem reddit *o*, qui paulo post musculum in priorem contractionem ciet.

Verum etiam in hac hypothese vir Ill. nimis latum imperium naturæ irritabili dedit, quod unice fibræ musculosæ *Natura* concessit, & omni alteri sive fibræ, sive particulæ animali, id privilegium negavit. Eam enim legem per experimenta mea confirmatam esse persuadeor. Deinde alterna illa fibrarum nervorumque actio phænomenis repugnat. Quoties enim quicumque musculus in opere suo versatur, toties utique & fibræ contrahuntur,

i In *Exercit de motu vitali*. *m* n. 70.
k n. 60. 65. 66. 67. 73. *n* n. 71.
l n. 60. 61. 68, 69. *o* n. 39.

& nervi una vim suam in musculo exercent. Non ergo alterna tempora sunt, quibus fibræ vis contractilis exercetur, nervorumque efficacia. Denique, si omnino ab hac nervorum compressione, quam a fibris carneis patiuntur, alterna lecerorum quis in corde oritur, nihil video discriminis, cur non omnes alii in corpore animali musculi alterno motu perpetuo regantur. Omnibus enim eadem natura est, & pariter fibræ contrahuntur, & omnibus nervi sunt. Oportet, in hypothesi, nervos in corde vitalibusque organis a fibris comprimi: in voluntariis lacertis ab ea compressione liberos esse. Nulla vero in fabrica diversitas producitur, quæ nervos in corde fibrarum contractioni subjiciat, in aliis vero organis subtrahat.

§. XII. *Neque Stahlianæ animæ potestas.*

Supereſt, ut *Stahlianæ* theoriam breviter tangam, qui uno ensis ictu omnem difficultatem amputat: breviter tamen, cum de tota viri opinione alibi *q* ornatius sermonem faciam, quæ omnis in animalibus motus causam ab anima derivat *r*. Ergo non minus cordis mo-

q L. de motu muscutorum. *toucher* T. II. p. 547. 548. *du*
r Vetiustior equidem hujus *mouvement des yeux* T. II. p.
sententiæ origo est. Reperitur 587. 588. *du bruit* T. III. p.
adud *Swammerdamium* in *bibl.* 271. Habet autem *Stahlius* de
natur. de ranis T. II. p. 844. *motu tonico vitali* p. 30. 37.
Borellum de mot. anim. L. II. & in *theoria medica* p. 260.
Prop. 80. Cl. *Perrault* du 567. &c. Inde *J. Tabor*. Cl.

tum voluntarium facit, quam manus pedisve, hoc quidem cum discrimine, quod continuo dicam. Motuum vitalium perpetua est necessitas; intelligit ergo anima, nisi sanguinem ex diversis elementis compositum in putredinem labi velit, incumbere sibi, ut motum sanguinis urgeat, a quo solo putredo impediatur. Ergo etiam in somno cor pulsat; somnus enim ex arbitrio animæ irrepit, quod mens benigna, corpus suum alterna egere requie, minus necessarios motus aliquamdiu suspendat, necessarios interim pergat suppeditare. Eodem modo in apoplecticis anima sensus & voluntarios motus suspendit, ut vires suas omnes pro necessariis actionibus reservet *t*.

Solent sectatores Cl. viri arbitrariam motus in corde causam testimonio confirmare. Cochleam citant, & mytulum & gaganum in quibus cor modo moveatur, modo quiescat, ut ex arbitrio animalis ejus motus pendere videatur. Rotiferum animal *t** cor habere voluntate abnoxium Cl. viri conjectura fuit, quod tamdiu ageret, quamdiu rota animalculi in gyrum circumiret. Sed id cor alii accurati vivi pro ventriculo habent. Aiunt etiam militarem virum *v*, non quidem diu ante veram mor-

Porterfields, R. Whytt, F. hemiplegia.

de Sauvages, & alii similia docuerunt.

s Theor. Med. p. 437. Nenter physiolog. c. 10. p. 316. Junker &c.

t Sauvages vel Deshais de

t Fontana ricerche p. 98.*

v Colon. Townshend apud

Georgium Cheyne english lady p. 307. Porterfields Essays of a society at Edimburgh.

T. IV. p. 222. &c.

tem, sola suæ voluntatis efficacia cordi suo quietem induxisse, lethumque simulasse. Sunt etiam, qui huc revocent intervalla inter cordis pulsationes, sæpe in languente animale observata α : ab iis enim credunt recte se repetere, pro arbitrio suo animam & quietem cordi suo permittere, & vicissim idem ad motum revocare γ .

Satis intelligitur, mechanicæ sectæ fautores contraria, & facile obvia experimenta obponere; nullo nempe animæ imperio aut accelerari pulsum, aut retardari; mentem humanam nullius in cor imperii sibi consciam esse, cum suum in artus suos dominium minime ignoret; eandem ignaram esse motus cordis sui, nisi manu imposita pulsationem percipiat, aut ab aliis discat, musculus esse, qui sibi sub papilla saliat. Verum ad has quidem objectiones abunde est excusationum, quas Clari viri proferunt. Omnes nempe motus corporis animati in prima origine voluntarios fuisse: eorum aliquos, quod perpetuo repeterentur, per consuetudinem eum in mente actum reflexum amisisse α , quem *conscientiam* vocamus. Quare etiam alibi motus musculares omnium consensu, arbitrio reguntur, & tamen absque con-

α Quæ nonnunquam sint animali rotifero observatur
15 & 24 demum minutorum Baker employment for the mi-
M. Lister de cochleis p. 13. *serocope* p. 280.

38. 39. α *Ridley of the brain* p.

γ *Lister l. c. p. 14. &c. 163. Porterfields l. c. p. 214.*
Whytt on vital motions p. 215. 216. *Bond of the nigh-*
366. *Idem phenomenon in mare* p. 70. &c,

scientia animæ pergunt produci, exemplo nictantium palpebrarum. Alia etiam subtiliora producunt de animæ cognitione, qua viscera sua & proprium corpus intellectu puro percipit, sibi que repræsentat absque ratiocinio: deque reflexo illo actu, quo objecta extra se posita, cum conscientia suæ sensationis, animæ adparent *a*.

Experimenta in quoque cochlea & in buccino facta non demonstrant, a voluntate motum cordis pendere, qui ex defectu stimuli cessare & cum stimulo reparato renasci queat.

Nuperiores *Stahliani* hætenus a prioribus hujus sectæ patronis recedunt, ut consilium & rectricem sapientiam animæ negent, cæterum menti sensum relinquant incommodi, atque ex eo sensu natam contractionem fibræ motricis, qua simplicissima actione tota vita constet. Huc inprimis *Robertus Whytt* referri meretur *b*, parum a nobis diversus, nisi quod irritabilitatem cum sensu jungat, eamque vim non a corporis aliqua proprietate, sed ab anima derivet, quæ ab incommodo percepto se, contracta fibra, vindicet.

Ego vero *Stahl*i theoriam sæpe meditatus, non ideo non amplector, quod contraria hypothesis in *Boerhaavii* schola juvenis me passus sim imbui. Satis enim multis exemplis osten-

a Stahl Theor. Med. p. 266. Junker conspect. Physiolog. p. 126. seqq. *b In utroque opere on vital motions, & physiological essay.*

di, favorem *Præceptoris*, post quinquaginta a vita mea Leidenſi annos, non me retinere, quoties veri vox & naturæ alio me avocat. Hic autem experimenta mea non ſi-
nunt me *Stahlii* ſententiam amplecti.

Et primum evidentiffima cordis ab acri me-
chanico aut chemico irritati mobilitas corpo-
reum potius ſtimulum, quam quidem ab ani-
ma pendentem entelechiam, cor in motum
ciere ſuadet. Num quietum etiam cor, a fa-
le adſperſo, aut a qualicunque irritatione ad
motum redit, etiam exemptum, aque omni
animæ auxilio remotum *c.* Porro metaphyſi-
ca illa *Cl.* viri expoſitio non adſignat cauſam
corpoream, quare organa vitalia, & cor in-
primis, perpetuo alterno motu magis agiten-
tur, quam quidem alia quævis corporis ani-
mati caro. Procul dubio vero eſt in corde
aliqua propria conditio, ex qua alacritas ad
motum, & infatigabilis conſtantia, pendeat.
Quod enim ſolum inter omnes muſculos,
nulla alterna requie refocillatum, noctu diuque,
tot annis, abſque ulla laſſitudine, aut dolore
ullo, in motu edendo perſtet, cum omnes
alii muſculi, vel ex paucarum horarum motu,
& intenſe doleant, & laſſitudinis ſenſu into-
lerabili opprimantur, id quidem utique a cor-
dis fabrica repetere oportet, non a mentis ali-
quo favore.

Deinde interim monuiſſe ſufficiat, claſſes

musculorum voluntati obnoxiorum, eorumque, qui vitali imperio reguntur, æterna lege fixas esse, neque in ullo homine aut arbitrarium aliquem muscolum in spontaneam classem transivisse, aut vicissim vitalem muscolum in eam migravisse tribum, quæ voluntati obsequitur. Nunquam cor, nunquam ventriculus, nunquam intestina voluntati obedierunt, neque aut pulsus citare datum fuit ulli, aut tardare, aut vomere, aut alvum absque stimulo naturali exonerare, neque quisquam stimuli vim, aut diversitatem indolentiæ alicujus & irritationis, in cordis systole aut diastole, percepit *d*. Qui omnium seculorum unanimi experientiae solus opponitur, is quidem tribunus aut solo decubitu supino *e* pulsus suum languere coegit, aut spiritus tarditate, si omnino aliquid in ea historia veri est. Frustra hic advocatur consuetudo, quæ nunquam classes musculorum a natura definitas turbat. Spiritum ducimus noctu diuque, infinitis alternis vicibus: nemo tamen mortalium facultatem amisit, qua pro arbitrio suo, aut contentius spirare potest, aut vicissim animam suspendere. Palpebrarum regimen nulla centum annorum adeo frequens nictitatio menti eripit, neque desinunt unquam pro arbitrio, aut crebrius contrahi, aut a contractione aliquo tempore

d Shebbeare *præctice* p. 68. phænomeni interpretatio l. c.
e Ea est Cl. Bond, de Stahlianæ sectæ scriptores, miri

temperare. Gladiator *f*, contra eam palpebrarum nictationem, quæ a metu fit, constante animo obnixus, obtinuit, ut inmotis porro oculis, palpebrisque: contra plagas intentatas respiceret. Neque defunt experimenta, ex quibus ostendas, in vitalibus organis consuetudinem illam interrumpi, pluresque horas, diesque intercedere, quibus ne semel quidem ea organa moveantur: & vicissim post insigne intervallum ad motum redeant: non ideo tamen novi hi motus conscientiæ, aut arbitrio mentis subjiciuntur unquam. De alvo per heptomadas, perque menses pigra res notissima est: neque ulli homini, ab ea consuetudinis interruptione, motus peristalticus in satellitium voluntatis transiit. Sic cordis etiam motus a summa debilitate, sanguinis jactura, convulsionibus hystericeis prægressis, submersione sub nive, subve aqua, horis, diebusque, neque paucissimis, penitus subpressus nihilo magis voluntati obedit, quando a quiete ad motum rediit. Innumera exempla collegit Cl. *Brubier g*, pauca ego recensabo. Celeberrimum exemplum est *Card. Espinoza*, qui, cum cadaver balsamo condire adgrederentur, aperto pectore, corde palpitante, vitæ indicia dedit, quem medici, ut culpam tegerent taciti exstinxerunt *g**. Satis simile exemplum habet Cl. *Peu*. Cum enim speculum

f *Porterfields l. c. p. 215.* *g** *Cabrera ap. Brubier ll.*
g *De l'incertitude de la p. 459.*
mort.

nullum halitum demonstraret, neque in corde motus esset, femina se concussit, cum pectus incidere vellent *g***. Post viginti horæ minuta *h*, & post triginta *i*, homo sub aquam demersus, & pulsu destitutus, excitatus est, & simile exemplum hominis, frigore sub aqua pene enecti, artubus rigentibus, pulsu & respiratione nullis, nuper legimus *i**. Hominis, absque pulsu, a carbonum fumo pene suffocati, exemplum habet *Pareus k*, quem euphorbii fumus naribus inflatus excitavit. Cum hominem vulnere, ut credebatur, peremtum, post viginti quatuor horas incidere vellent, ut de natura vulneris cognosceretur, revixit idem *l*. Senator *Marcellus* de sepulchro post biiduum eductus *m*, cum vita reconciliatus fuit. Femina absque pulsu pro mortua habita, multis ab eventu annis vitam *m** redditam conservavit. Apoplecticus, post biiduum, cum chirurgorum scalpellum sibi inmineret, ad se rediit *n*, & convaluit. Femina in foveam cum cadaveribus projecta, inde die quarto extracta, sanata est *o*. Femina die tertio ex sepulchro

*g*** *Peu* p. 334.
h *Mead of poisons* p. 173.
i *Fothergill Philos. Trans.*
n. 475. *Essays of a society at*
Edimburg. T. V. art. 55.
*i** *Naucler Stokh. handling.*
1765. *Trim.* II.
k *De renunciat.* p. 879
oper. omn.
l *G. v. Swieten Comment.*
in Boerb. aphor. p. 235.
m *Blainville itiner.* T. II.
p. 8.
*m** *Hamilton milier.*
n *Zod. Med. Gall. Ann.*
II. p. 264. *Delic. Med. Chi-*
rurg. p. 70.
o *Valentini Chirurg. Med.*
p. 910.

erepta, vitalis *p*. Post septem dierum asphyxiam reconciliata femina *p**. Superfuit alia, quæ octo diebus friguerat, & motu sensuque destituta jacuerat, cum a frictione excitata *q* fuisset. Sepulchro erepta, quæ absque pulsu fuerat *q**. Qui in pugna decem diebus absque refocillatione mansit, tandem per amica auxilia ad vitam rediit *r*. Omitto magis mirificas historias, ut tamen memorabilem illam paucis tangam, hominis nobilis, qui quadraginta sex integris diebus mortui similis funeris apparatus expectavit *s*, & sponte tamen revixit, & convaluit: deinde notissimam illam feminam, quam *apnou* *Empedoclis* *t* tota vetustas celebravit, redivivam, cum triginta diebus absque respiratione, atque adeo absque pulsu vixisset. In mure montano simplicius est experimentum quo tamen perinde nostra sententia confirmatur: in eo enim animale, tum in erinaceo, in hirundine, post multorum mensium quietem frigidum animal & examini proximum, facillime calore reddito cum vita reconciliatur. Fidem certe hujusmodi historiis mirificæ illæ, non chrysalidum solarum diuturnæ absque pulsu vitæ, sed etiam quorundam insectorum exempla faciunt. Nam roti-

p Winslow in diss. quam Cl. Brubier commentario illustravit p. 18.

*p** Valisneri racolt. p. 64.

q Brubier l. c. T. II. p. 500.

*q** Timoni bains des orient. p. 32.

r Apud Platonem de republica.

s Grau Wästmanland p. 257.

t Suidas p. 269. Pausanias nempe, alique veterum, scripserunt peri apnou.

ferum animal v extra aquam ficcatum, pulverisque simile, nullum vitæ signum edit; idemque aqua conspersum continuo vitam latentem explicat, & aquam nactum rota suas producit. Maxime vero memorabile hujus rotiferæ bestiolæ exemplum est, & veræ resuscitationi proximum. Neque enim flaccescit unice, & immotum per duos & per quatuor annos manet, sed omnino exarescit. Deinde anguillæ x viati frumenti, multis annis immobiles in corrupta farina habitant, eademque in aqua macerata subito ad spontaneos motus redeunt. Sic anguillæ in tectorum impluviis habitantes, & animalculum tardigradum, quod de rotiferi adfinitate est x*.

Adparet adeo, cordis motum diu intrrcipi posse, & post longam quietem revocari. Nemo tamen unquam, cum post ejusmodi deliquium novus cordi motus rediret, nullaque consuetudo sensum animæ, aut ejus arbitrium sopiret, nemo unquam in cor suum, arteriasve, arbitrarium imperium sensit, aut exercuit, aut pulsum suum volendo aut retardavit unquam, aut acceleravit. Mansit cordi sua libertas ab animæ imperiis, mansit in anima ad cor regendum eadem impotentia. Frustra objiceret quisquam, de secta adversariorum, obscurum in ejusmodi deliquiis cordis

v Baker l. c. p. 269. ll. Rosfredi ap. Rozier 1775.
 x Idem ibid. p. 254. 255. Janvier. Avril.
 Rachitici Spalanzani Opust. x* Spalanzani ib.

motum fuisse, non quietem: adeo enim perfecta in nonnullis exemplis quies fuit, ut in *Jobi van Meekren* historia etiam putredo extremos artus corripuerit *y*.

§. XIII. *Anima non habitat in corde.*

Denique certum est, animam in capite habitare, a capite autem cor separatum perinde moveri, atque adeo cordis motum non esse ab anima. Certum nempe est, ut interim pauca de multis decerpam, presso cerebro, quacunque de causa, animæ functiones omnes, & conscientiam nostri perire. Certum est contra, nihil fieri ejusmodi, quæcunque demum pars corporis reliqui prematur, secetur, auferatur; quoties vero vita post vulnus cujuscunque visceris artusve superfuit, tunc etiam animæ vim, conscientiam, voluntatem, memoriam superesse. Ita Hispanus miles corde evulso aliquas adhuc voces protulit *z*, precesque evulso corde homo fudit, cujus meminit *Franciscus Bacon a*. Alius facinorosus homo cor, de proprio pectore revulsum, in manu carnificis adversis oculis contemplatus est *b*. Forficulæ caput, avide ventrem proprium devoravit, a corpore separatum *c*. Testudinis avul-

y C. XVII. app.

b Bartholin histor. 15. Cen-

z J. a Costa histor. natur. tur. III.

Ind. L. V. p. 248.

c Cl. Unzer hamburg. Ma-

a Hist. vit. & mort. p. gazin. T. XII. p. 90.

p. 390.

fo corde vivere jam *Aristoteles* vidit, & anguillæ. Limaces, in experimento sæpissime repetito, detruncato capite, & vivunt, & novum cum oculis caput reparant. Inter calida animalia aviculæ, capite celeriter defecto, currunt & pene semihoriorum supervivunt. Rara ista, longe vero vulgatius est, animalia corde evulso, maxime si vasa magna ligata *d* fuerint, gradiri, currere, clamare. Sæpissime ranas vidi *e*, quæ glutunt, sagiunt, pulmonem inflant & deplent, nictant palpebris, inspiciunt, gradiuntur, saliant, voluntario adeo motu reguntur, quando cor evulsum est, & similia exempla passim existant de testudine *f*, salamandra *g*, & torpedine *h*. Neque calidi sanguinis animalia, nostrique similia, absque ea vi sunt, ut clament, incedant, currant denique, corde evulso. Experimenta facta sunt in gallina *i*, cane *k*, fele *l*, tardigrado *Am*, &

d Bourdon descript. anat. Conf. Faber ad Hermandez p. p. 167. 730.

e Second Memoire sur le mouvement du sang Exp. 218. 219. 222. 223. 231. Similia viderunt G. Needham de format. fetu c. 6. Amstelodamenses in Colleg. Anat. Priv. p. 30. J. A. Borellus Prop. 110. Muraltus l. c. p. 592. Borrichius apud Bartholinum Epist. 92. Cent. IV. Cl. de Bremond Mem. de l'Acad. des Scienc. 1740. p. 476. Jacobæus l. c. p. 58. Whytt on vital motions p. 375.

g Hist. natur. des anim. T. II. P. II. p. 199. Ol. Jacobæus p. 120. per aliquot horas.

h Lorenzini in ejus animalis anatome. *i* Ephem. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 132. Heuermann physiolog. p. 210.

k Columbus de re anat. L. XII. p. 261. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 8. obs. 10.

l Jessenius a Jessen anat. Pragensis p. 91. Felis per quindecim minuta cursum continuavit.

m Piso histor. natur. Ind. L. V. p. 322.

f Per quadraginta horas ambulavit apud J. Baptistam Caldest p. 69. & biduo p. 76.

de victimis erepto corde clamantibus auctor est *Galenus n.* A cordis quiete experimenta expulfare *n**.

Si hæc vera sunt, quin autem vera sint, omnino dubitare nequit, fequitur in capite quidem voluntatem, & reliquas animæ proprietates habitare; fequitur contra in corde neque fui confcientiam, neque voluntatem, neque vim fentiendi degere, adeoque neque animam, fi quidem omnes animæ functiones fuperfunt, poftquam cor de animale revulfum eft. Non ergo anima in corde innata fedet, quæ motuum caufa fit, qui a corde exercen-
tur.

Sed neque anima eft, quæ in capite refidens per nervos cordis motum gubernet. Infinita in eum fenfum & aliena funt experimenta, & noftra. Nempe cor falit, & alterni motus, alternæque requiei vices continuat, poftquam caput detruncatum fuit, & nervi adeo refecti, quos de capite cor accipit. Sed etiam de corpore proprio cor evulfum & feparatum, micare non definit. Eadem cordis in motu constantia eft in fetubus acephalis o, quibus iifdem nutritio & humorum vitalium, & cor-
dis

n De Hipp. & Plat. decret. Epift. XX. Hift. de l'Acad. des Scienc. 1701. p. 24. 1704. L. II. c. 7.

*n** Stahl Theor. Mort.

o Pauca exempla de multis 6. Memoir. de l'Acad. 1741. repeto: hiftorias nempe Mor- la Motte traité des accouche- gigni in Adverf. II. p. 22. mens obf. 353.

dis motus, absque capitis inperio superfuit. Sunt autem, de truncato capite, exempla in musca *p*, crabrone *q*, ape *r*, locusta *s*, scarabeo *s**: in rana *t*, testudine *v*, serpente *x*, & lacerto *y*: in gallo, columba *a*, & in variis avibus *a**; in fele, cui certe totum encephalon destructum fuit *b*, inque cane *o*. De evulso & dissecto corde alibi experimenta pro-

p Volat capite detracto *Bo-rell. L. II. Prop. 112.* & feminam comprimit *Boyle de utilit. philos. experim. p. 116.* ed. Lind.

q Vita per horam superest *Purchas of bees p. 186.*

r *Act. Francof. T. I. p. 385.*

s Remoto capite corpus diu salit *Purchas p. 185.* Conf. *Kundmann de locust. I. p. 26.* Mantis truncum resecto capite convaluisse, & quinque mensibus supervixisse, auctor est *Redus degli insetti p. 81.*

*s** Per quinque dies *Physique des corps animés p. 254.*

t *Caldan. ep. ad nos.* Evulso cerebro ranæ cor per septuaginta minuta pulsavit *Tosetti Lettera 2. esp. 19.* Conf. de truncato capite experimenta *Zimmermanni disp. de irritabilit. p. 29. 30.* *Kaauw de impet. fac. & mea 479. 480.*

v Totis sex mensibus cor pulsavit, postquam caput detruncatum fuerat *Redi degli animal viv. p. 83.* *Caldesi p. 75.* Confer similia exempla

apud *Cardanum de subtilit. p. 281.* *Joh. Ovington voyage de Surate T. II. p. 220.* *Jacobæum de ranis p. 103.* *R. Whytt on vital motions p. 387.* *Birch history of the Royal Society T. II. p. 102.*

x *Woodward supplement. p. 82. 86. 87.*

y Capite eliso cordis pulsus superest *Tachard voyage de Siam T. II. p. 25.*

z Galli, post caput recisum, cor aliquot minutis salit *Tosetti l. c. esp. 24.* Incedit gallus capite defecto *Saar itiner. p. 58.* *Jacobæus l. c. p. 58.* Celebre experimentum idem est *Ill. Albini*, in anseris factum, amputato capite progressio.

a Columba avulso encephalo per sex horas supervixit *Woodward supplem. p. 60.*

*a** Aves defecto capite incedunt *Ent p. 513. oper. omn. Conf. Kaauw imp. fac. n. 331.*

b *Exp. 154.*

c Catellis capite truncatis cor pergit salire *J. J. Wepfer de sicut. aquat. p. 90.*

duximus: atque adeo manifestissime constat, in plurimis animalibus causam motus cordi a capite non advenire.

Si neque in corde anima habitat, quæ causa motus sit, ab hoc musculo exerciti, neque in capite residens ad cor vim motricem mittit, superest, ut error sit in *Stablii* hypothese, qui cor ab anima statuit moveri.

Non oportet dissimulasse, *Robertum Whytt* ad hæc nostra experimenta hæcenus respondisse. Nempe animam divisibilem fecit, ut & anima in corpore & in cerebro supersit, & tamen eadem anima etiam cor, aliave de corpore resecta organa, pergat imperio suo animare *d.* Non admittit tamen ullam de corporea animæ natura suspensionem.

Alio etiam modo & *Ipsæ e*, & alius vir *Clar. f.* principium vitale, sive animum, aliquot ab horis cum corpore conjunctum superesse statuit, ut omnino sensus aliquis in animale sit, quod nobis mortuum videtur, aque eo sensu motus illi post mortem superstitēs possint derivari *g.*

Potuisset vir *Cl.* utique, non absque aliorum scriptorum, hoc quidem ævo, consensu, corpoream animam admisisse, ferrique patientem, & dissecabilem. Verum neque ea tamen opinio phænomenis respondet. In corde nempe, in pede, in brachio, de corpore meo resecto,

d l. c. p. 383.
e l. c. p. 377.

f Ill. *Senac* l. c. p. 315.
g *Whytt* l. c. p. 363.

irritabilis natura aliquamdiu superest, & correptis earum partium nervis, irritatione adhibita, brachii pedisve quicunque musculus contremiscit. Verum satis certus sum, nihil de mea anima decessisse, quod eum pedem idve brachium animet *b*. Nam voluntas & intellectus & memoria mea integræ supersunt, nullaque pars mei nunc in eo digito est, cum neque animæ meæ in capite residenti quidquam decesserit, neque eadem ullam injuriam percipiat, quam is pes, idve brachium patitur. Non sentio ego hunc resectum pedem, non moveo, & tamen convulsis nervis movetur idem, motus adeo musculorum non est ab anima, qui eos artus regunt. Quod de aliis musculis, idem de corde verum est, quod perinde ostensum sit, solum motum suum conservare, dum interim voluntas, & sui conscientia, in capite superest *i*.

Ad priorem objectionem eadem responsio valet. Si enim in musculo, de corpore resecto, nullus sensus est, & tamen irritationem motus sequitur, oportet, aliam præter animam causam esse, quæ musculos in motum cieat. Si ea vero causa in brachio, in pede, in corde alia ab anima est, non ab anima ii motus derivandi sunt, quos in nuper mortuo animale perfici videmus. Deinde totas pro-

b *Memoir. sur l'irritabilité* i p. 430. seq.
p. 51. 52.

vincias irritabilitatis & fenfilitatis diverfas effe dudum oftendimus.

§. XIV. *Sufficit major cordis irritabilitas.*

Si nihil in tot hypothefibus firmi eft, quas expendimus, defiderabitur a nobis, ut melora pro rejectis fuppleamus. Ergo mihi quidem fimpliciffima caufa perennitatis in motu cordis effe videtur, quod & perpetuo irritetur, & omni alio musculo magis fit. irritabile, atque adeo omnino quiefcere non poffit.

Et primo per experimenta oftendimus, fuper omnes voluntarios mufculos & cor irritabile *k* effe, & inteflina; & hæc quidem in calidis animalibus fuperare, in frigidis vero beftiolis cordis ad motum constantiam evidenter vincere *l*, & vel fponfe cor moveri, vel ad motum certe additio aliquo ftimulo revocari poffe. Deinde in pullo incubato nullam adhuc inteftinorum vim irritabilem videri, quando dudum in corde manifefiffima fuit. Nuper vir Ill. hanc cordis prærogativam reject, cum & diaphragma & inteflina perpetuo motu exerceantur *k**. Verum directe oftendemus, irritabilitatem cordis in frigidis animalibus majorem, constantiorem effe, præcociorem denique, ut immenfum mufculorum privilegium fuperet. Sed & in calido pullo

k p. 395. feq. 373.
l Ibid.

*k** Fontana ricerche p. 151.
161.

manifesto cor ante musculos movetur, & omnibus denique carnibus constantius. Intestina enim non perpetuo, sed per intervalla motu peristaltico agitantur, quem adeo longa quietis intervalla interrumpunt, ut Cl. viri negaverint, omnino eo motu gaudere. Diaphragmatis privilegium ad cordis privilegium proxime accedit, multo tamen lentius, & quadruplo longioribus intervallis agit, & certis in occasionibus quiescit, ut in graviditate, & universum in feminis, quæ pectore magis respirant. Denique diaphragma soli classi animalium quadrupedi datum, non potest cum corde comparari, quod in animalibus vegetum adsit, quibus nullum aut immotum membranaceum septum sit, quale in avibus est, & in piscibus.

Si curiosus vero requisiveris, cur a stimulo magis cor, quam alius musculus moveatur, nihil respondebunt alii, nisi phænomenon: alii hypothesin offerent. A cochleata cordis fabrica pertinaciam in motu, optime sibi perspectam, deduxit *Johannes Muraltus m*: fibras ramosas *n* cordis alii huc revocarunt: sanguinem post mortem in coronarias arterias ab ipsa aortæ contractione impulsam *Kaauwius o*, nervos cordis ex peculiari aliqua prærogativa magis sensiles *Robertus Whytt p*, aut ita

m *Vademec. anat.* p. 451.

n p. 351.

o Hinc calidum manere,

quando reliqui musculi frigent *impet. fac.* n. 758.

p l. c. p. 316.

factos, ut in eos liquor nervosus facilius influat, *Johannes Fantonus q.*

Ego quidem neque in corde, neque per intestinorum membranam, nervos numerosiores reperio, quam quidem ad musculos ire solent, & superat certe nervorum copia lingua, oculus, aliæque carnes pro suæ molis portione. Molles sunt & equidem cordis nervi, ut possis pro magis medullosis habere, quod enim duros reddit, cellulosa tela est, accessoria ea, nulliusque sensus. Verum molles etiam nervi sunt, qui per metacarpum ad ad musculos interosseos repunt; molles, qui arterias a carotide natas percurrunt: neque inde vim sensilem aut irritabilem majorem arguas, molles enim unice sunt, quia profundi, multaque aliarum nobilium partium animalis tutela defensi: neque denique molles sunt, qui summe irritabilia intestina adeunt. Sed omnino per experimenta innotuit, cordis tacti sensum obtusum esse s. Insensile reppererunt in expe-

q l. c. p. 131.

r Res vera est, quam suo loco oblitus sum proponere. Molles sunt ii nervi omnes, qui per magnas arterias adveniunt.

s *Octavius Saviolus lucubrat.* p. 36. 37. *Harvei de generatione anim.* p. 157. ad experimentum in vivo homine factum, tum *Cl. Louis. Fontana ricerch* p. 158. 159. Qui nuper *Harveium* impugnavit *Robertus Whytt*, & insensi-

bilitatem perceptam ad carnem fungosam cor ambeuntem retulit, is non fuit memor, quam acriter intra ejusmodi tumores testis sentiat. Ego qui palpitationibus cordis & pulsui intermittenti obnoxius fui, sæpe in cordis sede dolorem percepi, quem tamen, accuratius sensationem meam scrutatus, in musculis pectoris residere reperi.

rimentis *Anna Car. Lorry*, & *Carrere*, & *Hænius*, & stimulus certe sanguinis sensu non percipi, verissima est *Caldani* adnotatio.

Alia conjectura est, ideo cor magis irritabile esse, quod nervi cordis sentientes, intimæ tunicæ cordis vicini, a sanguine proximo cominus stimulentur, atque adeo vehementior inde motus sequatur, quam quidem ab irritatione exterioris partis alterius musculi. Etiam intestinorum exterior facies pene insensilis est, interna sensibilissima, & motus laceßita continuo producit maximos *t*. An ideo adeo mobiles auriculæ, & ipso corde magis irritabiles, quod tenuissimæ, nervos fere nudos sanguinis stimulo exponant?

Aliam causam majoris, qua cor gaudet, ad irritationem mobilitatis, si quis proferet, auscultabo facilis. Hanc pro hypothese affero, pro ea nolens contendere. Rejecit *Cl. Fontana t**, rejecit *Cl. Ipey t***. Loco hujus conjecturæ aliam affert *Cl. Fontana*. Sufficere putat, quod cor diu moveatur, ut porro facilius motum continuet *t****. Mihi contra, musculum, qui diu operatur, enormiter fatigari, adque motum præ dolore ineptum fieri videtur, quod in rectis & vastis expertus sum, cum biduo continuo in cuniculos subterraneos descendissem.

t Alex. Stuart n. 414.

t Ricerche p. 151.*

*t** Observ. physiolog.*

*t*** Ib. p. 161.*

§. XV. *Et perpetua irritatio.*

Nunc stimulus, quo cor potentissime ad motum incitatur, fluidum est, pene quodcunque, quod per venas in aures & ventriculos cordis impellitur *v*. Inter ea fluida etiam sanguis est: eo enim in moribundo animale ex vena in aurem expresso, cor ad motum revocatur *x*. Neque solus ruber aut ponderosus sanguis *y* eo officio fungitur, cum & in pullo cor prius acriter saliat, quam sanguis purpuram induerit *z*, & ipse aer, millies sanguine levior, perinde, & rectius, cordis motum refuscitet *a*.

Occurrere vero oportet gravi contra hanc stimuli sanguinei potestatem objectioni. Aiunt Cl. viri *b* cor etiam inane pulsare, & ranæ cor inanitem diutissime salire, & resecta utraque vena cava, intercepto adeo sanguinis commeatu, cordis alternum motum superfuisse *c*, & ligata vena cava cor tamen moveri *d*, neque

v n. 4.

x *N. Stenonis* F. *Act. Hafniensis* T. II. p. 146. Cl. *Janke* in versione germanica *Bruherii* p. 260.

y Pallidum sanguinem minus recte cor ad contractionem stimulare Cel. viri scripserunt: & Ill. *Senac* T. I. p. 322.

z *Higbmor of generation* p. 71.

a n. 4.

b *Albinus* in *adnotat. acad.*

L. II. c. 16. *Shebbeare practice* p. 75.

c *Browne Langrish* l. c. n. 144. Habent fere similia *Jacobus Primrose* in *destru&fundam. Plemp.* p. 101. *G. Charleton Mantiss. anat.* p. 88. *Morland of the force of the heart* p. 67.

d *Petrus Chirac* apud *Senac* p. 317. *Blanquet* p. 449. *Shebbeare princ. of pract.* p. 754. *Bellin Prop.* IV.

ideo sanguinem in cor venire, qui, a cor dilatet, sed ideo recipi, quia cor dilatatum inveniat *e*.

Multis modis responderi potest. Et primo certum est *e*^{*}, subtracto sanguine vires cordi detrahi, hinc a venæ sectione *f*, a vulnere, a quacunque sanguinis jactura vires frangi *g*, & animam nos relinquere, ita subitam etiam mortem succedere *h*, omnesque hæmorrhagias, a cordis viribus motas, certissime per sanguinis de incisa vena ad deliquium usque continuatam missionem sisti *i*, neque animal duarum *k* tertiarum sanguinis partium jacturam absque præfente morte ferre. Perit equus, cujus sanguis non supra duo pedes salit, teste *Stephano Hales* *k*^{*}. Pulli, carotidibus apertis, continuo extinguuntur. Si subtracto sanguine cordis vires franguntur, augentur certe congesto. Eo major, celerior, diuturnior, vehementior systole in corde percipitur, quo cor copiosius sanguine

e *Sanvages theor. puls.* p. 15. *sis Citesius de usu phlebot.* p. 22.

e^{*} Contrarium, ut videtur, experimentum *Massimi* esp. 10. 11. qui sanguinem in cor venire, & de corde per vulnus exire vidit, nullo cum ejus musculi motu. Verum stimulus vires excitat, non generat. Si cor ad motum ineptum fuit, si irritabilitatem amisit, qui temporis effectus est, omnino sanguis illapsus motum ciere non potuit, uti nec in cadavere humano potest,

f A duodecim unciiis emis-

g *Keil de quant. sang.* p. 4.

h *Zacut Prax. Med. mir.* L. III. obs. 143. Pulli in ovo incubato incisis magnis vasis continuo extinguuntur.

i *Quesnai de la saignée* p. 228. Ed. II.

k *Thomson dissert. Med.* p. 42.

k^{*} Perit equus, quando sanguis non supra duos pedes ascendit *Hales hæmast.* p. 16. Cum cor & magna vasa inania essent, mors synoptica, *Fischer de morb. senum.* p. 135.

repletum fuit *l*. Hinc in peripneumonia pul-
sus robur & violentia est in ratione sanguinis,
qui per liberam partem pulmonis transit, &
cum ea copia aut languet, aut incitatur *m*.
Hinc in vivo animale, in nostris & Cl. *Bohni*
experimentis, cor atrociter laborat, & constri-
gitur vehementissime, & pulsat vi, quam po-
test maxima, & diutissime motum suum conti-
nuat, quando arteriis ligatis, sanguine se de-
plere impeditum, perpetuo stimulo agitur *n*.
Hinc cordis palpitationes a plethora, quando
brachiis amputatis, diminuta adeo arteriarum
capacitate, visceribus interim sanis, & æque
copioso sanguine parato, cor in angustiora nunc
vasa ægrius se deplet *o*.

Manifestius adhuc vis stimuli percipitur,
quando aut sanguinis cor perambulante nu-
bem *p* oculis sequimur, aut aquam *q*, aut
inflatum aërem *r*. In experimento Cl. *Porta-*
lii, cum aër per venam jugularem impellere-
tur, ut exinde in venam cavam superiorem,
auriculam dextram, & ventriculum dextrum
advenit, ita eæ cavæ se contraxerunt. Tunc
enim adparebit, venam cavam quidem primam

l Whytt on vital motions
p. 70.

m Idem p. 59.

n Senac T. II. p. 269. Se-
cond Memoire sur les parties
sensibl. & irritabl. Exp. 515.
516. 518. 519. 521. 522. 523.
526. 550. 551. 552. 553. 554.
Remus l. c. p. 22.

o Vieussens traité des li-
queurs p. 242.

p Exp. 479. 480. 511. 516.

526. optime, 530. 546. 548.
549. 553. 554. Conf. Zim-
mermann l. c. p. 58.

q Senac T. I. p. 325. Es-
says de physique 1735. p. 479.

r Senac ibid.

repleri, & primam, postquam repleta fuit, contrahi. Deinde, uti sanguis vel aer ad auriculam & ventriculum receptus est, paulo post constringi, ut perenni ordine ea semper pars totius cordis constringatur, quam paulo prius injectus liquor irritavit. Ita in longo corde insectorum ex ordine quivis nodulus, certe qui nodulus videtur, deinde alter, & tertius peristaltice contrahitur, perinde ut in intestino, uti quisque proculdubio irritatus fuit *s*. Sed etiam, quoties unica pars cordis a sanguine repletur, etiam unica illa paulo post contrahitur, sive vena cava fuerit *t*, sive auricula dextra *v*, sive dexter ventriculus *x*, sive sinister, de quo continuo dicetur. Denique ubicunque cor irritatur, ibi initium motus est, indeque sanguis directionem accipit *x**. Atque adeo irritatio causa proculdubio est, quare cor contrahitur.

Neque dubium est, cor rite inanitum quiescere, in meis *y*, inque clarissimorum *Calda-*
ni, *Fontanae*, *Sichi* *y**, & adversariorum pariter *z* experimentis: & ventriculos, dum auriculæ integræ pergunt moveri, atque omni sanguine, aërisque parte majori subtracta, continuo de motu desistere, si

s *Malpighi*, *Swammerdam*. 518. 519. 520. 521. 522.
V. hujus libri n. ult. &c. *y** *Fontana ricerch.* p. 97.
t l. c. *Exp.* 475. 282. *Johnston gangl.* p. 31.
v *Exp.* 473. 491. 498. 573. *z* Galli cor irritabile esse
x *Exp.* 471. desit, cum sanguine inani-
*x** *Lancisi* p. 83. retur *Whytt* l. c. p. 351. &
y *Exp.* 512. 513. 514. 515. vitulæ *Caldan* p. 328.

in ventriculo cordis experimentum feceris, in aure perinde successurum. In experimentis equidem, in quibus venæ ligantur, non semper motus cordis supprimitur, neque vellem hic magnorum virorum auctoritate abuti, qui supprimi scripserunt *a*: neque adeo vicissim, uti iidem celebres viri scripserunt, soluto venæ vinculo cordi motus redit. Nam mihi quidem is motus raro supprimitur *b*, aliquando debilitari *c*, & tamen pergere visus est, cum alii continuo cessare scribant: alias, etiam pluribus venis ligatis, omnino cordis motum integrum superesse vidi *d*. Verum ratio diversi eventus non est difficillima. Quoties enim cor ligatis venis non quievit, & ne expressum, & elisum, quidem a motu destitit, toties sanguinis aliqua particula *e* in ventriculo reses deprehensa est. Quare objectio a venarum vinculo repetita sententiam nostram non evertit. Est etiam ubi ventriculus sinister non inane dextrum in societatem sui motus traxit, & vicissim.

a *Harvei exerc. III. p. 272.* *p. 62. 63. 306. J. M. Lande auricula sinistra, quam ciffus Prop. 56. p. 165. 166. 167. Petrus Senac l. c. p. 316. 317.*
ait, ligata arteria pulmonali
quiescere: tum de corde in
universum, ligatis venis san-
guinem adferentibus. quies-
cere testes sunt *Harveius*
exerc. I. p. 99. Thomas Bar-
tholinus anat. tert. renov. p.
379 Sorgeloos diff. de æco-
nom. corp. Thes. 68. 69. J.
God. Berger de natur. human.
b Exp. 526.
c Exp. 552. Huc palpita-
tiones a ligatis venis Whytt
l. c. p. 79.
d Exp. 488. 506. 511. 512.
513. 514. Chirac, Blanquet,
loc. cit.
e Exp. 517. 523.

Denique aër in corde relictus mobilissimum muscolum in motum ciere potuit. Eum si extraxeris, in Ill. *Caldani* experimentis, cor porro perpetuam quietem agit.

Alio denique modo experimentum instituire tentavi, ut omnino certo definirem, a stimulo sanguinis impulsu cordis motum succedere. Ergo, cum in omni animale calido, dexter ventriculus *f* & dextra auricula *g*, diutius soleat in motu suo persistere, priores vero quiescant sinistri lateris caveæ: cumque vehemens suspicio sit, hanc in dextris caveis constantiam esse a sanguine, per suas causas *b* in iis caveis reliquo, quo tempore nihil in sinistri lateris aurem & ventriculum venit; conatus sum efficere, ut dextri lateris ventriculus, & auricula, priores inanirentur, in sinistro vero latere diutius a sanguine stimularentur. Id si effecissem, prævidebam privilegium constantioris motus a dextris caveis in sinistras transiturum, si a stimulo cor contrahitur; nihil vero mutatum iri, si nostra sententia falsa est. Ergo experimentum in variis animalibus facere adgressus sum, neque facillimum reperi. Oportet enim calidi sanguinis, spiritumque nostro modo ducente animale, uti: ejusmodi autem animalia fere continuo pereunt, quando utraque pectoris cavea aperitur. Tentando

f p. 313.
g p. 313. seq.

b n. 16.

tamen, & maxime in mitioribus animalibus, felicem denique eventum sum adsecutus.

Ergo venas cavas incidebam; exinaniebam, quoad ejus fieri poterat, auriculam & ventriculum dextri lateris; inde venas ligabam. Contra arteriam pulmonalem amplo vulnere aperiebam, ut eo facilius dexter ventriculus sanguine se depleret. Ita efficiebatur, ut auricula & ventriculus dextri lateris evacuarentur. E diverso venas quidem pulmonales dimittebam liberas, aortam vero filo interceptiebam: ita fiebat, ut sinistra auricula, & ventriculus sinister, sanguinem acciperent, neque possent emittere.

His paratis semper factum est, ut sinistra auricula *i*, & sinister ventriculus diutius *k*, quam dextri lateris cognomines cavæ in motu suo persisterent, ad quatuor usque horas. Dextra auris *l* fere semper continuo quiescebat. Dexter ventriculus aut imperfecte, & languide, & breviori tempore contrahebatur *m*, quoties non penitus inanis erat; aut omnino continuo quiescebat, quoties experimen-

i Exstant hæc experimenta in commentariis Soc. Reg. Gotting. anni 1751. & in *Memor. sur le mouvement du sang.* p. 168. seqq. & in *Second Memoir. sur les part. sensibl. & irritabl. Exp.* 515. 518. 519. 521. 522. 523. *l* Ibid. Exp. 515. 517. 518. 519. 520. 521. 522. *m* Ibid. Exp. 515. 518. 519. 520. 523.

tum felicius factum erat, ut cor integre evacuaretur *n*.

Qui hos experimentorum nostrorum eventus pensitaverit, is quidem non dubitabit nobiscum pronunciare, causam, quæ cor in motum ciet, omnino sanguinem venosum esse. Nam enata ea causa cor movetur, subtracta quiescit *o*, diminuta motus cordis languet, aucta motus intenditur.

Id si verum est, si porro cordis ad motum major, quam aliorum muscutorum, promptitudo est, si præterea cordi perpetuus, dum vivimus, sanguis advenit *p*, non mirum est, perpetuum cordis motum esse.

Cum denique vis irritabilis, etiam absque vi nervea, in musculis habitet *q*, cum eadem proculdubio cordis, quæ reliquis musculis natura sit *r*, intelligitur, quomodo cordis contractio, absque vi nervea, in animale capite, cerebro, medulla spinali privato, in corde evulso & dissecto integra supersit. Cum vero in aliis musculis vis nervea ad constantiam, ad magnitudinem motus plurimum conferat, minime improbabile est, etiam cordi per nervos vim motricem accedere, quæ motum a natura irritabili pendentem, vel fortiozem, & celeriozem

n Ibid. 521. 522. conf. *Cal-* parties irritables p. 52. *Se-*
dan p. 325. *cond Memoire Exp.* 243. 244.

o Definit cum stimulo con- 245. 246. 247. 248. 255. 256.

tractio *R. Whytt* l. c. p. 243. *r* Vis, quæ cordis motum

p L. III. tot. facit, ejus fibris inhæret *Ill,*

q *Premier Memoire sur les Senac* l. c. p. 322.

efficiat vel certe ad primi motus contemperentiam. Sed huic quidem duplici muscutorum motui exponendo alius & proprius locus dabitur.

Objectum est, sæpe in cadaveribus cor non inane, inque eo sanguinem reperiri, plerumque in thrombos coactum. Non perpetuum est. Ipse Ill. *Haenius* cor inane vidit; vidit, qui plurima cadavera incidit, Cl. *Greding* *r*^{*}. Cæterum intelligitur, in moriente animale vires cordis exhaustas, denique ante quietem perpetuam eo redire debilitatis, ut stimulus quidem sentiat, tamen se contrahere, aque stimulo se liberare minime valeant. Perinde objectum est, in corde calculos & ossea concremento reperta esse, neque tamen minus cordis alternas contractiones locum habuisse *r*^{**}.

Protuli experimenta mea *s* & rationes: iniquum foret, & candore meo indignum, dissimulasse, multos ante me, certe ex conjectura, cordis motum a stimulo derivasse, & aliquos inter nuperiores physiologiæ auctores eandem tenuisse sententiam. Motus naturales cordis, intestinorum ab irritatione deduxit *Bergerus* *t*. A sanguinis influentis stimulo cordis motum derivat *Fantonus* *v*. Eadem *Lancisio* fuit

r^{*} In *Adversar. Ludwigi*.

r^{**} *Ricerch.* p. 121.

s In *Comment. ad Inst. rei Med.* ann. 1740. editis ad n. 177. *Prim. lin. physiolog.* anno 1747. ed. n. 113. p. 51.

Comment. Societ. Reg. scient. Gott. 1751. l. c. & 1752. ad fin. *Second Mem. &c.* p. 388. 389.

t l. c. p. 306. 307.

v *Anat. corp. hum.* p. 312.

fuit x, & Thomæ Morgan y sententia, & Guilielmino z, & Ill. Senaco a, Inter nuperos fere dominatur. Vide J. Friderici Winter b, J. Gott. Kruger c, J. Lups d, Cl. Passavant e, Roberti Whytt f, Cl. de Man g, J. Vincentii Petrini h Felicis, Fontana Cl. Johnstone h* & aliorum testimonia, ut discipulos meos omittam.

Accuratus viri præstantissimi F. Fontana, & M. Ant. L. Caldanus viderunt, cur relaxatum, irritatum semel, & in frigidis, etiam aliquoties contrahi, non tamen continuo, sed post tempusculum, in quo stimulus in fibram potuit vim suam exferere, celerius tamen in juniore animale.

§. XVI. Cur auricula dextra ultima supervivat.

Facilia sunt, quæ sequuntur. Evincunt Clarior. vivorum i & nostra experimenta, auriculam dextram ultimam supervivere, sive eo tempore motum suum continuare, aut si qui-

x l. c. Prop. 56. p. 166.
167. 168. edit. nuper. 4.

y Omnis motus animalis est effectus stimuli *mechanical*. princip. p. 37.

z In opuscul. *scientificis* tom. IV.

a Prima causa motus cordis est sanguis l. c. p. 315.

b De certit. med. pract. Franck. 1746. fol.

c Physiologie ed. nov. p. 220. Grundriss einer neuen Arzneykunst n. 20.

d Diff. inaug. de irritabil. p. 28.

e In disp. de cordis motu.

f Omnes motus vitales sunt a stimulo l. c. p. 21. 325. &c. & imprimis cordis motus p. 44. 361.

g Irritabile est causa motus cordis de natura p. 14.

h Præfat. editionis italicæ nostræ de irritabil. dissertationis p. 24.

h* Of ganglions p. 18.

i p. 314. 315.

dem quieverit, ad recipiendum motum tamen idoneam esse, quo tota machina animalis quievit. Et primo tenere oportet, auriculam sinistram *k* in solis calidi sanguinis animalibus reperiri, quibus sanguis dextro ventriculo receptus, omnis per pulmones trajicitur prius, quam per aortam ejusque ramos in corporis partes artusque didi queat. Sed trajici omnino non posse, nisi pulmo alterna respiratione agitetur, alibi ostensum est *l*, & experimento *Hookiano* confirmatur. Moribundo nempe animali, cui cor conquieverit, pulmonem inflamus, & respirationem imitamur: ita fit, ut sanguis ad motum redeat, & ex vena pulmonea, per immobilem prius pulmonem, in cor sinistrum penetret *m*. Quamprimum ab inflatione aliquamdiu temperatum fuit, stagnat de novo sanguis inter dextrum ventriculum sinistrumque, neque quidquam porro in auriculam sinistram pervenit.

Nunc in animale moribundo aliquanto prius respiratio desinit, quam cordis motus, cum vires pectus dilatantes minus irritabiles sint, quam quidem cor *n*. In eo ergo agone, qui veram mortem præcedit; pulsatur aliquamdiu

k Ibid.

l Comment. ad *Prælect.* Boerb. T. II. p. 165. 173. T. V. P. I. p. 112. Hinc in submersis, suffocatisque, cor & pulmo coacto sanguine replentur.

m Comment. iid. T. V. P.

I. p. 12.

n Second *Memoir. sur les part. irritabl.* p. 387. conf. cum *Exp.* 230. 239. 240 In omnibus enim exemplis cor motui costarum & diaphragmatis supervixit, ut in ad- versariis reperio.

ventriculus sinister, sanguinemque in aortam, hinc in venas cavas, & auriculam dextram urget, quo tempore pulmo, ex respirationis defectu immeabilis, nullum sanguinem ex dextro ventriculo admittit, & si quid admittit, idem retinet, neque ad sinistrum sinum finit venire. Adeoque & is sinus, & ejusdem lateris ventriculus, sanguinem nullum accipiunt, quo tempore ad dextram aurem, dextrumque ventriculum, sanguis venire pergit: destituuntur adeo cavæ sinistræ eo stimulo, quo natura ad eas caveas in motum ciendas utitur o, quiescunt ergo, prima auris, quam lævam vocamus, deinde sinistri lateris ventriculus. Deinde, quando cor penitus quievit, frigus *p* subnatum ipsum vasa totius corporis contrahit, cutemque constringit. Quam vehementer ea causa humores moveat, exhalatio humorum per oculos, densamque corneam tunicam, ostendit. Sed etiam pondus sanguinem regit, & proprium *q* & incumbentium *r* muscutorum, ossium, viscerumque, & semper aliquæ partes corde venisque magnis altiores sunt. Ex his causis, etiam absque cordis motu, sanguinis quidquid est fluidius, a corporis regumentis, & cutis ambitu ad cordis sedem congregatur *s*, quæ ultima calet, & hætenus laxa & mollis est. In

o p. 440.

p De ea frigoris potentia vide L. VI, p. 221.*q* Second. *Memoire sur le**mouvement du cœur* p. 388.

389. & L. VI. p. 221.

r L. VI. p. 169. & *Andr. Paster**de motu sang a morte.**s. Pecclin de purgant.* p. 484.

cavam adeo venam *t*, maxime abdominalem illum vastissimum truncum, sanguis pergit colligi, atque adeo auricula dextra ad motum sollicitatur. Ea contracta aliquam sanguinis particulam in anteriorem ventriculum pergit exprimere, quamdiu mollis est, & necdum frigore obriguit. Quando ab auriculæ repetitis contractionibus tantum in ventriculum sanguinis venit, quantum ad ejus carnes efficaciter stimulandas necesse est, tunc & ipse thalamus contrahitur, rarius quam auricula *v*, quod ea magis quidem irritabilis *x*, plus tamen a venis accipiat sanguinis, quam quidem in mortem elanguens nunc potest emitte; crassas enim carnes ventriculi elevare tenetur, ut sanguinem in caveam exprimat. Minus ergo irritatus, minusque irritabilis, ventriculus, rarioribus intervallis, quam quidem auricula, contrahitur. Quando magis nunc & magis frigus funestum etiam cor occupat, non integra cordis contractio, sed palpitaciones interruptæ *y*, succedunt, quas diximus, & denique cor æternum tacet, quamprimum adeps nunc congelatus rigorem fibræ inducit. Ultima & auris *z*, funesto frigore languida, postquam frustra contra collectum sanguinem luctata est, &

t In omnibus cadaveribus *sique des corps animés* p. 234.
 ea venarum sedes sanguine 235. *Caldean* p. 330.
 plena est, tum dextra auricula, conf. *Drelincourt Canicid.* I. *Kaaw* in perspir. n. *v* p. 314.
 751. 752. dum sinister sinus *x* p. 405.
 inanis est *Kaaw* l. c. *Phy-* *y* *Second Memoir. sur les*
part. irrit. Exp. 476. &c.
z *Phys. anim.* p. 315.

ipsa emoritur; ultimæ tamen eæ particulæ vigent, quæ utrique venæ cavæ finitimæ, novissimos sanguinis venosi tactus patiuntur. Sæpe tamen, integra post quietem cordis hora, auricula supervivit, ultimum vivens, ultimumque in animali corpore moriens *a*. In vena cava, cujus in pulsatione constantia cum auricula æqua spe pugnare posset, eædem perennioris motus causæ sunt *b*. Hanc successiorem quietis sæpe observavi, adnotavit etiam Ill. *Caldanus*. Ventriculus sinister primus quiescit, tunc auricula ejus lateris, porro ventriculus dexter, dum auricula dextra pergit micare, ultima vena cava quiescit.

Contra, si artificio aliquo obtinueris, ut diutius ad sinistram aurem, sinistrumque thalamum, quam ad dextras caveas, sanguis veniat, tunc utique prior silet dextra auricula, & privilegium diuturnioris vitæ ad sinistras carnes, una cum stimulo, transfertur *c*.

§. XVII. *Quæ causa sit, quæ homines semianimes recreat.*

Intelligitur nunc ratio, qua possint homines aquis submersi, aut deliquio animi oppressi, ad vitam revocari. Promptissimum videtur aërem ori inflare, & *Hookii* adeo experimentum imitari, ut nuper, cum sua laude, fecit

a p. 315.
b Ibid.

c p. 315.

Cl. *Fothergill*. Plerique vero homines dolore aliquo usi sunt, ex quo irritati nervi concussionem in nondum emortuis musculis cierent. Sternutationem multi *d*, neque insipienter, moverunt, etiam euphorbio *e* in nares inflato, aut spiritu salis *f* ammoniaci infuso, aut aliis acribus corporibus *g* in os naresque datis. Alii motum peristalticum intestinorum, fumo accensæ nicotianæ in anum *h* misso, suscitare conati sunt, alii unice dolorem vehementem intulerunt, acicula sub unguem infixâ *i*, clavo intruso *k* aut cultro in cutem adacto, hi quidem inviti & ignari *k**. Alii sensus violentiores, percussiones & acres strepitus adhibuerunt *l*.

Omnium idem scopus fuit; concutere nervos. Ii irritati musculos, quos adeunt, in convulsiones agunt, eo vehementiores, quo ipsi acriorem stimulum passi sunt. Musculorum vero agentium vis in sanguinem venosum & dicta est *m*, & repetetur *n*. Tument, venas interjectas elidunt, sanguinem ob valvulas ad cor dextrum pellunt. Ita stimulus auriculæ dextræ redit, & quæ reliqua dicta sunt. Opor-

d *Mal. Thruston de respirat.* p. 66.

e *Pareus de renunciat.* p. 879. oper. omn.

f *Mercurie Suisse* anni 1734. M. Jun.

g *Boerhaave Prælect.* T. I. p. 108.

h *Idem ibid.* Acadieusium

barbarorum experimentum est.

i *Winslow* in celebri illa thesi de incertit. sign. mort.

k *Winkler* in *Nymmannum* de apoplex. p. 64.

*k** p. 427.

l *Rumler* obs. 67.

m p. 205.

n *Libro VII.* p. 216.

tet autem sanguinem fluidum esse, cor & musculos nondum rigere, neque hactenus putredinem invaluisse.

Hujus excitationis peculiaris casus est, quando simplicissime pressione aliqua vehementi sanguis venosus ad auriculam dextram pellitur, stimulo futurus, qui auriculam & cor ipsum ad motum revocet. Ejusmodi fuit celebre illud & funestum experimentum, quod *Vesalio* exilii mortisque, in deserto littore perpessæ, causa fuit. Cum enim nobilem ægram, nimis cupidus, vix mortuam & calentem incidisset, in corde vitæ superstitis indicia pulsus edidit. Mota inde invidia, accusatus, aque Philippo II. ægre servatus, ad peregrinationem religionis causa suscipiendam damnatus, Hierosolymis redux in Zacyntho insula periit. Ita certe *Thuanus*, ita nono post viri mortem anno *Ambrosius Pareus* o scriptum reliquit. Similis etiam *Slegelio* p gravissimi ex terrore morbi causa fuit. Creditur autem, innixos in nuper mortui hominis pectus adstantes amicos, sanguinem in auriculam dextram promovisse. Et certe aliis etiam anatomicis accidisse legimus, ut cor pulsans in expectato cadavere offenderint, male memores, cor molle, a fluido sanguine, aliquot omnino a quiete horis, posse ad motum revocari. De pue-

o De la génération p. 236. collectione L. XIII. c. 46.
 tecto quidem nomine, & manifestius in operam annuum p. 27. p Apud Bartholinum lymph.

ro nuper nato diximus, quem sanguine de funiculo in cor in pulso ad vitam revocamus. Hæc repetentur L. IX.

§. XVIII. *Quare auriculæ ante ventriculos pulsant.*

Denique, incipit intelligi, quod continuo in quæstionem vocabimus: quare nempe priores auriculæ, & posteriores ab eo tempusculo ventriculi constringantur. Cum enim a stimulo sanguinis venosi & auriculæ moveantur, & ventriculi, sed priores ex venis suis sanguinem auriculæ habeant, posteriores ab ipsis auriculis ventriculi accipiant, facile intelligitur, priores illas, hos serius contrahi, ad quos cum sanguine stimulus, cum stimulo motus serius veniat *q*. Neque enim eodem tempore in utraque, auris & ventriculi, cavea stimulus præsens inest. Omnino, uti ab inflato aëre, ex ordine, vena cava prima, deinde auricula, ultimus ventriculus contrahitur *r*, in frigidis animalculis, quibus unica auricula est.

§. XIX. *Quæ causa sit alterni ordinis, quo cordis partes constringuntur & laxantur.*
Hypotheses variae.

Nempe altera illustris quæstio enodanda fu-

q Whytt on vital mot. p. 446.
61.

pereſt. Quæritur cauſa ordinis, qui in motu, & alterna quiete diverſarum regionum cordis inviolabilis regnat. Poſcitur ratio, quare prima dextra auricula, & una, eodemque tempuſculo, etiam ſiniſtra contrahatur, dum interrim ventriculi laxi quieſcunt: quare paulo poſt auriculæ laxatæ reſolvantur, ambo vero ventriculi ſe conſtringant: & denuo tertio tempuſculo ventriculi quidem remiſſi otientur, auriculæ vero denuo vivida vi ſe arctent. Cauſam hujus æterni rhythmi dudum *Morlandus* ſtupuit s.

Varias, & ſubtiles quidem, hypotheſes Phyſiologi propoſuerunt. Et *Laurentius* quidem *Bellinus* t antagoniſmum aliquem ventriculos inter & aures admittit: ut in contractione ventriculorum auriculæ reſolvantur, quod ſanguis, cordis replens caveas, auricularum nervos comprimat, & nervei liquoris in eas auriculas influxum impediat. Reſolutis viciffim ventriculis, nervi in liberatas auriculas ſpiritus motores effundunt, eaſque in contractionem agunt, in Cl. viri hypotheſi, quam *Georgius Cheyne* v repetiit.

Eodem fere tempore *Raymundus Vieuffens* x cordis vim deduxit ab unita actione ſpirituum animalium, & arteriarum coronariarum, uti

s *Of the force of the heart*
p. 38.

t *De cordis motu* Propoſ.
II.

v *Philof. princip. of religion* p. 135.

x *Conf. Neurographiam* L. I. c. 4. p. 19. 20. & *traité du cœur* p. 129. ſeqq.

in universum musculos a conjunctis sanguinis & spirituum viribus in motum cieri persuadebatur. Addebat, in ventriculorum cordis systole a contractis fibris arteriarum quidem coronariarum sanguinem expelli, nervosque a fibris tensionem molientibus comprimi, ita carnes ventriculorum utraque causa sui motus destitutas laxari, & sanguinem ex vicinis auriculis in quietos ventriculos urgeri. Sed vicissim, demta nunc causa arterias premente, nervosque ventriculorum, in cor nunc emollitum, redire per coronarias arterias sanguinem, inque nervos spiritum, ita novam contractionem nasci. Hæc obscurius dicta, ita interpretari conatus sum. Recepit tamen eandem fere theoriam *Joh. Fantonus* *y*, & nuper *Cl. Fracassinus* *z*.

Horum satis similia in priore opere a proposuit vir olim acuti ingenii, *Daniel Tauvry*. A nervis nempe sanguinem in fibris cordis detineri, ita systolen facere docuit: paulo post diastolem sequi, quod in contractione cordis sanguis fibris hujus organi cesset suppeditari, atque ita sublata causa, vis contractilis tollatur. Ita sequitur, ut cor relaxetur.

Simpliciorẽ hypothesein eodem tempore, aut paulo prior, tradidit *Claudius Perrault* *b*. Duos nempe fibrarum in corde ordines sta-

y l. c. p. 313.

z *De febre* p. 27.

a *Anat. raisonn.* P. I. c.

4 ed. I. nam in tertia edi-

tione aliam omnino & obscuriorem hypothesein tradidit.

b *Mecanique des animaux*

Part. III. p. 230. 231.

tuit, uti diximus *b**, rectas alias, quæ longitudinem hujus organi sequerentur, aliasque transversas. Illæ cor relaxant, aditusque venofos sanguini, ab auriculis adventuro, aperiant. Hæ cordis arctant ventriculos, & sanguinem de caveis expellunt. Oppositi ordines sibi resistunt, & alterni superant. Ita scripsit, ex hypothefi, ut ipse quidem fatetur. Clarum virum plurimi, & aliqui equidem taciti secuti sunt, *Samuel Schaarschmidt c*, *Ludovicus de Clarellis d*, *Georgius Ehrhard Hamberger e*, alique, & hætenus etiam vir præstantissimus *Browne Langrish f*, ut tamen unice velit, in omni statu cordis aliquas fibras violentiam pati.

J. Baptista Scaramucci g proprio libello sanguinem, diastoles quidem tempore in arterias coronarias impelli, ibi vero effervescente, aut quacunque alia ratione, contractionem ciere: a contracto vero corde exprimi, ex conjectura proposuit.

Sub initium novi seculi *Christianus Stroem h* ex anatome similem aliquantum hujus phænomeni solutionem hausit. Ita nempe valvulas aortæ disponi credit, ut a sanguine clau-

*b** Sect. IV. n. 2. p. 174. *diastole cordis*, & in *physiologia* n. 185. &c.

c In propria epistola ad Ill. *Ellerum*, deinde in *physiologia* f l. c. n. 148.

p. 425. *g* In libello *Senogallia*

d *Spirit. animal. exturb.* p. 1689. exenso, & in *diario Parmensi* ejus anni.

93. *e* In diff. inaugur. sua de *h* *Nov. theor. machin. anim.* Prop. V.

dantur, quem ventriculus sinister expellit, atque arterias coronarias sanguinem suum, non a cordis contracti vi, sed ab aorta subsidente accipere, Antagonismum porro ponit spiritus inter & sanguinem, ut cordis fibræ a sanguine arterias coronarias subeunte extendantur, ad laxitatem cogantur: ita a sanguine diastolen fieri. Sed cor in ea laxitate sibi relictum, a spiritibus iterum in contractionem cieri, sanguinemque suum in aortam expellere: eum ab ostiis arteriarum coronariarum, valvularum munimine defensis, averti, ne contractionem impediat. Ita evacuato corde valvulas iterum lavari, & a contracta aorta sanguinem in arterias coronarias inPELLI; tunc fibras contractas cordis extendi, & diastolen priori similem sequi.

Dominicus Mistichellius i duram cerebri membranam, ad *Pacchioni* & *Baglivi* sententiam, moveri, & spiritus urgere persuasus, inde antagonismum inter cor & eam crassio rem meningem deduxit. Alterna nempe vi contractum cor sanguinem in cerebrum pellere, durioris membranæ resistantiam superare, eamque extendere posuit. Sed laxata dura matre tolli eam vim, quæ cordi spiritus ministret, atque adeo paulo post cor, penu nervea destitutum, omnino resolvi. Ita sibi relictam duram membranam iterum vi innata contrahi, novamque

spirituum undam cordi mittere, quæ fibras ejus musculi in contractionem agat.

Porro Præceptor noster *Boerhaavius* *k* priorum physiologorum experimenta & hypotheses eleganter, ut sæpe solebat, conjunxit. Duplicem nempe causam motus cordis sumit, nerveam vim, & sanguinis arteriosi potentiam. Utramque vim ostendit, alternis vicibus cordi inesse, iterumque cor deferere. Pone ergo, hoc tempusculo cor contractum agere, ut musculi solent. Replet adeo duas magnas arterias, quas cor emittit, easque mutuos contactus adprimit. Sed præcipui nervi cordis inter eas arterias incedunt: sequitur, ut inter ea vasa distenta comprimantur: compresso vero nervo musculus resolvitur; adeoque & cor, ex hac quidem causa, nerveique influxus penuria, desinit contrahi. Iterum de contracto corde sanguis in arteriam aortam premitur: ea unda valvulas arteriis coronariis præpositas extendit, earumque adeo arteriarum ostia claudit, ut sanguinem recipere nequeant. Ita etiam secunda causa motus cordis destruitur, intercipitur nempe sanguinis arteriosi commeatus, absque quo musculi omnino nequeunt operari. Utraque ergo causa motus sibi subtracta, resolvetur cor & quiescet.

Verum, dum cor laxatur, contrahuntur ex vi innata arteriæ, aorta, & pulmonea, & sanguinem a corde acceptum exprimunt: minuun-

k Instit. rei Med. n. 409.

tur ergo earum diametri, intervallum ergo augetur, & nervi interpositi, hactenus compressi, liberantur, spiritui ad cor redituro via patet: redit cordi prima causa novi motus. Eadem arteriæ aortæ contractio inpellit sanguinem in coronarias arterias, cum ab aorta retropulsus in sinus valvulosos pellatur, inque iis sinubus aperta arteriarum coronariarum ostia subeat, & in earum ramos, inque cordis demum carnes veniat. Renata est adeo systoles cordis altera causa, arteriosi nempe sanguinis penus, sequitur, ut cor contrahatur, contractum vero sibi ipsi causam contractionis auferat. Hæc in editis. Nam in *prælectionibus suis* solebat addere, tertiam causam, quæ cor cogat contrahi, stimulum esse venosi sanguinis, in thalamos cordis impulsæ. Sed & hanc causam a contracto corde eliminari, laxato vero reddi. In systole enim id organum evacuari, in diastole a plenis, & occasionem expectantibus, auriculis repleri. Hæc hypothesis, ut fere pleraque Cel. viri, a plurimis iisque clarissimis viris recepta fuit. Addidit aliqua Cl. Lillie m, ut objectionem, dudum factam, everteret. Nempe non omnes cordis nervi inter duas magnas arterias decurrunt, neque adeo omnes a sanguine de corde expulso conprimi possunt.

L. Alexandro Monroo apud *motu muscutor.* quæ ad præ-
Cheseldenium in anatomes suæ mium Academiæ Regiæ Bero-
 edit. VI. p. 198. *Gerardo van* linensis anno 1753 accessit. &c.
Swieten Comment in aphor. m *De palpit. cord.* p. 47.
 T. II. p. 18. Auctore diff. de 48.

Ergo aiebat vir, quem citavi, Clar. ii quidem ad motum cordis pertinent, quos medios arteriæ transmittunt, reliqui, qui ad arteriarum latera decurrunt, sensum cordi præstant.

Josephus Lieutaud n ita rem interpretatur, ut sanguis, qui caveas cordis distendit, fibras hujus musculi conprimat: ita materias motus, in fibris cordis latens, a percepto incommodo provocata resilit, & cor in contractionem ciet; eadem paulo post quiescit, quando sanguis de cordis caveis expulsus desit fibras ejus premere.

Alia, ad nuperas hypotheses accommodata, opinio a Cl. viro *J. Rudolpho Stæbelin* o proposita est. Nervorum nempe fluidum electricum esse sumitur, & cor in contractionem ire, quoties a nervis communicatam electricam naturam induit, cum prius ipsum electricum non fuisset. Sed vim eam, & natam inde contractionem, paulo post evanescere, quod cor sanguinem non electricum, dum arctatur, contingat, atque adeo, ex communi lege, propriam electricam vim amittat, quæ in sanguinem transitt. Verum a nervis novam vim electricam cordi nunc non electrico reddi, quam ex iisdem causis paulo post sit amissurum.

n *Première Dissertat.* p. 703. in collectionis nostræ T. VII.
o In disp. de pulsibus, Ba-recusam dedimus p. 14.
 filæ ann. 1749. edita, quam

§. XX. *Quid in his hypothefibus desideretur.*

Quid in his hypothefibus aut firmum fit, aut parum ftabile, fuperelt ut expendamus. Et primum nihil valde erat, cur de cordis alterna contractione & relaxatione peculiari cum ftudio inquireretur. Ea enim contrariarum virium alterna fucceffio omnibus pene *p* mufculis communis eft, fternocoftali *q*, pectorali *r*, abdominalibus *s*, cremasteri *t*, brachialibus mufculis *v*. Etiam araneorum crura refecta alterne contrahuntur, & viciffim fe relaxant *z*. Non ergo oportebat in cordis fabrica peculiare caufas phænomeni quærere, quod ipfi cum plerifque mufculis commune fit, & oportet omnino ab ejus phænomeni interpretatione remove id omne, quod cordi proprium inelt, & in aliis mufculis defideratur. Ejufdem enim effectus eandem oportet exspectare caufam.

Deinde ex fapiente *Newtoni* lege, cum caufam

p Omnibus communem facit Cl. *Whytt* l. c. p. 18. 243. ut etiam veficam, quam continuato motu lotii, abfque alterna relaxatione contrahi monui. (*Second Memoire Exp.* 315. 316. &c. & p. 290.) omnino neget mufculum effe (in P. II. *Physiological Effays*, quæ nuper edidit) Verum id nimium eft, & mufculofæ veficæ fibræ nihil quidquam

habent a ventriculi, & ab inteftinorum fibris difcriminis.

q *Second Memoire Exp.* 234. 237.

r Ibid. *Exp.* 240. 242.

s Ibid. 226. 227. 236. *Toffetti Lettera* II. p. 191.

t Ibid. *Exp.* 226.

v Ibid. *Exp.* 241.

x *Woodward fupplem.* p. 94.

causam habeamus sufficientem, quare cor per stimuli ipsius alternam absentiam & restitutionem alterne quiescat, & ad motum redeat, non adtinet pro eodem phænomeno exponendo alias causas conquirere.

Sed eamus per singula. *Bellini* hypothesis experimento repugnat. A repleta auricula nervos ait comprimi, vimque suam amittere. Sed certum est, auriculas aëre, aqua, sanguine repletas in contractionem cieri, etiam quando quieverunt. Repletio adeo non aufert vim contractilem, ut excitet *y*. Fluidum vero summo, quod repleat, nam coacti utique cruoris grumi *z*, qui auriculas distendunt, eas reddunt immobiles.

A musculorum fibris vim superari nerveam, perinde rei ipsi contrarium est. Vis contractilis fibræ innata *a*, & altera, a nervis communicata *b*, eodem tempore & conjunctæ operantur, illasque ista adjuvat, auget & accelerat. Nam fibra absque nervo plerumque modice contrahitur, vehementius vero eadem convellitur, quando vis nervea accessit.

Sanguinis ad muscoli actionem operam remotam esse ostendemus. Ligatis carotidibus faciei & capitis muscoli immutati operantur. Arteria brachii ligata nulla oritur paralyfis *c*, neque corde exsecto vis musculos regens in

y p. 394. ad usque 398.

z *Second. Memoire &c. Exp.* 521. 545.

a *Ibid.* p. 256.

Tom. II.

b *Ibid.*

c Torpor unice aliquis *Parisot Journal Oeconom.* 1756. Janvier.

ranis deficit. Demum longo cum tempore gangræna, quæ aversum sanguinis flumen sequitur, destructis musculorum fibris, paralyfin adfert.

Fibras cordis rectas, aut sibi adversas, aut ita ab invicem liberas, ut seorsim agere queant, dudum quidem refutavimus *d*.

Arterias coronarias a valvulis minime *e* tegi, & a cordis utique contracti vi sanguinem suum accipere *f*, dumque contrahitur, altius sanguinem suum expellere *g* ostendi. Sed etiam ligatis arteriis coronariis *h*, aut incisis *i*, ut sanguinis commeatus a corde avertatur, motui hejus principis musculi nihil decedit quidquam. Causam cur supra valvulas ponantur, Ill. Fontana suspicatur eam esse, ut sanguis ex aorta retrogradus in eas effugium inveniat *i**.

Duram matrem, uti insensibilem, ita immobilem, & dudum *k*, & nuper per experimenta ostendimus.

Ill. *Præceptor* coronariarum arteriarum quidem ostia fecit ejusmodi, ut a valvulis tegi possint; sed ostensum est, tegi non posse *m*, neque cor in systole sua sanguinem de pro-

d p. 124. 125.

e p. 207. ad 214.

f Ibid.

g Ibid.

h Chirac Phil. Transact. n. 263. Advers. p. 121. Bessé traité analitique p. 308. Septuaginta minutis motum superuissæ, cum arteriæ coronariæ vinculo interceptæ es-

sent. Difficile videtur Ill. Viro, mihi quidem non impossibile *tr. du cœur* p. 318.

i l. c. Exp. 536. 542. 543. 544. &c.

*i** *Ricerche* p. 119.

k Comment. ad Prælect. Boerhaav. T. II. n. 235. p. 364. seqq.

m p. 204.

priis carnibus exprimere *n*. Deinde nervi equidem aliqui, & quidem grandiores *o*, medii inter utramque magnam arteriam incedunt. Verum præter eos alii non pauci cor adeunt, & ante aortam *p*, & pone pulmonalem arteriam *q*. Sed etiam medium illum inter arterias plexum conprimi posse, non adeo probabile est. Propriis enim quasi crenis in cellulosa arteriarum natura excavatis nervi continentur, ut omnino parum emineant, & ob eam etiam causam mundatu difficiles sint: deinde non adeo molliter oportet nervum conprimi, si vim a cerebro advenientem intercipi velis *r*: fortis vero compressio, quæ ad paralytin musculo inducendam sufficiat, non potest non sensum excitare summi incommodi, quale quidem nemo nostrum in cordis actione patitur *t*. Porro nervis incisis, & destructis *t*, non continuo cor quiescere, & aliquamdiu capite ablato *v*, aut evulsum *x* pulsus suos continuare ostensum est: in hypothesei vero *Præceptoris* oportet, ictu oculi citius compressioni nervorum cardiacorum cordis succedere exsolutionem. Iterum, auriculæ perinde alterno motu, & alterna quiete reguntur, quarum nervi, ut conprimi possint, non dicitur. Et in piscibus fri-

n L. IV. p. 210.
o *Lieutaud* p. 233. & operis nostri L. IV. P. II. n. 25.
p p. 169.
q p. 197.
r *Second Mémoire sur les*

parties irritables Exp. 211, conferendo cum 222.
s *Albinus* adnot. Acad. L. II. c. 16. *Lups* l. c.
t p. 186. &c.
v p. 430. seq.
x p. 409. seq.

gidisque animalibus, quibus unica arteria est, neque adeo nervei trunci perinde eliduntur, tamen alternæ cordis vices pari constantia sibi succedunt. Quare omnino a subtili cæterum hypothese videtur abstinendum. Si placeat argumenta, pleraque equidem nostrorum similia, fusius proposita legere, clari sunt, quos consulas, viri y.

Cum absque nervis z, & absque sanguine arterioso a, non unum, sed multos pulsus cor perficiat, non potest ejus aut motus, aut quies a nerveo contactu, aut a sanguineo, aut cieri aut opprimi. Sed etiam longe vehementiorem compressionem nervi musculum non reddere paralyticum *Fontana* expertus est a*.

§. XXI. *Quæ verior phenomeni causa sit. Stimuli iter & successio.*

Si hypotheses nos deferuerint, non est, quod valde queramur, summa enim hic simplicitas est. Nempe vasa sanguinea, arteriosa & venosa, per ea quæ superius ostendimus, sanguine constanter plena sunt b. Quo tem-

y *Petrus Senac* l. c. p. 445. diff. an motus alterni cordis
 446. *J. Daniel Schlichting* in causa multiplex Paris. 1740.
Verbruggii examine chirurgorum p. 80. B. *Siegfr. Albinus* l. c. *Wesseling* de arter. Existat etiam in collectione nostra.
homin. adnex. X. *Cel. Moers* z p. 169. 170.
de nutritione, G. E. *Hamberger* de cordis diastole n. 29. a In corde evulso.
Josephus Exuperius Bertin in b L. VI. p. III. seqq.

pore ergo auricula dextra contracta riget, eo jam præsto est in utraque vena cava sanguinis unda, quæ perpetuo a subsequente sanguinis venosi redeuntis flumine aucta increfcit, dum auris in actione sua arctata resistit, licet enim breve tempusculum rationis jussu extendere. Quamprimum eadem auricula contractionem suam absolvit, & omni sanguine se liberavit, tunc, a stimulo utique deserta, laxa quiescit. Ergo ex vena cava utraque, vi musculosa venæ *c*, unda sanguinis in auriculam impellitur; non in ventriculum, qui eo inprimis tempore contractus, claususque, sanguinis sui partem, deinde anulum venosi ostii versus auriculam rejicit, atque adeo sanguinem ab auricula adventurum vi suarum carniarum repellit *d*, qua proculdubio auriculam superat. Interim irritata a sanguine venoso recepto auricula, quamprimum ventriculus sanguine inanimatus se laxus remisit, & ipsa ex lege stimuli contrahitur, suumque cruorem in laxatum ventriculum expellit. Ita & ipsa vim irritabilem amittit, a qua provocabatur, eamque ventriculo tradit, qui, pari ex lege, paulo post contractionem molitur, suumque sanguinem ejicit, pariterque a stimulo liber quiescit remissus, novamque ab auricula undam sanguinis accipit. Ita æterna lege simplicis stimuli, valvularumque venosarum, caveam auriculæ a ventriculi cavea separantium, alternæ utriusque musculi

contractiones & remissiones se inperturbatae consequuntur.

Princeps viri vim *Fantonius e* sensit, venerandus senex, tum *C. Gottfr. Stenzel f, J. Exup. Bertinus g, & Petrus Senac h, Cl. Moers i* aliique.

Toties cum irritationem pro causa motuum in corde observatorum proposuerim, omnino monere teneor, causam me excitantem & sollicitantem intelligere, quæ aliam vim motricem, in corde habitantem, ad contractionem provocet. Si vero a me requisiveris, ut eam vim stimuli impatientem declarem, & potentiam exponam, quæ irritationi respondet contractione sui organi, nondum certe ad eam quæstionem reponam quidquam. Communis hæc cum omnibus omnino musculis cordi natura est, ut laceffitæ carnes breviores fiant, adque mediam sui partem accedant. Eadem etiam natura ventriculo est, eadem intestinis & gulæ. Hi enim cavi tubi, aut repleti, aut inflati, in ea sede constringuntur, in qua vim irritantem adplicatam patiuntur, sive aër, sive cibus, sæcesve fuerint, aut acre quodcunque, quod fibras distendat, aut laceffat: effectus vero ejus contractionis est, ut causa irritans ab

e l. c. p. 313.

f Ob perpetuam a sanguine irritationem cor non quiescit *peri upnou* p. 67.

g l. c.

h p. 376. seq. Uterque tamen

clarissimus gallus, succum nerveum cum vi stimuli conjungit *Senac* p. 329. 332.

i l. c.

k *Prem. Mem. sur l'irritabil.* p. 53. 57.

ea sede, quam laceffivit, depellatur. Ita fit, ut in ferie intestini, quæque superior *l* particula irritantem suam materiem in proxime inferiorem expellat, eaque expulsa quiescat. Vicissim particula, quam inferiorem dixi, quæ eadem bolum laxata recepit, ea nunc irritata contrahitur, inque aliam intestini sedem stimulantem causam exprimit. Manifesta hic cum longo illo insectorum corde intestinorum est similitudo, quod idem & cor sui animalis est, & aorta *m*: & perinde ejus cordis, qui certe adesse videntur noduli, a primo ad ultimum aliqua cum successione moventur *n*, suumque liquorem promovent. In animale frigidi sanguinis hætenus cor differt a calido corde, quod canalis sanguineus, vena nempe, auricula, ventriculus, & aorta, continuus quidem, sed alternis carnosisque uteris mediis interceptus, intumescat, cæterum ordo contractionum & laxationum cum intestino, cumque corde crucæ convenit. In homine duo quasi corda sunt, solum per pulmonem connexa: & venæ cavæ cum auricula dextra, primoque ventriculo, & arteria pulmonali, primum systema efficiunt, toti cordi frigidi quadrupedis simile. Alterum, simile prioris systema, venarum est pulmona-

l Second Memoir. &c. Exp. posthum. p. 62. de bombyce p. 406. 407. & imprimis 408. 38. Swammerdam Bibl. nat. 424. 439. T. II, tab. 15. f. 4. Et mu-

m p. 77, seqq.

n Non una moventur, sed de, antiperistaltice movetur motu peristaltico Malpighi Malpighi l. c.

lium, sinus sinistri, ventriculi sinistri, aortæ. Ita si cor humanum contemplatus fueris, in singulo systemate simplicitatem habebis fere ejusmodi, qualis est in erucæ o corde & piscis, sed duo simillima conjuncta corda, quod piscibus unicum est.

Cæterum de motu sive simultaneo sive peristaltico per arterias non potest res oculi aut ullius sensus testimonio definiri: id enim in tanta celeritate tempusculum nec alternam cordis efficaciam demonstrat *p*, neque in duobus distantium partium pulsibus successionem percipit.

o Dudum comparavit *Thomas Morgan* philosoph. principes *of practice* p. 150. 151. *p* *Spalanzan.* p. 23.



TABULA I.

*PERICARDII INFLATI AD VASA CORDIS MAGNA
ADHÆSIONES.*

FIGURA I.

**PERICARDIUM AERE TURGIDUM A PARTE
ANTERIORI.**

EX CORPORE PUERILI.

- A Magna bulla pericardii, qua cor continetur
- B Pulmo dexter
- C Sinister
- D Aorta descendens, vi aliqua de situ mota
& reflexa
- E Finis inferti ductus arteriosi
- F Arteria subclavia dextra
- G Arteria carotis dextra
- H Carotis sinistra
- I Subclavia sinistra
- K Ramus sinister arteriæ pulmonalis
- L Venæ pulmonales
- M Cornu dextrum pericardii
- N Pars ejus adhæſionis infima
- O P Cornu sinistrum adnatum arterioso ductui
P & aortæ arcui ad O.

FIGURA II.

PERICARDII FACIES POSTERIOR.

- A Pars, quæ cor continet
- B Pulmo sinister
- C Dexter
- D Venæ pulmonales sinistrae
- E Ductus arteriosus
- F Ramus sinister arteriæ pulmonalis
- G Truncus communis arteriæ carotidis, & subclaviæ dextræ
- H Carotis sinistra
- I Arteria subclavia sinistra
- K Aorta descendens
- L Arteriæ pulmonalis ramus dexter
- M N Venæ pulmonales dextræ
- O Cornu sinistrum pericardii adhærentis ad aortam, & ductum arteriosum
- P Cornu dextrum ad aortam adhærens
- Q Media pars arteriæ pulmonalis, adnata ad originem rami sinistri
- R Pars pericardii adnata ad venas pulmonales dextras
- S Vena cava superior.

TABULA II.

COR OBITER EXPRESSUM, AURICULÆ DEXTRA ANTERIUS APERTA.

- A Cordis facies plana
- B Sinus dexter apertus

- C Pars ejus sinus, quæ peculiariter auriculæ
dicitur
D Ventriculi dextri aditus
E Vena cava superior
F Aorta
G. H. I. Ejus tres magni rami
K Aortæ truncus descendens
L Fossa ovalis
M Anuli ovalis columna dextra
N Et sinistra
O Origo valvulæ *Eustachianæ* posterior.
P Et anterior
Q Media & latissima
R Pars sinus dextri, resecta de B.





I N D E X

T O M I S E C U N D I.

L I B E R Q U A R T U S.

C O R.

S E C T I O I.

V E L A M E N T A E X T U S C I R C U M P O S I T A.

1.	P LEURA , ex cellulosa tela stipata componitur	Pag. 1
	& simplex, neque duplex, est membrana	2. 3
2.	Duo ex pleura sacci conficiuntur	4. 5
3.	Quorum conjunctio mediastinum constituit	6. 7
	Anterius & posterius	7
4.	Describitur mediastinum anterius	8
	Ejus lamina dextra	8. 9. 10
	Lamina sinistra	10. 11
5.	Mediastinum posterius	12
	Ejus lamina sinistra	12. 13
	Lamina dextra	13. 14
6.	Ligamenta pulmonum	15
7.	Cavea mediastini anterioris	16. 17
	Sedes ulcerum, atheromatum	17
	Cavea posterioris mediastini	18
	Cavea mediastini bestiis propria	ibid.

8. Vasa mediastini. Arteriæ 19. 20
 Venæ 20
 Utilitas hujus dissepientis membranæ *ibid.*
9. Pericardium. Tegitur mediastino 21
10. Ut septo transverso incumbat & adhæreat 22. 23
 Cur eo quidem modo in solo homine 23. 24
11. Ejus velamenti finis superior 25
12. Anterior facies 26
13. Adhæsiones ad magna vasa. Antiores 27. 28
14. Adhæsiones posteriores 29 - 32
 Anulus pericardii, qui aortam continet & pulmonis arteriam 31. 32
15. Anuli pars ad arteriam pulmonalem adhærens 32
 Adhæsiō pericardii ad venarum cavarum intervalla 34
 Pericardii foramina 34
 Cornua posteriora 35
 Cernua anteriora 35
16. Natura pericardii. Fit ex cellulosa tela 36
17. & ex unica lamina 37. 38
 Qui aliter fenserint 38 - 40
18. Pericardii arteriæ 41. 42. 43
 Venæ 43
 Nervuli 44
19. Aqua pericardii. A quibus rejiciatur 45
20. Vere adesse, & in omnibus animalibus 48 - 50
21. Natura eadem, quæ lymphæ 51. 52. 53
22. Vitiose spissatur & varia mala facit 53
 fungos, de corde efflorescentes 55
 pilos, quibus cor horret 55. 56
 coalitum cordis cum pericardio 56 - 59
 Quæ vitia ab adhærente pericardio nascantur 60
 Ab adhæsiones factum est, ut homines aliquos pericardio destitutos fuisse scriptum sit 61
 Adhæsionis noxæ 61. 62
23. Animalibus nonnullis pericardium negatur 63. 64
24. Pericardii utilitas 64. 65
 Cordi firmitatem præstare 65
25. Aquæ pericardii nimia ubertas 65. 66. 67
26. Ejus aquæ utilitas 68

27. Ejus scaturigo	69
Non ex ductu chyliifero	70
Neque ex thymo	<i>ibid.</i>
Neque ex glandulis conglobatis	71
Neque ex pericardii glandulis propriis, quæ nullæ sint	72
Sed ex vapore	73
Secretionem eam ars anatomica imitatur	73. 74
28. Resorbtiio venosa	74. 75

S E C T I O II.

A U R I C U L Æ C O R D I S.

1. Animalia quibus natura cor fecit	76
Quibus nullum est	77. 78
Quibus cylindricum	79. 80
2. Cordis in homine figura, coni per axin secti	81
Basis	82
mucro	<i>ibid.</i>
bicollis	<i>ibid.</i>
3. Cordis situs in homine	83. 84
in animalibus quadrupedibus	86
Erroneæ voces dextri ventriculi & sinistri	<i>ibid.</i>
Ut situs cordis in homine alius sit aliisque	86. 88
4. Situs inversus	89
pendulus & vitiosus	90
5. De auriculis cordis in universum	90 <i>seqq.</i>
Quid auriculas vocent, & quis sit in ea voce error	91
Causa faciendarum auricularum	92
Unica in animalibus frigidi sanguinis, piscibus & oviparis quadrupedibus	93
De istis alii aliter scribunt	94. 95
6. Auricula dextra	96
figura	97. 98
Limites	98
7. Venæ cavæ huic auriculæ inmissæ	<i>ibid.</i>
Varietates in iis venis aliquæ	99. 100
& musculosa fabrica	100. 101

8. Auriculæ musculi pectinati	101
eorum fines	102
musculi, unde appendicis auriculæ	102
lacerti nascuntur	103. 104
tenuæ auriculæ membranæ	105
9. Sinus dexter	106
ejus fibræ & fabrica	107
10. <i>Lorveri</i> tuberculum	108
in homine nullum	109
11. Fossa ovalis	110. 111
12. Anulus ovalis sive isthmus <i>Vieussenii</i>	111. 112. 113
13. Valvula <i>Eustachii</i>	113. 114. 115
Secundum naturam non reticulata est	116. 117
nunquam deficit	118
ejus utilitas	119. 120
14. Sinus sinister	120
Cubica pars præcipua hujus sinus	121
& crenata appendix	122
15. Venæ pulmonales	123
Omnino quatuor	123
16. Auricula sinistra	123
ejus fibræ	124
17. Dextra auricula capacior	125

S E C T I O III.

C O R D I S I P S I U S F A B R I C A.

1. Membrana cordis extima	126
cellulosa tela subjecta	127
adeps	127
concretiones morbosæ	128. 129
2. Ventriculus dexter, sive anterior	130
Ejus figura	<i>ibid.</i>
crassities	<i>ibid.</i>
ferior subnascitur	131
3. Amplior est quam sinister	132. 133. 134. 135
4. Membrana cordis interna	135
Reticulum carneum	136
Ostium venosum dextrum	137
5. Tendo cordis venosus quid sit	138

Non est verus tendo		138
6. Anulus valvulosus ostii venosi dextri	138.	139
Qui eum depinxerint,		130
Habitus est pro tribus valvulis		140
Musculi papillares		141
& eorum tendines	142.	143
7. Valvulæ, in quas anulum venosum diviserunt		143
Maxima, superior anterior	143.	144
Media, five acuti marginis		145
Minima, five septi cordis		<i>ibid.</i>
Varietates		146
Ut in avibus se habeant		147
8. Ostium arteriosum dextrum		148
Tendo arteriosus quid	148.	149
9. Valvulæ arteriosi ostii	149. 150.	151.
Sinus arteriæ pulmonæ		151
10. Valvularum margo		151
Noduli		152
fibræ transversæ & arcuatæ		153
ut claudant arteriam		154
earum induratio, aut ruptio	154.	155
12. Cur unicus aliis animalibus cordis ventriculus		155
cur aliis duo		<i>ibid.</i>
nullis tres	156.	157
13. Cordis septum		158
Ejus pori cæci	159.	170
14. Ventriculus sinister		161
15. Ostium venosum sinistrum	161.	162
Ejus anulus venosus		162
& duæ valvulæ mitrales		<i>ibid.</i>
Earum frequentior induratio		163
musculi papillares	164.	165
16. Ostium arteriosum		165
Valvulæ semilunares		166
17. Earum valvularum globuli Arantiani		167
& frequens induratio		168
Sinus aortæ		169
18. Os cordis	170.	171
Ad morbos pertinet		171
	19.	Fibræ

19. Fibrae cordis carnea- 172
reticulatim intricantur 173
20. Rectae nullae sunt 174. 175
21. Fibrae cordis paratu & descriptu difficiles sunt 175. 176.
- Quid auctor viderit 177
22. Quid *J. Alp. Borellus* 177
Nicolaus Stenonis F. 178
Raymundus Vieussens *ibid.*
J. M. Lancisius 179
Johannes Tabor 179. 180
23. *J. Benignus Winslow* 180
J. Fridericus Cassebohm 181
24. *Petrus Senac* 182. 183. 184. 185. 186
25. Nervi cordis 186
Nostra historia 187. 195
Nervus cordis superficialis 187. 188
Nervi a ganglio cervicali medio nati 189
Plexus magnus cordis 190
Ganglion cervicale infimum 191
Nervi sinistri 192. 193. 194
Tres praecipuae nervorum cordis classes 195
26. Nervi cordis *Willisiani*, ex bestiis sumti 195
Nervi *Vieusseniani* 196. 197
27. Nervi *Lancisiani* 197. 198
Winslowiani 199
Waltheriani 199. 200
28. Descriptio *Petri Senac* 200. 201
Petri Tarin 201
Cas. Christophori Schmiedelii *ibid.*
J. Duverney 202
29. *Antonii Portal* *ibid.* 204.
30. *Ernesti Neubauer* 204. 205
31. Nervi cordi nobis ignoti 205
32. Arteriae coronariae 206
Earum origo. Est supra valvulas 207. 108
Causa erroris. Cur multi crediderint, cor in systo-
le sua exalbescere 209

- Uti expallescat. Non in carne, sed in cavea ex-
pulso de ea sanguine 210
- Petrioli* distinctio 211. 212
33. Arteriae coronariae semper duae sunt 213
valvulas non habent 214
neque membranam interiorem pulposam *ibid.*
34. Arteria coronaria dextra sive inferior 215. 216.
217. 218
- Nulla est alicujus momenti arteriosa cordis corona
218
35. Arteria coronaria sinistra sive superior 218. 219
Ejus rami principes. Anterior 219
circumflexus 220
Profundus 220. 221
36. Venarum tres classes. Majores 222
Coronaria vena *ibid.*
Ejus ostium in auricula dextra 223
& valvulae in eo ostio *ibid.*
Valvulae in iis venis porro nullae sunt 224
Rami venae coronariae 225
37. Vena cordis media 226
Vena sinus dextri 226. 227.
Venae innominatae 227
Vena anterior *Galen* 228
38. Venae cordis mediocres 228. 229
Venae aortam ambeunt 228
Aliae ejus generis 229. 230
39. Venae cordis minimae 230. 231
An in caveam cordis apertae pateant 231. 232.
233. 234
Videntur patere 235
Non emittunt sanguinem peculiarem, qui venae
cavae cruorem perficiat 236
40. An in corde glandulae reperiantur 237
41. Vasa lymphatica cordis 238. 238

S E C T I O VI.

M O T U S C O R D I S.

1. Systole cordi non naturalis est 239
neque sponte dilatatur 240
2. An diastole a fibris rectis fiat 241
Non videtur 242. 243. 244. 245
3. Phaenomena systoles 245. 246. 247
4. Omnino cor in systole sua brevius fit 248
Contraria argumenta 248. 249
Quibus respondetur 249. 250
Unde experimentorum Cl. *Queye* eventus 250
Dubia in frigidis animalibus 251. 252
5. Cordis pulsus ejusque phaenomena 254. 255
6. & auricularum 256. 257
7. Cor in systole evacuatur 258
non in diastole 259
An omnem sanguinem expellat. Videtur 260. 261
262. 263
8. Phaenomena diastoles 264. 265
9. Pulsus venae cavae 266
10. Quem sequitur auriculae dextrae pulsus 268. 269
Sanguinis ex ea auricula refluxus in venam cavam 270
Ejus refluxus utilitas 270. 271
cum sanguis in eam auriculam collectus mortem in-
ferre possit 271. 272
Iter legitimum sanguinis in dextrum ventriculum 272. 273. 274
11. Arteria pulmonalis clauditur a valvula venosa ma-
xima 264
12. Sanguis venit in ventriculum dextrum 175. 276
13. Inde in arteriam pulmonalem dextro eordi commis-
sam, permittentibus valvulis 276
aliquid in auriculam dextram redit 277. 278. 279
Experimenta quae hoc sanguinis iter declarant 280.
281
in frigidis animalibus unicum est 282

14. In calidis ex arteria pulmonis sanguis in venas
 hujus visceris venit 283
 Ostendunt vincula 273
 & morbi 284. 285
15. Venae pulmonis perinde pulfant, ut cavae venae 286
16. Fluxus & refluxus sanguinis ex sinu sinistro in ve-
 nam pulmonalem 287
 verum inde iter sanguinis in ventriculum sinistrum 287. 288
 Demonstrant valvulae 290
 & morbi *ibid.*
17. Hoc per pulmones iter est circuitus minor fan-
 guinis 291
 A *Serveto* inventus *ibid.*
18. Ex ventriculo sinistro sanguis venit in aortam 291
 ostendunt valvulae semilunares 292. 292. 294
 & morbi 295
 An eae valvulae aliquid in cor remittant 295
19. Tempora, quibus diversae cordis particulae in motu
 sibi succedunt 296
 Primo tempusculo vena cava pulsat & pulmonalis *ibid.*
 Sanguis ex venis redux eodem tempore sinus re-
 plet & auriculas 297
 nec diversis tempusculis 298
 etsi sanguinis iter per aurem & ventriculum non
 unico ictu oculi perficitur 298
20. Sequitur II. duarum auricularum contractio 199
 300
21. III. & utriusque ventriculi 300. 301
22. Opinio nostrae contraria *J. M. Lancisii* 302
 Nempe cum contractione auricularum aliquamdiu
 contractionem ventriculorum conjungi *ibid.*
 Non respondet experimentis 303
 neque rationi 304. 305. 306
23. Opinio *Francisci Nicholls.* Non eodem tempore dex-
 tram auriculam cum sinistra, neque ventriculum
 dextrum cum sinistro contrahi 307. 308. 309
 Quare ea opinio admitti nequeat 310

- Objectio solvitur 311
24. Finis motus cordis: quies ventriculorum, auricularum, venarum, cavae & pulmonalis 311
- Languidus motus cordis 312
- Deinde ventriculi dextri 313
- & auriculae ejus lateris 314
- Diu auriculae dextrae motus superest *ibid.*
- Quies venae cavae 315. 316
- & ventriculi sinistri 316
25. Vis cordis quousque sanguinem urgeat 317
- in arterias capillares 318
26. in venas rubras 319
27. Etiam in vasa minora 320
- & totam corporis universitatem 321. 322. 323
28. Primum in animale cor movetur 324
- In fetu, quam in adulto animale, grandius est 325
- tum in juniore animale, 325. 326
- avibus 326
- & animalibus ferocibus *ibid.*
29. Adversarii, qui sanguinem a corde solo, aut praecipuo motore, moveri negant 327
- Objectio repetita a fetibus acephalis 328. 329
30. Alia, a motu sanguinis, qui post evulsum cor superest 330
31. Additur, vires cordis non sufficere ad motum producendum, quo sanguis circumit 331. 332
32. Quare vim cordis aiunt suppleri 333
- a contractione arteriarum *ibid.*
- quam experimentis productis demonstrant 334. 335
33. II. ab oscillatione vasculorum minimorum 336. 337
- equidem invisibili *ibid.*
34. III. vi expansi per calorem aëris. ex sententia J. Hutchinson 337. 338. 339
35. & Cl. Bertier 339
36. Ad eas objectiones respondetur 340
- Cum cerebri etiam gravibus morbis vivitur 341
- Sanguinis a morte superstes oscillatio est ab adtractione 341

- Utique cordis impulsio in arteriolis minimis percipitur 342
- Premere cor, non percutere, subtilitas est 343
37. Arteriarum vis contractilis utique in calidis animalibus 343. 344
- minor est quam vis cordis 344
- neque eam vim adjuvat 344. *seqq.*
- Absque vi contractili arteriarum cordis motus suum sanguinem urget 345. 346
- & si vera est haec vis contractilis, nihil inde cordis potentiae decedit 347
38. Rejicitur adtractio vasorum minorum 347. 348. 349
39. & eorum vis oscillans 350. 351
- vis peristaltica vasorum nondum certa est 352. 353
40. Neque adjuvatur motus sanguinis a calore aëris atmosphaerici 353
- aut aëris in sanguinem recepti 354. 355
41. *Adansonii* objectiones 356
42. Vis cordis est primaria causa motus sanguinis 356
- 357
43. Et magna est 357. 358
- cum plurimum sanguinem emoveat 359
- & celerrime projiciat 359
44. Variarum harum virium mensurae 360. *seqq.*
- J. Alphonsi Borelli* calculi 360. *seqq.*
45. *Jacobi Keilii* 361
- determinata velocitas sanguinis 361. 362
- hinc cylindrus sanguinea, cujus gravitatio eam velocitatem generare valet 463
- faltus sanguinis *ibid.* 364
- Observationes in *Keilii* calculos 364. 365
- Omisit resistentias cordi objectas 365. 366
- & retroactionum quam ipse sumferat 366
46. Calculi *Jacobi Jurin* 367. 368
47. *Josephi Morland* 369
- J. Tabor* 370
48. *Stephani Hales.* Pondus sanguinis, quem cor contractum sublevat 370
- celeritas qua eum projicit 371

Notationes in hos calculos	372
49. <i>Thomæ Morgan</i> opinio	373
& <i>Bryani Robinson</i>	373
50. <i>Francisci Boissier</i>	374
51. <i>Danielis Bernoulli</i>	375
Nimis parum cordi tribuit	376
52. Ill. <i>Senaci</i> monita	376. 377
53. <i>Nostre</i> observationes	377. 378. 379
Vires cordis magnæ sunt, sed ad calculos aegre revocantur	380

S E C T I O V.

C A U S Æ M O T U S C O R D I S.

1. <i>Fibrae carnae</i> . Earum constrictio in ventriculis	381. 382
& auriculis	382. 383
2. <i>Fibrarum</i> motus an a nervis	384
motus cordis num tollatur nervis ligatis; paris octavi	384. 385. 386
& <i>Intercostali</i>	387
aut <i>medulla spinali</i>	387
Non tollitur	384 ad 392
<i>Medullae spinalis</i> vulnera non semper mortem inferunt	390
3. objectiones <i>Wilsoni</i>	391. 392
4. <i>Causa</i> motus cordis est natura irritabilis	394. 395
Qua cor alias partes corporis animalis superat	395
	seqq.
5. stimuli qui cor ad motum cient. Calor.	398. 399
	400
<i>Sales</i>	401
irritatio varia	402. 403
Sed potentior interna	402. 403
& <i>aëris</i> maxime vis	403
Ordo irritationis & motus in corde	404
<i>Juniora</i> animalia cor habent magis irritabile	405
& animalia corde univentre prædita	406

6. Causa quae irritabilitatem destruunt 406. *seqq.*
 ipsa contractio delet irritabilitatem 407
7. Vis irritabilis non est a nervis 408
 Nam in corde evulso & dissecto superest 409. 410.
 411
 etiam in calido animale 412. 413
8. Quaeritur causa, quae fecit, ut cordis motus adeo
 perennis sit & constans 414
9. Non est ab igne innato 414
10. Neque in nervis, quos cor accipiat, peculiariter
 vitalibus 416
11. Neque aliae hypotheses experimentis respondent 417
J. M. Lancisii 417
Johannis Swammerdam 418
J. Godofredi de Berger 418
Johannis de Gorter 419. 420
12. *Stahlianæ* animae potestas proponitur 420
 & argumenta pro ea sententia 42S. 422
 Contra eandem causam disputatur 423
 Non dat causam mechanicam aptitudinis cordis ad
 motum 424
 Classes motuum arbitrariorum & spontaneorum nun-
 quam turbantur 425
 Neque arbitrarii fiunt motus, qui spontanei fue-
 runt, si consuetudinem abstuleris 425. 426.
 427. 428. 429
13. Neque anima in corde habitat 430
 Nam anima ejusque functiones evulso corde super-
 sunt 430. 431
 Et cor non eget ad officia sua capite aut cerebro
 432- 433
 Cl. *Whytt* objectiones 434
 Respondetur, animam non esse in artu truncato,
 qui tamen manet irritabilis 434. 435
14. In corde residet causa, quare ad motum peren-
 nem aptius sit 436
 Nervi cordis non sunt numerosiores aut majores 437.
 438
 forte magis nudi 439

- cor diutius motum, hinc magis mobile 439
15. Cordis irritatio perpetua est 440
- Objectio: cor etiam inane pulsare *ibid.*
- Respondetur. Detracto sanguine cordis vires franguntur 441
- Stimulata pars cordis contrahitur 441. 442
- Inanitem cor quiescit 443
- Stimulo ad partes sinistras traducto partes sinistrae diutius moventur 444. *seqq.*
- Ergo motus cordis a stimulo 448. 449
- forte adjuvantibus nervis 449
- Qui ita senserint 449
16. Cur auricula dextra ultima supervivat *ibid. seqq.*
- Quia sinistrae cordis caveae nullum sanguinem accipiunt 450. 451. 452
- quo tempore in dextras pergit aliquis advenire 451. 452. 453
17. Quomodo semianimes homines recreentur 453. 454
- a sanguine in cor impulsio 454. 455
18. Quare auriculae ante ventriculos pulsant 456
19. Quae sit causa alterni ordinis, quo aures & ventriculi cordis aut contrahuntur, aut relaxantur 456
- Hypotheses *Bellini* *ibid.*
- Vieussenii* *ibid.*
- D. Taitvry* 458
- Claudii Perrault* *ibid.*
- J. Baptista Scaramucci* 459
- Christiani Stroem* 460
- Dominici Mistichellii* 461
- Hermanni Boerhaave* 461. 462
- Josephi Lieutaud* 463
- J. Rudolphi Stæhelin* 463. 464
20. Earum hypothesium vitia exponuntur 464
21. Causa phaenomeni sola est successio stimuli 468 *seqq.*
- illustrata intestinorum exemplo 469. 470
- & longi cordis insectorum 471. 572

